

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

30 de enero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 30 de enero de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 30/01/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Varias estaciones del NOA reportaron más de 100mm acumulados en los últimos 7 días (Jujuy, Orán, Chepes, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero), con un máximo registrado de 187mm en Metán. Fuera de esta región, también hubo acumulados importantes en General Pico (105mm), Villa Dolores (104mm) e Iguazú (102mm). Las lluvias resultaron escasas o nulas en el sur de Entre Ríos, sur de Mendoza y Patagonia.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 22/01/2025 al 28/01/2025

Durante el jueves y el sábado se esperan algunos eventos de precipitación en el NOA y NEA. Además, el avance de un sistema frontal en Patagonia va a generar acumulados en zonas cordilleranas de la región y también algunas precipitaciones en el resto de Santa Cruz entre jueves y sábado. Entre lunes y martes de la próxima semana podrían darse algunas lluvias de diversa intensidad en el centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en la mayor parte del país. En cuanto a las máximas, superaron los 40°C en localidades del norte del país: 44°C en Rivadavia (Salta), 41.6°C en Las Lomitas (Formosa), 40.3°C en Resistencia (Chaco) y en Paso de los Libres (Corrientes). También en Neuquén se registró una máxima de 40.8°C. La mínima más baja reportada en los últimos 7 días fue de 1.1°C en Bariloche.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 22/01/2025 al 28/01/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se espera que resulten normales a levemente por debajo de lo normal. Entre jueves y martes de la próxima semana se prevé que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente en la zona central y norte del país, donde varias localidades de dichas zonas registrarán máximas sobre 35°C. Además, entre lunes y martes próximo, se espera que localidades del centro y norte de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, además del NOA y NEA, registren máximas sobre 40°C.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se destacan los excesos generados por las importantes precipitaciones registradas en el NOA. Por otro lado, sólo en esta región se estiman unidades de suelo con reservas hídricas adecuadas a óptimas para lotes de soja de primera.

Las precipitaciones ocurridas en el noreste de La Pampa y zonas aledañas de provincias limítrofes han permitido que el área salga de la clasificación de déficit hídrico y muestra un estado de las reservas escaso a regular.

Siguen clasificadas en la categoría de déficit hídrico vastas áreas de la zona núcleo pampeana. En particular en Entre Ríos, donde las lluvias han sido en general escasas (salvo excepciones locales), predominan las condiciones de sequía, lo mismo que en el sudeste de Buenos Aires y el sudoeste de La Pampa.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la zona de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, han ocurrido algunas precipitaciones durante los últimos días, apreciándose mejoras puntuales, especialmente en los departamentos al oeste de la delegación. El cultivo presenta un estado entre regular y bueno, dependiendo de la zona, y la mayoría de la superficie se encuentra en etapas reproductivas. Se ha detectado la aparición del picudo del algodnero, aunque en bajas poblaciones.

También se registraron precipitaciones en la provincia de Chaco las cuales, aunque dispares, brindaron alivio y permitieron la recuperación del cultivo que ya comenzaba a manifestar síntomas de estrés hídrico y calórico.

En la provincia de Santiago del Estero, ocurrieron precipitaciones prácticamente generalizadas y con valores sustanciales, lo que ha permitido la mejora del estado de humedad de los perfiles edáficos. El cultivo se encuentra en pleno crecimiento, en buen estado general con los lotes más adelantados ya en la etapa de floración.

ARROZ

En la provincia de Corrientes prosiguió la cosecha de lotes de arroz largo fino y ancho, obteniéndose rindes que promedian los 66 y 45 qq/ha, respectivamente. El hecho de haber sembrado en fecha por disponibilidad de agua y las buenas condiciones climáticas con días de calor y mucho asoleamiento durante el mes de enero, permitieron adelantar la cosecha con respecto a otras campañas.

En la provincia de Entre Ríos, aproximadamente un 60% del área se encuentra en floración. Algunos lotes presentan escasa lámina de agua debido a que el riego se complicó por la falta de agua en el suelo profundo ante la ausencia de precipitaciones. Igualmente, el cultivo continúa con buen estado, en términos generales.

En los departamentos San Javier y Garay, en el noreste de Santa Fe, los cultivos presentan un buen estado con ambas variedades transitando la etapa de floración. No se observan plagas ni enfermedades.



GIRASOL



La ocurrencia de precipitaciones durante la última semana, asegura que aquellos lotes más adelantados, que ya se encuentran atravesando la etapa de llenado la transiten sin inconvenientes ni limitantes. Estas lluvias han ocurrido en prácticamente todo el territorio provincial pero de manera desuniforme y con variado milimetraje; sin embargo, el cultivo, dadas sus características propias, se encuentra en buen estado general. Los estados fenológicos van desde plena floración hasta inicios de llenado, dependiendo de la fecha de siembra. En cuanto al estado sanitario, no se reporta presencia de plagas o enfermedades, aunque se prevé que, de haber un aumento de humedad, podría incrementarse la población de isocas por lo que se recomienda mayor frecuencia en los monitoreos.



En términos generales, más del 90% del cultivo implantado en la provincia se encuentra en estados excelentes a buenos, dependiendo del área donde se sembró. En la zona de Marcos Juárez, si bien el cultivo en general presenta buen estado, la siembra se realiza en áreas marginales, donde el resto de los cultivos estivales no tendrían una buena performance. En cuanto a los estados fenológicos, una pequeña proporción, que representa a aquellos lotes resembrados, se encuentra en crecimiento, mientras que la superficie restante entre floración y llenado. No se reporta presencia de plagas o enfermedades.



Continúa avanzando la cosecha en la zona de la delegación Paraná. Los rendimientos promedian los 22 qq/ha. Los últimos lotes sembrados todavía se encuentran en la etapa de floración, y su condición es entre regular y buena debido a que estos últimos lotes no recibieron las precipitaciones de los de las primeras fechas.

En Rosario del Tala, ya se ha iniciado la cosecha, y se espera poder avanzar rápidamente para evitar pérdidas por el ataque de pájaros.





Durante la semana informada se han registrado precipitaciones en todo el ámbito provincial, lo que sumado al descenso de temperaturas representan un importante alivio para la mayoría de los cultivos implantados. Para el caso particular del girasol, las características morfológicas le confieren mayor resistencia ante las adversidades climáticas, no obstante, estos nuevos aportes hídricos resultan muy oportunos para los primeros lotes implantados que ya transitan la etapa de llenado.



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones de variada intensidad en toda la provincia. Estas han demorado el avance de la cosecha en la zona norte de la provincia que abarca las delegaciones de Avellaneda y Rafaela. Los rendimientos obtenidos son muy buenos para la región, y particularmente en Rafaela se reportan rindes de entre 20 y 26 qq/ha.

En la zona de Cañada de Gómez, se han iniciado pruebas de cosecha de los primeros lotes, y las expectativas de rendimiento son óptimas, aunque las lluvias ocurridas han impedido el comienzo de la trilla.

En ningún caso se ha reportado la presencia relevante de plagas o enfermedades.



En la zona de Quimilí, se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes que se encuentran más avanzados y se ubican en la zona centro y norte de la delegación. Los rindes son bajos, aunque dentro de los valores previstos, con resultados de entre 9 y 12 qq/ha. Los lotes implantados en los departamentos del sur, que han sido sembrados en mejores condiciones, todavía se encuentran en etapas entre floración y llenado de granos y se espera que el rendimiento sea mucho mejor.



MAÍZ



Durante la semana se registraron precipitaciones en toda la provincia pero de manera muy desparejas, mejorando parcialmente el estado de los lotes de las regiones más beneficiadas. De todas maneras, las reservas hídricas de los suelos siguen siendo bajas y en ciertos casos nulas debido a la falta de precipitaciones adecuadas, las altas temperaturas y la evapotranspiración de los cultivos.

En la zona norte las mismas llegan tarde para los maíces tempranos, los cuales habían florecido muy bien con la humedad justa, llegando a formar, la mayoría de las plantas, dos espigas, pero luego fueron perjudicados por un marcado déficit hídrico que afectó el llenado de los granos quedando vacía más de la mitad de la espiga. Muchos lotes se están picando para forraje con la planta seca prácticamente en su totalidad. Los maíces tardíos y de segunda, con bajas o nulas precipitaciones durante su crecimiento, no presentan buenas perspectivas, observándose poco desarrollados y con las hojas acartuchadas. En los lotes que recibieron buenas precipitaciones y a tiempo, la situación es mejor.

En el resto de la provincia, la ausencia de lluvias adecuadas y las elevadas temperaturas están afectando a los maíces tempranos que se encuentran en etapas de floración a inicio de llenado, los más adelantados, observándose con abundantes hojas basales amarillas por falta de humedad en el perfil del suelo.



Durante la última semana se han producido lluvias en toda la provincia, las cuales fueron muy dispares y sectorizadas, con valores que oscilaron entre los 5mm y 110mm, por lo cual, los maíces se encuentran en mejor o peor estado de acuerdo a los volúmenes recibidos.

En general, el maíz temprano presenta buen estado, encontrándose entre las etapas de floración y llenado de granos, con lotes regulares en las zonas de menores registros. No se reportan daños por presencia de plagas. Se realiza el picado en aquellos lotes que se destinan a forraje. El maíz tardío está en pleno desarrollo vegetativo y principios de floración, mejorando su estado en las zonas con buenos registros pluviométricos.





El maíz avanza diferenciando sus primeras hojas en condiciones regulares a buenas. Las altas temperaturas de las últimas semanas han generado un estrés significativo, afectando también el avance de la etapa final de siembra del cereal. Durante la última semana, se registraron lluvias que han contribuido a reducir los extremos de temperatura y a mejorar la humedad en los primeros centímetros del suelo, brindando un alivio momentáneo al cultivo.



Esta semana se registraron lluvias en algunas zonas aliviando el extendido período de sequía generalizada, aunque aún persisten zonas en donde casi no llovió y la condición sigue complicada.

Comenzó la cosecha de los primeros lotes de maíz de primera en el ámbito de la delegación Paraná, en tanto que continúa en los departamentos pertenecientes a la delegación Rosario del Tala, en ambas zonas con rindes buenos a muy buenos que oscilan en promedios de 60 a 70 qq/ha según la región. Los maíces tempranos que aún se encuentran en llenado de grano están siendo afectados por las altas temperaturas y fuerte radiación de los últimos días por lo que se esperan rindes menores.

Los lotes de segunda y tardíos se encuentran en etapas vegetativas hasta R1-R2 (floración e inicio de llenado de granos), mejorando la condición, particularmente, en las zonas donde las lluvias ocurridas fueron mayores. En el último informe de la Red de monitoreo de la población de chicharrita se informó la presencia de *Dalbulus maidis* en diez de los catorce sitios muestreados, recomendando el incremento de monitoreo.



En el área norte, perteneciente a la delegación General Pico, se registraron precipitaciones con acumulados, en algunas localidades, de hasta 100mm, resultando muy beneficiosas, sobre todo para los cultivos de segunda. En la zona sur, delegación Santa Rosa, se registraron lluvias con un promedio de 28mm, siendo la reserva hídrica del suelo entre buena a escasa.



Las lluvias recibidas permiten detener los daños causados por el estrés calórico e hídrico de la primera quincena de enero, los que, de todas maneras, ya son irreversibles. Los maíces tempranos más adelantados están en llenado, en tanto que los tardíos (que se encuentran entre V12-V14) son los que mejor toleran estas condiciones adversas y se encuentran en muy buen estado. Los maíces de segunda (que se encuentran entre V6-V8) se sembraron con muy poca humedad y se encontraban muy estresados, por lo que las lluvias de esta semana fueron muy beneficiosas. Algunos lotes de primera afectados por la sequía fueron picados para consumo animal.



Durante la semana se registraron precipitaciones en casi toda la provincia, con milimetrajés que fueron desde los 10mm hasta los 80mm, favoreciendo al cultivo. Se están refertilizando varios lotes de maíz y picando otros para forraje.



En la región centro-norte, nuevamente ocurrieron lluvias las que, si bien fueron irregulares, permiten que el maíz temprano transite el llenado de granos en mejores condiciones. El estado de los cuadros es bueno a muy bueno o excelente. Los maíces tardíos se encuentran en etapa vegetativa, favorecidos también por las precipitaciones. Se observan, en lotes de menor aptitud agrícola y con menor incidencia de lluvias, plantas de menor crecimiento y quemado de hojas. Continúa realizándose el picado de lotes para reserva forrajera con excelentes rindes. Se mantienen los monitoreos y controles con mayor severidad por la presencia de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) en algunas zonas puntuales del centro norte del área comprendida por la delegación Rafaela.

En la delegación Avellaneda comenzó la cosecha de los maíces tempranos que están en buen estado en los departamentos General Obligado y Vera. Se completó la siembra de los maíces tardíos en el departamento Nueve de Julio, en tanto que se detuvo en General Obligado por la escasez hídrica. Se observa presencia de chicharritas que se combate sembrando con semilla curada y, por el momento, con dos aplicaciones de insecticidas en las etapas vegetativas.



En la región sur, correspondiente a la delegación Venado Tuerto, los maíces tienen un aspecto muy variable dependiendo de la fecha de siembra y las lluvias que recibieron. Se observan lotes totalmente secos, otros secándose y muy pocos buenos debido a las altas temperaturas y ausencia de lluvias adecuadas, estimándose pérdidas de rendimientos muy importantes.



Esta semana volvieron las lluvias y mejoró la humedad en los suelos y, en consecuencia, el estado de los lotes de maíz que se encuentran en nacimiento/crecimiento. La siembra continuará hasta primera semana de febrero.

El estado de situación con respecto a la chicharrita del maíz no está generando mayores daños ya que, según los monitoreos, las poblaciones son nulas o bajas.



Durante la semana se registraron precipitaciones de muy variada intensidad en toda la región, llegando a valores cercanos a 100mm en la zona oeste de Salta que fue decayendo hacia el este y norte con valores de 10mm. Este evento permitió continuar con las labores de siembra donde mejoraron las condiciones hídricas del suelo, en el resto se espera humedad suficiente para retomar las tareas. Los lotes emergidos y en crecimiento se encuentran en recuperación con los aportes de humedad.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, han ocurrido precipitaciones, con una variada distribución y volumen. En general, resultan muy beneficiosas para aliviar el déficit hídrico, aunque es necesaria la continuidad en las mismas. El cultivo en general, presenta buen estado ya que su rusticidad le confiere mayor resistencia a las adversidades. Respecto al estado fenológico, la mayoría de la superficie se encuentra en floración largando los primeros clavos.

En la provincia de La Pampa, el cultivo implantado presenta buen estado con los primeros lotes sembrados ya en la etapa de floración.

En la región del NOA, la implantación se encuentra en sus etapas finales.



POROTO

Las últimas precipitaciones ocurridas en la región del NOA, han permitido iniciar la siembra. Si bien se ha comenzado con las distintas variedades en zonas puntuales de la provincia de Salta, se estima que en los próximos días se incorpore lentamente superficie de la provincia de Jujuy.

En Santiago del Estero, también se avanza con la implantación, aunque el avance es lento ya que la prioridad de siembra la tiene el cultivo de maíz.

SOJA



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial. Sin embargo, la distribución y los volúmenes caídos fueron muy variables, existiendo zonas que aún se mantienen en déficit hídrico. En la mayoría de los casos estas precipitaciones han resultado beneficiosas para el cultivo de soja de primera, y muchos planteos han podido recuperarse y continuar con el proceso de floración ya que el tipo de floración indeterminada así lo permite.

Las sojas de segunda son las más afectadas por el efecto de las altas temperaturas y la escasez hídrica; la siembra se ha realizado en la mayoría de los casos con humedad insuficiente en los perfiles y la emergencia se ha visto afectada provocando lotes ralos y machoneados. El crecimiento también se ha visto alterado y se observan plantas de bajo porte y aunque este nuevo aporte hídrico es muy bienvenido para estos últimos planteos, el panorama es poco propicio.

En cuanto al estado sanitario, las lluvias ocurridas han permitido reducir la población de arañuela, aunque se continúan realizando monitoreos y controles.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, y si bien, en general, fueron de muy buenos volúmenes, hubo zonas donde las mismas resultaron muy desparejas y todavía existen áreas en donde la humedad edáfica se encuentra en niveles regulares.



Esta situación se refleja en el estado del cultivo, tanto de primera como de segunda ocupación, y que en general presenta muy buenas condiciones, en las zonas de déficit, el cultivo se presenta manchoneado y con un estado regular. En cuanto a la fenología, las sojas de primera se encuentran entre finales de floración e inicios de llenado, mientras que las de segunda se encuentran ingresando a la floración.

Se ha detectado presencia de isocas defoliadoras para lo que se realizan los controles correspondientes.



Durante la última semana se han registrado algunas precipitaciones dispares junto con un descenso de temperaturas, que han aportado un alivio temporal ante la situación de estrés hídrico y calórico tolerado por el cultivo. La condición de las parcelas varía según historial, barbecho y tecnología aplicada y los mejores lotes han podido responder mejor a las condiciones climáticas desfavorables. Sin embargo, se mantiene la necesidad de lluvias significativas para sostener el desarrollo del cultivo en su etapa reproductiva.



Las precipitaciones ocurridas durante esta semana permiten atenuar el efecto de la prolongada sequía registrada en el último tiempo.

Las sojas de primera ya transitan etapas críticas que van entre floración y llenado, mientras que la mayoría de los planteos de segunda se encuentran en etapas vegetativas, con un estado de bueno a regular, con plantas de bajo porte y amarillentas.

Se reporta presencia de chinches y arañas.



Las precipitaciones ocurridas en la semana informada, permitieron el alivio al estrés hídrico y calórico que presentaba el cultivo. Los primeros lotes implantados se encuentran en floración en mejor estado que los últimos sembrados, que se encuentran en etapas vegetativas. Se reportan intensos ataques de tucuras en la zona sur de la provincia, junto con presencia araña y orugas defoliadoras, para lo que se están realizando los controles correspondientes.





Nuevamente han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial, con variada distribución y milimetraje, que en la mayoría de los casos contribuyeron a mejorar el estado de los planteos que ya manifestaban síntomas de estrés hídrico y calórico.

En la zona norte de la provincia abarcando las delegaciones de Avellaneda y Rafaela, el cultivo transita etapas que van desde vegetativas hasta llenado para los primeros lotes sembrados. Las sojas de primera presentan buen estado general, aunque los grupos cortos, presentan un estado regular por haber transcurrido etapas críticas en ausencia de humedad. Las sojas de segunda, se encuentran en etapas entre vegetativas y reproductivas. Aquellos lotes con menor aptitud agrícolas presentan baja densidad de plantas y amarillamiento. Se detectó presencia de arañuela y orugas defoliadoras para lo que se realizan los correspondientes controles.

En la zona de Cañada de Gómez, las sojas de primera presentan buen estado general transitando etapas entre R2 y R5. Se realizan controles para chinche, arañuela e isocas, junto con aplicaciones de fungicidas para enfermedades de fin de ciclo.

Hacia el sur, en áreas de la delegación Venado Tuerto las precipitaciones fueron escasas y la situación comienza a ser crítica. Las sojas de primera presentan un aspecto regular con un importante aborto floral. Las sojas de segunda tienen escaso desarrollo.



Nuevamente se han registrado precipitaciones en todo el ámbito provincial, que colaboran al buen desarrollo del cultivo implantado.



Han vuelto a ocurrir precipitaciones en todo el ámbito provincial, con mayor preponderancia en el oeste. Estas lluvias permitieron la mejora en el estado del cultivo que presentaba marcados síntomas de estrés. Los nacimientos han sido adecuados y la mayoría de los lotes se encuentra en etapas vegetativas factibles de recuperación.





Luego de las últimas precipitaciones ocurridas en las provincias de Salta y Jujuy, se pudo avanzar en la siembra cubriendo una importante superficie. Los lotes emergidos y en crecimiento se recuperan con los aportes de humedad y presentan buen estado general.

En la provincia de Tucumán, las precipitaciones han mejorado el estado de humedad en los perfiles y actualmente se encuentran entre adecuados y regulares. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran en floración presentando un estado general bueno.

SORGO GRANÍFERO



Al igual que en el caso del maíz, las irregulares lluvias permitieron una mejora en la condición del cultivo en los lugares con mayores registros. De todas maneras, al ser un cultivo más resistente al déficit hídrico tolera un poco mejor la falta de agua. Las etapas fenológicas predominantes son floración y llenado de granos.



En general, el cultivo presenta un buen estado, comenzando la etapa reproductiva de floración.



El 40% de los lotes ya se encuentra en llenado de grano. Se observan ataques de pulgón y de isoca cogollera que se están controlando.





En la zona norte, perteneciente a la delegación Avellaneda, se está completando la siembra. Los sorgos más adelantados están en etapa de maduración. En el área centro-norte provincial los lotes continúan siendo favorecidos por las precipitaciones, permitiendo que el desarrollo vegetativo, la floración y el inicio del llenado de granos transiten con menor estrés. Se observan lotes puntuales de menor aptitud agrícola como consecuencia del estrés sufrido, observándose plantas con menor desarrollo. Se realizan aplicaciones contra pulgón amarillo.




En la zona de Quimilí prosigue la siembra del sorgo, sólo un poco más atrasada con respecto a otros años. Aumentó la superficie pero no tanto por falta de cantidad de semilla. Se observan buenos nacimientos.



En las provincias de Salta y Jujuy se mantiene el avance de la siembra beneficiado por las lluvias y luego de superar los problemas de falta de piso. El cereal se encuentra entre etapas de emergencia y crecimiento.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	98	99	99	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	366.500	100	100	100	100	100	100	366.500
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	408.177	99	99	100	100	100	100	408.177
25 de Mayo	164.493	96	98	99	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES	24/25	99,6	99,7	99,9	100	100	100	3.038.020
	23/24	97	98	99	99	100	100	
Laboulaye	427.616	85	95	98	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	437.000	100	100	100	100	100	100	437.000
Río Cuarto	665.750	98	100	100	100	100	100	665.750
San Francisco	572.000	81	93	97	97	100	100	572.000
Villa María	442.000	82	92	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA	24/25	90	96	99	99	100	100	2.544.366
	23/24	84	93	98	99	100	100	
Paraná	127.700	94	99	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	98	99	99	99	100	100	305.000
ENTRE RÍOS	24/25	97	99	99	99	100	100	432.700
	23/24	90	92	96	97	99	100	
General Pico	476.600	90	95	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	90	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA	24/25	90	97	100	100	100	100	726.600
	23/24	92	95	97	99	100	100	
Avellaneda	51.400	7	7	7	40	86	93	47.802
Cañada de Gómez	183.000	92	97	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	98	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE	24/25	92	94	94	96	99	99,6	873.502
	23/24	79	83	85	93	96	99	
CATAMARCA	8.450	20	25	45	70	100	100	8.450
CORRIENTES	11.100	82	82	82	88	88	88	9.768
CHACO (Charata)	84.500			13	26	45	70	59.150
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	7	7	7	43	43	43	70.476
FORMOSA	37.100	5	5	13	40	42	42	15.582
JUJUY	12.049				25	46	60	7.229
MISIONES	23.510	93	95	97	97	97	97	30.565
SALTA	364.206	3	22	33	43	49	70	254.944
SAN LUIS	351.500	94	98	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	120.500	8	9	15	40	45	88	106.040
STGO. ESTERO (Quimilí)	526.610	10	17	64	67	67	80	421.288
TUCUMÁN	61.930	15	25	45	68	97	100	61.930
TOTAL PAÍS	24/25	82	86	90	92	94	96	9.012.111
	23/24	79	84	88	93	95	97	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	
Bolívar		2.165	100	100	100	100	100	100	2.165	
Bragado		4.300	100	100	100	100	100	100	4.300	
Junín		3.000	100	100	100	100	100	100	3.000	
Lincoln		24.800	100	100	100	100	100	100	24.800	
Pehuajó		13.700	100	100	100	100	100	100	13.700	
Salliqueló		5.000	100	100	100	100	100	100	5.000	
25 de Mayo		450	100	100	100	100	100	100	450	
BUENOS AIRES		53.415	100	100	100	100	100	100	53.415	
CATAMARCA		1.000	100	100	100	100	100	100	1.000	
Laboulaye		100.207	100	100	100	100	100	100	100.207	
Marcos Juárez		29.500	100	100	100	100	100	100	29.500	
Río Cuarto		139.700	100	100	100	100	100	100	139.700	
San Francisco		14.500	90	97	100	100	100	100	14.500	
Villa María		58.400	100	100	100	100	100	100	58.400	
CÓRDOBA		342.307	100	100	100	100	100	100	342.307	
JUJUY		400	20			30	60	80	320	
Gral Pico		36.900	100	100	100	100	100	100	36.900	
Santa Rosa		1.540	100	100	100	100	100	100	1.540	
LA PAMPA		38.440	100	100	100	100	100	100	38.440	
SALTA		3.414	43			78	84	100	3.414	
SAN LUIS		18.250	100	100	100	100	100	100	18.250	
SANTA FE		15.000	100	100	100	100	100	100	15.000	
SANTIAGO DEL ESTERO		300				100	100	100	300	
TUCUMAN		1.450	100	100	100	100	100	100	1.450	
TOTAL PAÍS		24/25 23/24	473.976 433.896	99 98	99 99	99,5 99	99,6 99,7	99,6 99,9	99,8 100	473.893

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	1ª	188.500	100	100	100	100	100	100	188.500
	2ª	122.000	30	80	82	90	100	100	122.000
Bragado	1ª	289.800	100	100	100	100	100	100	289.800
	2ª	198.700	85	90	90	100	100	100	198.700
General Madariaga	1ª	49.900	100	100	100	100	100	100	49.900
	2ª	44.600	61	84	100	100	100	100	44.600
Junín	1ª	339.550	100	100	100	100	100	100	339.550
	2ª	178.500	80	100	100	100	100	100	178.500
La Plata	1ª	46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
	2ª	19.000	60	75	80	85	95	100	19.000
Lincoln	1ª	524.000	100	100	100	100	100	100	524.000
	2ª	186.000	92	98	100	100	100	100	186.000
Pehuajó	1ª	432.548	100	100	100	100	100	100	432.550
	2ª	109.942	100	100	100	100	100	100	109.940
Pergamino	1ª	462.550	100	100	100	100	100	100	462.550
	2ª	265.750	100	100	100	100	100	100	265.750
Pigüé	1ª	88.000	100	100	100	100	100	100	88.000
	2ª	67.000	50	100	100	100	100	100	67.000
Salliqueló	1ª	151.000	100	100	100	100	100	100	151.000
	2ª	61.000	42	55	60	74	96	96	58.800
Tandil	1ª	270.000	100	100	100	100	100	100	270.000
	2ª	350.000	73	85	85	100	100	100	350.000
Tres Arroyos	1ª	187.397	100	100	100	100	100	100	187.400
	2ª	255.977	70	88	100	100	100	100	255.980
25 de Mayo	1ª	262.808	100	100	100	100	100	100	262.810
	2ª	166.958	50	75	90	100	100	100	166.960
BUENOS AIRES	24/25	5.317.480	90	96	97	99	99,9	99,96	5.315.290
	23/24	5.180.208	80	92	96	99	100	100	
Laboulaye	1ª	589.030	100	100	100	100	100	100	589.030
	2ª	63.915	45	65	90	100	100	100	63.915
Marcos Juárez	1ª	730.600	100	100	100	100	100	100	730.600
	2ª	151.400	100	100	100	100	100	100	151.400
Río Cuarto	1ª	1.001.430	100	100	100	100	100	100	1.001.430
	2ª	120.000	100	100	100	100	100	100	120.000
San Francisco	1ª	901.000	93	96	98	99	100	100	901.000
	2ª	220.411	88	96	98	99,7	99,9	100	220.411
Villa María	1ª	710.700	100	100	100	100	100	100	710.700
	2ª	169.800	80	95	100	100	100	100	169.800
CÓRDOBA	24/25	4.658.286	97	98	99	99,8	100	100	4.658.286
	23/24	4.136.553	92	98	99	100	100	100	
Paraná	1ª	169.500	100	100	100	100	100	100	169.500
	2ª	166.900	86	99	100	100	100	100	166.900
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100	414.000
	2ª	400.000	98	99	100	100	100	100	400.000
ENTRE RÍOS	24/25	1.150.400	97	100	100	100	100	100	1.150.400
	23/24	1.091.400	76	82	97	98	99	99	

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
			%	%	%	%	%	%	
General Pico	1ª	408.400	100	100	100	100	100	100	408.400
	2ª	40.300	50	100	100	100	100	100	40.300
Santa Rosa	1ª	94.500	100	100	100	100	100	100	94.500
	2ª	4.500	50	100	100	100	100	100	4.500
LA PAMPA	24/25	547.700	96	100	100	100	100	100	547.700
	23/24	541.300	85	93	98	100	100	100	
Avellaneda	1ª	254.700	40	51	84	92	100	100	254.700
	2ª	80.900	54	66	89	100	100	100	80.900
Cañada de Gómez	1ª	560.000	100	100	100	100	100	100	560.000
	2ª	280.000	94	97	100	100	100	100	280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100	529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100	132.000
Rafaela	1ª	544.500	100	100	100	100	100	100	544.500
	2ª	438.300	90	92	98	100	100	100	438.300
Venado Tuerto	1ª	469.000	100	100	100	100	100	100	469.000
	2ª	130.000	95	100	100	100	100	100	130.000
SANTA FE	24/25	3.418.400	92	94	98	99	100	100	3.418.400
	23/24	3.060.735	91	96	99	99	100	100	
CATAMARCA	1ª	21.450	75	85	100	100	100	100	21.450
	2ª	20.000	75	85	100	100	100	100	20.000
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	3.100
	2ª	4.000	85	87	100	100	100	100	4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	11	17	27	44	69	88	264.550
	2ª	49.000	21	32	50	77	94	100	49.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	274.950	29	53	100,0	100	100	100	274.950
	2ª	41.750	28	53	100	100	100	100	41.750
FORMOSA	1ª	17.000	30	55	100	100	100	100	17.000
	2ª	1.100	30	54	100	100	100	100	1.100
JUJUY	1ª	5.312	22	35	45	50	72	92	4.910
	2ª	5.197	24	32	42	50	74	93	4.820
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100	4.320
SALTA	1ª	284.752	20	46	57	78	83	100	284.750
	2ª	30.033	21	51	74	100	100	100	30.030
SAN LUIS	1ª	269.800	100	100	100	100	100	100	269.800
	2ª	1.800	75	90	100	100	100	100	1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	75	90	100	100	100	100	193.230
	2ª	109.850	85	88	100	100	100	100	109.850
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.200	71	91	98	98	98	100	762.200
	2ª	282.070	65	84	94	96	96	100	282.070
TUCUMÁN	1ª	106.800	90	100	100	100	100	100	106.800
	2ª	78.220	100	100	100	100	100	100	78.220
TOTAL PAÍS	24/25	17.960.099	88	93	96	98	99	99,8	17.919.780
	23/24	16.564.537	80	89	95	98	99	99	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	95	98	98	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.316	100	100	100	100	100	100	3.316
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25 23/24	122.243 109.293	99 92	99,8 97	99,8 98	100 100	100 100	100 100	122.243
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	16.300	100	100	100	100	100	100	16.300
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	92	95	97	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25 23/24	135.170 116.303	96 86	98 94	99 97	100 99	100 99,7	100 99,8	135.170
Paraná	39.300	99	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	97	98	99	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	98 94	99 96	99 98	100 98	100 100	100 100	117.600
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25 23/24	26.000 22.900	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	26.000
Avellaneda	53.300	35	43	54	60	86	91	48.503
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25 23/24	236.350 182.448	85 87	87 93	90 95	91 96	97 96	98 99	231.553
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000			36	51	71	87	47.850
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	10	21	47	61	61	61	34.288
FORMOSA	38.000	8	15	50	60	63	63	23.940
JUJUY	3.010					31	51	1.535
SALTA	39.158		6	26	52	57	87	34.067
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	74	85	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	111.460	4	12	50	51	53	80	89.168
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.057.421 827.086	67 65	70 71	81 78	85 83	88 91	93 93	980.644

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>	
CORRIENTES	LA	14.800					11	22		3.256	
	LF	95.800					17	28			
T. CORRIENTES		110.600					16	27		30.080	
R. S. Peña	LA	0									
	LF	3.500									
T. CHACO		3.500									
PARANA	LA	2.200									
	LF	24.520									
T. PARANÁ		26.720									
R. DEL TALA	LA	6.000									
	LF	39.000									
T. R.DEL TALA		45.000									
T. ENTRE RÍOS		71.720									
FORMOSA	LA	0									
	LF	14.400									
T. FORMOSA		14.400									
AVELLANEDA	LA	1.500									
	LF	12.100									
T. AVELLANEDA		13.600									
RAFAELA	LA	400									
	LF	15.500									
T. RAFAELA		15.900									
T. SANTA FE		29.500									
TOTAL PAÍS	LA	24.900					7	13		3.256	
	LF	204.820					8	13			
TOTAL PAÍS		24/25 23/24	229.720 202.450					8 0	13 0		30.080

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	94.800								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	57.098								
BUENOS AIRES 24/25	1.063.944	0	0	0	0	0	0		
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	21.900								
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.000								
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25	143.537	0	0	0	0	0	0		
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0		
Paraná	5.400				19	64	83		4.482
Rosario del Tala	15.400						10		1.540
ENTRE RÍOS 24/25	20.800	0	0	0	5	17	29		6.022
23/24	9.850	0	0	0	0	25	51		
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25	258.900	0	0	0	0	0	0		
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	133.800	2	18	33	55	63	70	500	93.760
Cañada de Gómez	20.000								
Casilda	3.000								
Rafaela	78.050					8	26		20.170
Venado Tuerto	1.500								
SANTA FE 24/25	236.350	1	10	19	31	51	48	500	113.930
23/24	210.300	30	48	53	55	66	79		
CATAMARCA	50								
CORRIENTES	1.620					38	55		890
CHACO (Charata)	62.000	2	9	55	80	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	9	18	52	84	100	100		86.150
FORMOSA	2.200						100		2.200
SALTA	375								
SAN LUIS	74.050								
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	25.385						0,5		110
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25	1.978.461	1	2	6	10	12	14	500	271.302
23/24	1.857.963	4	7	9	10	13	15		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/01/2025 al 30/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	90	10	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	70	30	-	26	74	-	-	A
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	70	30	-	-	84	16	-	A/R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
	LA PLATA	-	-	80	20	-	40	60	-	-	R/PS
	LINCOLN	-	-	68	32	-	-	96	4	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	53	47	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	1	50	49	-	-	75	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	41	41	18	-	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	83	17	-	-	100	-	-	R
	TRES ARROYOS	-	-	61	39	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	100	-	28	72	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	70	30	-	35	55	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	4	41	55	-	-	91	9	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
	SAN FRANCISCO	-	16	56	28	-	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	10	90	2	98	-	-	R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	30	70	-	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	15	85	36	52	12	-	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	49	51	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R/PS
	RAFAELA	-	-	-	59	41	36	51	11	2	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	38	32	30	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	44	44	12	-	-	100	-	-	A/R/PS
	QUIMILÍ	-	-	-	44	56	-	88	12	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/01/2025 al 30/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	29	71	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	17	83	-	-	-	100	-	-	R
	BRAGADO	-	28	72	-	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	32	51	17	-	-	73	27	-	A/R/PS
	JUNÍN	-	10	10	80	-	-	49	51	-	A/R
	LA PLATA	-	30	65	5	-	20	70	10	-	R/PS
	LINCOLN	-	37	5	58	-	-	77	23	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	13	26	61	-	17	47	23	13	A/R/PS
	PERGAMINO	-	32	-	59	9	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	65	30	5	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	54	35	11	-	-	78	22	-	A/R
	TANDIL	-	23	77	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	4	80	16	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	30	30	41	-	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	50	40	10	-	40	55	4	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	10	24	66	-	5	95	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	40	40	20	-	-	69	22	9	A/R
	SAN FRANCISCO	-	53	29	18	-	4	75	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	50	50	-	-	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	6	17	37	40	10	90	-	-	R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	5	10	65	20	30	60	10	-	PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	70	30	-	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	56	13	31	-	-	73	27	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	15	78	-	3	4	9	85	5	1	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	26	-	60	14	55	40	5	-	A/R/PS
	CASILDA	-	17	-	83	-	33	49	18	-	R/PS
	RAFAELA	-	24	-	76	-	23	55	17	5	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	20	50	30	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	30	70	-	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	9	91	-	67	33	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	34	66	-	-	-	23	61	16	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	97	2	1	-	-	49	46	5	R/PS
JUJUY	JUJUY	35	65	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	40	50	-	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	20	80	-	-	-	-	71	29	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	50	31	19	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	19	81	-	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/01/2025 al 30/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	14	86	-	-	-	-	71	29	-	5	95	-	-	-	-	73	27	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	49	33	18	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	2	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	9	91	-	-	-	-	100	-	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	23	77	-	-	-	100	-	-	-	25	75	-	-	-	100	-	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

