

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

6 de febrero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 6 de febrero de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 06/02/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han acumulado milimetrajes más típicos de verano en la zona núcleo, especialmente en las últimas 48hs. Los máximos de este período corresponden a Laboulaye 121mm, Venado Tuerto 86mm, Nueve de Julio 75mm, Junín 65mm y Rosario 46mm. Durante el miércoles 5 siguen registrándose algunas lluvias. En el centro del país, NOA y Patagonia las precipitaciones de los últimos 7 días han sido escasas o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 29/01/2025 al 04/02/2025

Durante el jueves y el sábado se esperan algunos acumulados en provincias del NEA y NOA, además de algunas localidades del norte de Santa Fe. El avance de un sistema de baja presión en la zona centro-sur del país, ocasionará lluvias de diversa intensidad entre domingo y martes de la próxima semana en Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe y algunas localidades del centro y este de La Pampa. Entre viernes y lunes se esperan precipitaciones y probabilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia, con posibilidad de algunos eventos en zona costera de Chubut y Santa Cruz.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en todo el territorio nacional, en especial en el centro y norte. En el norte las máximas superaron los 40°C en varias localidades. Esto también se registró en algunas áreas del norte patagónico, como Trelew y Neuquén. En Patagonia y áreas cordilleranas del NOA se registraron mínimas inferiores a 5°C.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 29/01/2025 al 04/02/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal para la época. Entre jueves y lunes de la próxima semana, se espera que luego del pasaje del frente las temperaturas comiencen a aumentar paulatinamente en toda la zona central y norte del país, donde se prevé que muchas localidades registren temperaturas sobre 35°C. Además, en este intervalo se esperan registros sobre 40°C en localidades del NOA. Entre sábado y lunes próximo se podrían sumar localidades de Córdoba y Santa Fe con registros sobre 40°C. Durante el martes se espera un leve descenso en las temperaturas de todo el país.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se observa una buena recuperación de las condiciones hídricas en la zona núcleo, tras las últimas lluvias. Las reservas actuales se estiman escasas, regulares o adecuadas, dependiendo de la unidad de suelo.

También el NOA mantiene en general condiciones adecuadas a óptimas de humedad en lotes de soja de primera, aunque la superficie de soja de primera es poca. La misma se concentra en la mitad este de Santiago del Estero, donde las reservas se estiman escasas a regulares.

Siguen en situación hídrica deficitaria el centro de Córdoba, Entre Ríos, sudeste de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y gran parte de Chaco y Formosa.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Durante la semana informada los registros pluviométricos fueron prácticamente nulos, y en aquellas zonas menos beneficiadas por las precipitaciones, el cultivo comienza a manifestar síntomas de estrés hídrico, como por ejemplo en la provincia de Chaco, donde las últimas lluvias representaron solamente un alivio temporal.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de la delegación Avellaneda, el cultivo implantado presenta una gran variabilidad respecto al estado general, dependiendo de la fecha de siembra y la zona. Los lotes implantados en los departamentos del este presentan un estado más crítico, con plantas de pequeño porte, y con marcados síntomas de estrés térmico y calórico, mientras que los planteos ubicados en los departamentos del oeste, si bien afectados, se encuentran con un estado entre regular y bueno, por poseer en la zona mayores reservas hídricas. Se han reportado ataques, controlados, de chinches, trips, pulgones, orugas y cochinilla. Se informa también, un incremento de la cantidad de individuos en las trampas para seguimiento de picudo del algodonero.

En la provincia de Santiago del Estero, han ocurrido algunas lluvias en la zona este provincial, que abarca a la delegación Quimilí. En general, las reservas hídricas en los suelos se encuentran entre regulares y adecuadas, pero a pesar de ello, las muy elevadas temperaturas ocurridas durante los últimos días, impactan en el cultivo que refleja síntomas de estrés.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, han ocurrido algunas precipitaciones que no impidieron continuar con la cosecha. Las labores se realizan con un ritmo entre moderado y lento, y el avance es mínimo. Los rendimientos de la variedad Largo Fino, comienzan a mejorar en función del incremento de superficie cosechada.

En la zona centro y norte y de la provincia de Santa Fe, abarcando áreas correspondientes a las delegaciones Avellaneda y Rafaela, el cultivo para ambas variedades, transita etapas entre floración e inicios de llenado, con muy buen estado general. Sin presencia de plagas o enfermedades.



GIRASOL



Durante la semana informada se han producido precipitaciones muy variadas en cuanto a la distribución y los volúmenes caídos. Sin embargo, las elevadas temperaturas que marcaron prácticamente todo el territorio nacional han incrementado la evapotranspiración trayendo como consecuencia un desecamiento de los perfiles edáficos. En general, el cultivo presenta buen estado, sin manifestar síntomas de estrés, aunque los primeros lotes sembrados que ya se encuentran atravesando la etapa crítica de llenado, ya se encuentran afectados en el rendimiento potencial al carecer de humedad necesaria para atravesar esta etapa definitoria. En el aspecto sanitario, no se informan presencia de plagas ni enfermedades.



El cultivo implantado en la provincia presenta muy buenas condiciones, donde cerca del 90% de los lotes se encuentran con un estado general entre muy bueno y bueno. No se informan inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades, y en el aspecto fenológico, aproximadamente el 50% de los planteos ya se encuentran en floración. En las zonas de San Francisco y Marcos Juárez, cerca del 10% de la superficie implantada se encuentra en madurez, y se estima que durante los próximos días se inicien las labores de cosecha.



Ya ha finalizado la cosecha en la zona de la delegación Paraná. Los resultados obtenidos son de muy buenos a buenos. El promedio final de rendimiento se acercaría a los 22 qq/ha. En esta campaña la superficie dedicada a girasol tuvo un incremento que en algunas zonas resultó significativo respecto del año anterior.





Han ocurrido precipitaciones en todo el ámbito provincial, con mayor presencia en la zona norte abarcando la delegación General Pico. Los lotes implantados presentan muy buen estado general, y se encuentran en etapas que van desde plena floración hasta inicios de llenado para los más adelantados.



Se prosigue con la cosecha en la zona centro y norte de la provincia, encontrándose mas avanzando en esta última región, comprendida por la delegación Avellaneda. Los rendimientos obtenidos son muy buenos, y para la zona de Rafaela, los valores promedio oscilan entre los 22 y los 26 qq/ha. Algo más al sur, en ámbitos de la delegación Cañada de Gómez, también se ha iniciado la cosecha, con muy buenos valores de rendimiento, que a la fecha promedian los 28 qq/ha.



Continúa avanzando la cosecha en los departamentos del centro y norte de la delegación Quimilí. Por ser estos lotes los primeros sembrados y en condiciones algo adversas, los rendimientos obtenidos son bajos, con valores entre los 9 y los 12 qq/ha, que se encuentran dentro de lo esperado dadas las condiciones que marcaron el desarrollo del cultivo.

MAÍZ



Las precipitaciones ocurridas durante la última semana, transcurren en un escenario de elevadas temperaturas, en donde el incremento de la evapotranspiración continúa provocando el desecamiento de la humedad en los perfiles edáficos. Los maíces de siembra temprana han pasado la etapa crítica de



floración bajo condiciones de déficit hídrico, por lo que es inviable la recuperación de los mismos, y en muchos casos se evalúa la posibilidad de picado y su utilización como recurso forrajero.

Los de siembra mas tardía, presentan una amplia variedad en el estado de los lotes, dependiendo de la fecha de siembra y condiciones previas del lote, por lo que se observan lotes que van desde buenos a malos en todas las variables. Si bien el estado es mejor que los de siembra temprana, se estima que los rendimientos no serán óptimos y que la potencialidad de los mismos ya se encuentra afectada.

Los maíces de segunda ocupación, se encuentran en etapas vegetativas, y una importante superficie ha sido implantada con escasa humedad, por lo que el crecimiento ha sido escaso, si bien, tienen posibilidades de recuperación, se estima que a pesar de ello, estos no alcanzarían el rendimiento potencial.



El cultivo implantado a nivel provincial se encuentra en términos generales en buen estado. Los lotes de siembra temprana se encuentran en la etapa de llenado, la falta de humedad junto con las elevadas temperaturas ha acelerado los procesos dando como resultado granos más livianos y por ende menor rendimiento. Se realiza el picado de lotes con destino forrajero.

Para el caso de los lotes de siembra tardía o de segunda ocupación, estos atraviesan etapas entre vegetativas e inicios de floración, por lo que es necesaria la ocurrencia de precipitaciones para atravesar esta etapa crítica sin limitaciones.

En el aspecto sanitario, no se ha reportado la presencia de chicharrita, ni otros insectos del cultivo, malezas o enfermedades, en niveles significativos.



Dadas las altas temperaturas y escasez hídrica el cultivo transcurre las etapas vegetativas ante condiciones de estrés. Se espera que en los próximos días ocurran precipitaciones para permitir la mejora en el estado del cultivo, así como también continuar con la siembra.



Continúa la cosecha en el ámbito de la delegación Paraná. Los rendimientos registrados son de buenos a muy buenos, con valores promedios para



la región noroeste próximos a las 62 qq/ha. Para el caso de los lotes de segunda, estos atraviesan etapas entre vegetativas y hasta en R1-R2, mejorando la condición particularmente en las zonas donde las últimas lluvias ocurridas tuvieron los mejores registros. De todas maneras, los lotes están soportando una continuidad de días con muy elevadas temperaturas diurnas, lo que está perjudicando notablemente la condición general del cultivo. Se menciona con especial cuidado que en los últimos informes de la Red de monitoreo de la población de chicharrita se anuncia la presencia de *Dalbulus maidis* en sitios muestreados, recomendando el incremento de las acciones de monitoreo.



En la zona norte provincial, que abarca la delegación General Pico, han ocurrido algunas precipitaciones que alcanzaron hasta los 50mm, que han resultado muy beneficiosas para el cultivo implantado. Los lotes de primera continúan transitando el periodo de floración con los más adelantados ya en llenado, mientras que el resto continua en pleno crecimiento vegetativo siendo estos los más beneficiados por las lluvias.

En la zona sur, en ámbitos de la delegación Santa Rosa, fueron escasas las precipitaciones ocurridas, que junto a las elevadas temperaturas, han afectado a los lotes de primera, de siembra temprana, que se encuentran atravesando la etapa de llenado. Los de primera de siembra tardía, que se encuentran en etapas entre V12 y V14, son los que presentan mejor estado general. Por otro lado, los cuadros de segunda ocupación, que actualmente se encuentran en V8, y que han sido sembrados con muy poca humedad, presentan poco desarrollo y muestran marcados síntomas de estrés, así como también ataques de tucuras.



Si bien han ocurrido precipitaciones durante la semana, las no fueron generalizadas, por lo que hay zonas donde es imperante la ocurrencia de nuevos aportes hídricos. En aquellas zonas donde las condiciones lo permiten, se están realizando fertilizaciones, mientras que se realiza el picado de aquellos lotes con destino forrajero.





Solamente se registraron precipitaciones en la zona de la delegación Rafaela, mientras que en el resto de la provincia los registros fueron nulos.

En la zona norte, que comprende a la delegación Avellaneda, los maíces de primera se encuentran en madurez, perdiendo humedad. Los lotes cosechados tuvieron rendimientos que promediaron los 35 qq/ha. En el caso de los maíces tardíos, la siembra se encuentra paralizada por la escasez de humedad, y se estima que de no ocurrir precipitaciones en los próximos días, la superficie podría verse afectada.

En la zona de Rafaela, los maíces tempranos presentan muy buen estado general, y atraviesan etapas entre llenado e inicio de madurez. Los lotes de maíces de siembra tardía, se encuentran en etapas vegetativas, en condiciones variables, entre buenos y regulares dependiendo de la localización de los lotes. Se continúan monitoreando la presencia de chicharrita.

En la zona de Cañada de Gómez, los maíces tempranos se encuentran finalizando la etapa de llenado con muy buenas perspectivas de rendimiento. Los lotes de segunda ocupación se encuentran en etapas vegetativas, sin presencia de chicharrita. Se realizan aplicaciones de fertilizante y de control de malezas.

En la zona de Casilda, las adversas condiciones con elevadas temperaturas y escasez hídrica, han acelerado los procesos hacia el final de la etapa de llenado de los maíces de siembra temprana, por lo que se estima que habiéndose afectado el peso de los granos, el rendimiento potencial podría sufrir mermas considerables. Los maíces de siembra tardía aún se encuentran en etapas vegetativas y si bien se encuentran afectados por las condiciones antes mencionadas, tienen posibilidades de recuperación si se producen precipitaciones en el corto plazo. Con mayor severidad, dada la prolongada ausencia de precipitaciones de importancia, se replica la misma situación para los planteos ubicados en áreas de la delegación Venado Tuerto.



Solamente se registraron precipitaciones en el este provincial lo que abarca la delegación Quimilí, lo que posibilitó el avance de las labores de siembra pudiendo finalizar con la superficie estimada. Los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas vegetativas presentando síntomas de estrés fundamentalmente por las elevadas temperaturas, a pesar de poseer adecuada humedad edáfica. No se reporta achaparramiento por el complejo de enfermedades transmitidas por la chicharrita.



En la zona oeste, en los departamentos pertenecientes a la delegación Santiago del Estero, todavía se prosigue con la siembra de los últimos lotes. Los primeros sembrados, se encuentran en activo crecimiento, y se realizan intensos monitoreos y seguimientos de la población de chicharrita.



Luego de las precipitaciones, y la mejora en el estado de humedad de los suelos, se ha avanzado en la siembra en las provincias de Salta y Jujuy, en donde se estima que las labores finalicen en los próximos días. Los primeros lotes sembrados se encuentran en crecimiento recuperados por los últimos aportes hídricos.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Córdoba, se encuentra en general en buenas condiciones. En aquellas regiones donde ocurrieron precipitaciones, se los observa recuperados, aunque todavía son necesarios nuevos aportes hídricos a fin de morigerar la merma en rendimiento de aquellas zonas más afectadas por el déficit hídrico. El estado fenológico es llenado de grano. En cuanto a la sanidad, se realizan aplicaciones de fungicidas, y monitoreo por presencia de arañuela, hasta la fecha en cantidades por debajo de los umbrales de daño.

En la provincia de La Pampa, los lotes continúan su desarrollo, en buen estado general, próximos a iniciar la etapa de floración.

En la zona del NOA, los lotes implantados presentan buen estado general, en pleno crecimiento vegetativo.

POROTO

Se ha iniciado la siembra en la provincia de Jujuy, con una escasa superficie implantada, ya que las elevadas temperaturas y los próximos pronósticos de precipitaciones incidieron en la decisión de no avanzar con las labores. Una similar situación ocurre en la provincia de Salta, en donde ya se han sembrado variedades de porotos pallares, mung y negro, quedando relegada la siembra de los porotos alubias. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia.

En la zona este de la provincia de Santiago del Estero, se ha iniciado la siembra, principalmente de poroto negro. Los primeros lotes sembrados presentan buenos nacimientos.



Hacia el oeste, en ámbitos de la delegación Santiago del Estero, la siembra se encuentra muy avanzada, y se estima que ya se ha implantado cerca del 70% de la superficie estimada.

SOJA



La semana informada se ha caracterizado por las elevadas temperaturas y la casi nula ocurrencia de precipitaciones ya que las lluvias registradas fueron puntuales y de bajo volumen. Si bien repercuten en las reservas hídricas, han resultado muy oportunas para atenuar el efecto ambiental en aquellos lotes de soja de primera, que ya comenzaban a manifestar síntomas de estrés con pérdida de flores y vainas. De ocurrir nuevas y generalizadas precipitaciones en los próximos días, este cultivo tiene grandes chances de recuperación. En términos generales, las sojas de primera presentan condiciones entre buenas y regulares, con la mayoría de los lotes entre plena floración y llenado.

La situación para los lotes de soja de segunda es diferente ya que inicialmente han presentado inconvenientes en la emergencia, por lo que los lotes son ralos y manchoneados. El crecimiento en tales condiciones fue escaso y se considera que las mermas en el rendimiento podrían llegar a ser relevantes, aun teniendo en cuenta que aunque las condiciones climáticas mejoren, el cultivo tiene acotadas posibilidades de recuperación.



En el sur provincial, correspondiente con la delegación Laboulaye, se registraron algunas precipitaciones con volúmenes que no superaron los 25mm. Los lotes de soja de primera se encuentran en buen estado, atravesando la etapa de plena floración con incremento de la demanda hídrica, por lo que se muestran incipientes síntomas de estrés. Las sojas de segunda, continúan su evolución en pleno desarrollo vegetativo.

En la zona de la delegación Marcos Juárez, la humedad en el perfil es regular, y el estado de los lotes de soja de primera es variable, en condiciones entre buenas y regulares, dependiendo de la zona, calidad de suelo y manejo de lotes. La mayoría de los lotes se encuentra en floración. Se realizan aplicaciones para control de isocas, trips y arañuela. La soja de segunda, tiene un estado regular, con poco desarrollo.



En la zona de Río Cuarto, es imperante la ocurrencia de lluvias en el corto plazo para evitar la pérdida de lotes, tanto de soja de primera como de segunda, que ya presentan pérdida de flores y vainas, y baja tasa de crecimiento.

En la zona de Villa María, el cultivo en general, evoluciona en buen estado general. Las sojas de primera se encuentran en tapas entre R3 y R4, mientras que las de segunda en etapas vegetativas, con las más adelantadas en R1. Se realizan aplicaciones para control de isocas y chinches.



Las altas temperaturas junto con la escasez hídrica, actúan en detrimento de las expectativas, que durante el establecimiento del cultivo eran mayores. Este contexto se ve reflejado en lotes que presentan pérdidas de plantas y manchoneos. Sin embargo, la situación no es generalizada, ya que aún hay lotes en muy buenas condiciones.



Durante la última semana no se han registrado lluvias. Los lotes en este escenario de sequía también han tenido que soportar una continuidad de días con temperaturas máximas muy elevadas, la que en todos los casos está resultando en una caída en la condición general de los lotes. Las sojas de primera transitan etapas entre R3 y R4, y en el caso de las sojas de segunda, la mayoría de los lotes en etapas vegetativas con algunos lotes en R1 y R2, con una condición de buena a regular, con plantas de bajo porte y amarillentas.



En la zona norte provincial que comprende a la delegación General Pico las precipitaciones registradas durante la semana informada alcanzaron valores de hasta 50mm que fueron muy beneficiosas para el cultivo implantado que transcurre etapas entre floración, para los primeros sembrados y estados vegetativos para los últimos.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa las lluvias fueron menores, pero permitieron atenuar los efectos causados por las elevadas temperaturas. Los primeros lotes sembrados de soja de primera que se encuentran en R2/R3, presentan mejor estado que los últimos sembrados que se hallan en R1. Las sojas de segunda, presentan un estado regular, y están en etapas vegetativas, con crecimiento desparejo.



Se reportan intensos ataques de tucura, con algunos inconvenientes para su control, mientras que se realizan controles para arañuela y defoliadoras.



SANTA FE

En la zona de la delegación Avellaneda, el cultivo presenta una gran variabilidad de estados desde buenos a malos, dependiendo de la calidad de los lotes. Los de menor calidad presentan manchoneo y muerte de plantas causadas por el estrés hídrico-térmico. Es necesario que ocurran precipitaciones en el corto plazo a fin de atenuar las mermas y de ser factible poder realizar resiembras de lotes.

En la zona de Rafaela, las sojas de primera se encuentran en etapas que van desde floración hasta llenado para los más adelantados. La mayoría de los lotes presentan muy buenas condiciones, con excepción de aquellos grupos cortos que se vieron afectados en el periodo crítico y presentan un estado regular. Las sojas de segunda todavía se mantienen en buen estado, con una proporción de lotes entre regulares y malos a causa de las desiguales precipitaciones y la baja aptitud de los suelos. Se detectaron presencia de orugas cortadoras y arañuela, las que recibieron su tratamiento para ser controladas.

En la zona de Cañada de Gómez, las sojas de primera presentan buen estado general transitando etapas entre R2 y R5. Se continúan realizando controles para chinche, arañuela e isocas, junto con aplicaciones de fungicidas para enfermedades de fin de ciclo. Las sojas de segunda, se encuentran en etapas que van desde vegetativas hasta R3.

En Casilda las sojas de primera se encuentran en la etapa crítica de floración, por lo que son necesarios nuevos aportes hídricos a fin de evitar las pérdidas de flores y vainas. En aquellos lotes más retrasados en cerrar surcos se reporta la aparición de malezas como rama negra y yuyo colorado, así como presencia recurrente de trips y arañuela con tratamientos generalizados para su control. Las sojas de segunda, los lotes presentan una condición regular con escaso desarrollo vegetativo, y ya se encuentran ingresando a la etapa reproductiva.

Hacia el sur, en áreas de la delegación Venado Tuerto las sojas de primera se encuentran afectadas a causa de la escasa humedad y las elevadas temperaturas con importantes pérdidas de flores y vainas, y con ataques de arañuela. Los lotes de segunda, en condiciones entre regulares y malas, con escaso crecimiento y desarrollo.



SAN LUIS

Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada no fueron generalizadas y existen zonas donde se mantiene el déficit hídrico, por lo que es necesario



que ocurran nuevamente y con continuidad para conservar el buen estado del cultivo implantado.



En el oeste provincial no se registraron precipitaciones. Esta situación sumada a las elevadas temperaturas de estos últimos días, provocan la disminución del contenido hídrico de los suelos lo que impacta directamente en el estado del cultivo que se encuentra próximo a iniciar la etapa de floración.

En la zona de la delegación Quimilí, en el este provincial, se han registrado precipitaciones con valores de hasta 40mm. El estado del cultivo es bueno, con la mayoría de lotes en estados vegetativos. Si bien algunos lotes manifiestan síntomas de estrés a causa de las condiciones climáticas, de ocurrir precipitaciones en el corto plazo, el cultivo en esta etapa tiene muchas posibilidades de recuperación.



En la provincia de Jujuy el cultivo presenta buen estado general evolucionando en su crecimiento. A raíz de las últimas precipitaciones algunos lotes en las zonas bajas se encuentran afectados por anegamiento. Estas precipitaciones que también ocurrieron en la provincia de Salta y Tucumán, han permitido la recuperación de aquellos lotes que se encontraban afectados mostrando síntomas de estrés hídrico y térmico.

SORGO GRANÍFERO



Si bien las precipitaciones ocurridas durante la semana informada fueron puntuales y escasas, las características del cultivo que le confieren mayor resistencia a condiciones adversas, determinan que el estado general del cultivo sea entre muy bueno y bueno. La mayoría de los lotes se encuentra en etapas vegetativas, con una pequeña superficie correspondiente a los primeros lotes sembrados que se encuentran en etapas entre floración y llenado. No se informan inconvenientes sanitarios ni presencia relevante de plagas.





Los lotes implantados presentan muy buen estado general en donde la mayoría de la superficie se encuentra en etapas fenológicas entre vegetativas y floración, con una menor proporción ya en la etapa de llenado.



En la zona norte que abarca a la delegación Avellaneda, el cultivo se encuentra en estados entre buenos y malos, dependiendo de la condición de cada lote. La siembra de lotes de segunda ocupación se encuentra detenida debido a la falta de humedad en el suelo, mientras que los primeros sembrados se encuentran en la etapa de madurez, presentando síntomas de afectación a causa del estrés hídrico térmico, y por lo que se estima que una importante superficie tendrá destino forrajero. Se realizaron aplicaciones para control de pulgón amarillo.

Los lotes ubicados en áreas de las delegaciones Rafaela, Cañada de Gómez y Casilda también presentan una gran variabilidad en el estado, que en términos generales es bueno, evidenciándose las diferencias en las calidades de cada lote. Los estados fenológicos, dependientes de las fechas de siembra se hallan entre etapas vegetativas hasta llenado de granos.

En todos los casos se realizaron aplicaciones para control de pulgones.



Las últimas lluvias ocurridas en el este provincial abarcando a la delegación Quimilí, han permitido continuar y dar por finalizadas las labores de siembra. Los primeros lotes sembrados han emergido bien y presentan buenas condiciones generales.






Se ha finalizado la siembra en la provincia de Salta, mientras que se prosigue con las labores en Jujuy, estimándose que en los próximos días finalicen las mismas. Los primeros lotes sembrados presentan buen estado.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	99	99	100	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	366.500	100	100	100	100	100	100	366.500
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	408.177	99	100	100	100	100	100	408.177
25 de Mayo	164.493	98	99	100	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25	3.038.020	99,7	99,9	100,0	100	100	100	3.038.020
23/24	3.090.580	98	99	99	100	100	100	
Laboulaye	427.616	95	98	100	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	437.000	100	100	100	100	100	100	437.000
Río Cuarto	665.750	100	100	100	100	100	100	665.750
San Francisco	572.000	93	97	97	100	100	100	572.000
Villa María	442.000	92	100	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25	2.544.366	96	99	99	100	100	100	2.544.366
23/24	3.188.920	93	98	99	100	100	100	
Paraná	127.700	99	100	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	99	99	99	100	100	100	305.000
ENTRE RÍOS 24/25	432.700	99	99	99	100	100	100	432.700
23/24	568.200	92	96	97	99	100	100	
General Pico	476.600	95	100	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25	726.600	97	100	100	100	100	100	726.600
23/24	779.100	95	97	99	100	100	100	
Avellaneda	51.400	7	7	40	86	93	93	48.033
Cañada de Gómez	183.000	97	100	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	100	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25	877.100	94	94	96	99	100	99,6	873.733
23/24	1.239.380	83	85	93	96	99	100	
CATAMARCA	8.450	25	45	70	100	100	100	8.450
CORRIENTES	11.100	82	82	88	88	88	88	9.768
CHACO (Charata)	84.500		13	26	45	70	85	71.622
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	7	7	43	43	43	43	70.476
FORMOSA	37.100	5	13	40	42	42	45	16.695
JUJUY	12.049			25	46	60	65	7.832
MISIONES	23.510	95	97	97	97	97	97	30.565
SALTA	364.206	22	33	43	49	70	92	334.305
SAN LUIS	351.500	98	100	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	120.500	9	15	40	45	88	98	118.464
STGO. ESTERO (Quimilí)	526.610	17	64	67	67	80	100	526.610
TUCUMÁN	61.930	25	45	68	97	100	100	61.930
TOTAL PAÍS 24/25	9.390.741	86	90	92	94	96	98	9.223.636
23/24	11.103.250	84	88	93	95	97	98	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	
Bolivar	2.165	100	100	100	100	100	100	2.165	
Bragado	4.300	100	100	100	100	100	100	4.300	
Junín	3.000	100	100	100	100	100	100	3.000	
Lincoln	24.800	100	100	100	100	100	100	24.800	
Pehuajó	13.700	100	100	100	100	100	100	13.700	
Salliqueló	5.000	100	100	100	100	100	100	5.000	
25 de Mayo	450	100	100	100	100	100	100	450	
BUENOS AIRES	53.415	100	100	100	100	100	100	53.415	
CATAMARCA	1.000	100	100	100	100	100	100	1.000	
Laboulaye	100.207	100	100	100	100	100	100	100.207	
Marcos Juárez	29.500	100	100	100	100	100	100	29.500	
Río Cuarto	139.700	100	100	100	100	100	100	139.700	
San Francisco	14.500	97	100	100	100	100	100	14.500	
Villa María	58.400	100	100	100	100	100	100	58.400	
CÓRDOBA	342.307	100	100	100	100	100	100	342.307	
JUJUY	400		20	30	60	80	100	400	
Gral Pico	36.900	100	100	100	100	100	100	36.900	
Santa Rosa	1.540	100	100	100	100	100	100	1.540	
LA PAMPA	38.440	100	100	100	100	100	100	38.440	
SALTA	3.414		43	78	84	100	100	3.414	
SAN LUIS	18.250	100	100	100	100	100	100	18.250	
SANTA FE	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000	
SANTIAGO DEL ESTERO	300		100	100	100	100	100	300	
TUCUMAN	1.450	100	100	100	100	100	100	1.450	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	473.976 433.896	99 99	99,5 99	99,6 99,7	99,6 99,9	99,8 100	100 100	473.976

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	1ª	188.500	100	100	100	100	100	100	188.500
	2ª	122.000	80	82	90	100	100	100	122.000
Bragado	1ª	289.800	100	100	100	100	100	100	289.800
	2ª	198.700	90	90	100	100	100	100	198.700
General Madariaga	1ª	49.900	100	100	100	100	100	100	49.900
	2ª	44.600	84	100	100	100	100	100	44.600
Junín	1ª	339.550	100	100	100	100	100	100	339.550
	2ª	178.500	100	100	100	100	100	100	178.500
La Plata	1ª	46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
	2ª	19.000	75	80	85	95	100	100	19.000
Lincoln	1ª	524.000	100	100	100	100	100	100	524.000
	2ª	186.000	98	100	100	100	100	100	186.000
Pehuajó	1ª	432.548	100	100	100	100	100	100	432.550
	2ª	109.942	100	100	100	100	100	100	109.940
Pergamino	1ª	462.550	100	100	100	100	100	100	462.550
	2ª	265.750	100	100	100	100	100	100	265.750
Pigüé	1ª	88.000	100	100	100	100	100	100	88.000
	2ª	67.000	100	100	100	100	100	100	67.000
Salliqueló	1ª	151.000	100	100	100	100	100	100	151.000
	2ª	61.000	55	60	74	96	96	96	58.800
Tandil	1ª	270.000	100	100	100	100	100	100	270.000
	2ª	350.000	85	85	100	100	100	100	350.000
Tres Arroyos	1ª	187.397	100	100	100	100	100	100	187.400
	2ª	255.977	88	100	100	100	100	100	255.980
25 de Mayo	1ª	262.808	100	100	100	100	100	100	262.810
	2ª	166.958	75	90	100	100	100	100	166.960
BUENOS AIRES	24/25	5.317.480	96	97	99	99,94	99,96	99,96	5.315.290
	23/24	5.180.208	92	96	99	100	100	100	
Laboulaye	1ª	589.030	100	100	100	100	100	100	589.030
	2ª	63.915	65	90	100	100	100	100	63.920
Marcos Juárez	1ª	730.600	100	100	100	100	100	100	730.600
	2ª	151.400	100	100	100	100	100	100	151.400
Río Cuarto	1ª	1.001.430	100	100	100	100	100	100	1.001.430
	2ª	120.000	100	100	100	100	100	100	120.000
San Francisco	1ª	901.000	96	98	99	100	100	100	901.000
	2ª	220.411	96	98	100	99,9	100	100	220.410
Villa María	1ª	710.700	100	100	100	100	100	100	710.700
	2ª	169.800	95	100	100	100	100	100	169.800
CÓRDOBA	24/25	4.658.286	98	99	99,81	100,00	100	100	4.658.290
	23/24	4.136.553	98	99	100	100	100	100	
Paraná	1ª	169.500	100	100	100	100	100	100	169.500
	2ª	166.900	99	100	100	100	100	100	166.900
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100	414.000
	2ª	400.000	99	100	100	100	100	100	400.000
ENTRE RÍOS	24/25	1.150.400	100	100	100	100	100	100	1.150.400
	23/24	1.091.400	82	97	98	99	99	100	

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
			%	%	%	%	%	%	
General Pico	1ª	408.400	100	100	100	100	100	100	408.400
	2ª	40.300	100	100	100	100	100	100	40.300
Santa Rosa	1ª	94.500	100	100	100	100	100	100	94.500
	2ª	4.500	100	100	100	100	100	100	4.500
LA PAMPA		24/25	100	100	100	100	100	100	547.700
		23/24	93	98	100	100	100	100	
Avellaneda	1ª	254.700	51	84	92	100	100	100	254.700
	2ª	80.900	66	89	100	100	100	100	80.900
Cañada de Gómez	1ª	560.000	100	100	100	100	100	100	560.000
	2ª	280.000	97	100	100	100	100	100	280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100	529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100	132.000
Rafaela	1ª	544.500	100	100	100	100	100	100	544.500
	2ª	438.300	92	98	100	100	100	100	438.300
Venado Tuerto	1ª	469.000	100	100	100	100	100	100	469.000
	2ª	130.000	100	100	100	100	100	100	130.000
SANTA FE		24/25	94	98	99	100	100	100	3.418.400
		23/24	96	99	99	100	100	100	
CATAMARCA	1ª	21.450	85	100	100	100	100	100	21.450
	2ª	20.000	85	100	100	100	100	100	20.000
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	3.100
	2ª	4.000	87	100	100	100	100	100	4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	17	27	44	69	88	94	283.910
	2ª	49.000	32	50	77	94	100	100	49.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	274.950	53	100	100,0	100	100	100	274.950
	2ª	41.750	53	100	100	100	100	100	41.750
FORMOSA	1ª	17.000	55	100	100	100	100	100	17.000
	2ª	1.100	54	100	100	100	100	100	1.100
JUJUY	1ª	5.312	35	45	50	72	92	100	5.310
	2ª	5.197	32	42	50	74	93	100	5.200
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100	4.320
SALTA	1ª	284.752	46	57	78	83	100	100	284.750
	2ª	30.033	51	74	100	100	100	100	30.030
SAN LUIS	1ª	269.800	100	100	100	100	100	100	269.800
	2ª	1.800	90	100	100	100	100	100	1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	90	100	100	100	100	100	193.230
	2ª	109.850	88	100	100	100	100	100	109.850
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.200	91	98	98	98	100	100	762.200
	2ª	282.070	84	94	96	96	100	100	282.070
TUCUMÁN	1ª	106.800	100	100	100	100	100	100	106.800
	2ª	78.220	100	100	100	100	100	100	78.220
TOTAL PAÍS		24/25	93	96	98	99	99,8	99,9	17.939.920
		23/24	89	95	98	99	99	100	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	98	98	100	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.316	100	100	100	100	100	100	3.316
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25 23/24	122.243 109.293	99,8 97	99,8 98	100 100	100 100	100 100	100 100	122.243
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	16.300	100	100	100	100	100	100	16.300
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	95	97	100	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25 23/24	135.170 116.303	98 94	99 97	100 99	100 99,7	100 99,8	100 99,9	135.170
Paraná	39.300	100	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	98	99	100	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	99 96	99 98	100 98	100 100	100 100	100 100	117.600
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25 23/24	26.000 22.900	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	26.000
Avellaneda	53.300	43	54	60	86	91	95	50.454
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25 23/24	236.350 182.448	87 93	90 95	91 96	97 96	98 99	99 99	233.504
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000		36	51	71	87	93	51.200
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	21	47	61	61	61	61	34.288
FORMOSA	38.000	15	50	60	63	63	63	23.940
JUJUY	3.010				31	51	66	1.972
SALTA	39.158	6	26	52	57	87	100	39.158
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	85	100	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	111.460	12	50	51	53	80	100	111.460
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.057.421 827.086	70 71	81 78	85 83	88 91	93 93	96 94	1.013.764

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800				11	22	26		3.775
	LF	95.800				17	28	31		29.727
T. CORRIENTES		110.600				16	27	30		33.502
R. S. Peña	LA	0								
	LF	3.500								
T. CHACO		3.500								
PARANA	LA	2.200								
	LF	24.520								
T. PARANÁ		26.720								
R. DEL TALA	LA	6.000								
	LF	39.000								
T. R.DEL TALA		45.000								
T. ENTRE RÍOS		71.720								
FORMOSA	LA	0								
	LF	14.400						20		2.880
T. FORMOSA		14.400						20		2.880
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	12.100								
T. AVELLANEDA		13.600								
RAFAELA	LA	400								
	LF	15.500								
T. RAFAELA		15.900								
T. SANTA FE		29.500								
TOTAL PAÍS	LA	24.900				7	13			3.775
	LF	204.820				8	13			32.607
TOTAL PAÍS		229.720				8	13			36.862
		202.450				0	0			

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	94.800								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	57.098								
BUENOS AIRES 24/25	1.063.944	0	0	0	0	0	0		
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	21.900								
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.000								
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25	143.537	0	0	0	0	0	0		
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0		
Paraná	5.400			19	64	83	100		5.400
Rosario del Tala	15.400					10	25		3.850
ENTRE RÍOS 24/25	20.800	0	0	5	17	29	44		9.250
23/24	9.850	0	0	0	25	51	88		
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25	258.900	0	0	0	0	0	0		
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	133.800	18	33	55	63	70	79	500	105.160
Cañada de Gómez	20.000						9		1.800
Casilda	3.000								-
Rafaela	78.050				8	26	44		34.340
Venado Tuerto	1.500								-
SANTA FE 24/25	236.350	10	19	31	51	48	60	500	141.300
23/24	210.300	48	53	55	66	79	85		
CATAMARCA	50								
CORRIENTES	1.620				38	55	81		1.310
CHACO (Charata)	62.000	9	55	80	100	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	18	52	84	100	100	100		86.150
FORMOSA	2.200					100	100		2.200
SALTA	375								
SAN LUIS	74.050								
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	25.385					0	2,6		660
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25	1.978.461	2	6	10	12	14	15	500	302.870
23/24	1.857.963	7	9	10	13	15	16		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/01/2025 al 06/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	11	89	-	26	72	2	-	A/PS/S
	BRAGADO	-	-	80	20	-	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	30	70	-	-	84	16	-	A/R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
	LA PLATA	-	-	70	30	-	40	60	-	-	R/PS
	LINCOLN	-	-	58	42	-	-	96	4	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	53	47	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	1	50	49	-	-	75	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	22	55	23	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	-	36	64	-	-	84	16	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	41	59	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	100	-	28	72	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	50	50	-	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	9	81	10	-	92	8	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
	SAN FRANCISCO	-	10	41	39	10	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	88	12	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	30	70	-	100	-	-	PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	90	10	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	23	77	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	2	12	86	34	49	15	2	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	38	62	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	-	-	19	81	36	51	11	2	PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R/PS
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	38	32	30	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	9	39	52	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	41	59	-	88	12	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	30	70	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/01/2025 al 06/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	13	73	14	-	-	100	-	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	-	48	52	-	-	64	36	-	A/PS/S
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	70	30	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	17	49	34	-	-	73	27	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	10	90	-	-	49	51	-	A/R
	LA PLATA	-	20	60	20	-	20	70	10	-	R/PS/S
	LINCOLN	-	28	13	59	-	-	77	23	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	-	13	87	-	18	47	22	13	A/R/PS
	PERGAMINO	-	24	9	13	54	-	56	44	-	A
	PIGÜÉ	-	75	25	-	-	-	78	22	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	34	48	18	-	-	47	43	10	A/R
	TANDIL	-	9	75	16	-	-	81	19	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	2	74	24	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	5	70	25	-	23	77	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	30	40	30	-	32	58	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	8	5	87	-	6	94	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	40	40	20	-	-	68	22	10	A/R
	SAN FRANCISCO	-	37	32	30	1	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	51	39	10	-	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	15	10	75	10	90	-	-	RS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	20	40	40	30	60	10	-	PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	60	30	10	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	45	17	38	-	-	73	27	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	90	-	-	10	30	70	19	1	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	26	-	44	30	55	40	5	-	A/R/PS
	CASILDA	-	17	-	71	12	26	54	20	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	24	-	60	16	23	55	17	5	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	20	50	30	R/PS
CATAMARCA	CATAMARCA	-	99	1	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	1	99	-	71	29	-	A/R/PS/S
CHACO	CHARATA	16	84	-	-	-	4	68	27	1	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	96	3	1	-	-	49	44	5	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	21	60	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	40	50	-	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	20	80	-	-	-	-	71	29	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	50	31	19	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	97	3	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	16	73	11	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/01/2025 al 06/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	8	92	-	-	-	-	71	29	-	-	100	-	-	-	-	73	27	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	49	33	18	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	91	9	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	96	4	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

