

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

13 de febrero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 13 de febrero de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 13/02/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han acumulado precipitaciones superiores a 40mm en el norte y noreste de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe y sur de Entre Ríos. El máximo acumulado del periodo reportado corresponde a Punta Indio (192mm). También se registraron más de 70mm en Ezeiza, Rosario y Gualeguaychú. Fuera del área mencionada, se destacan en el mapa los 68mm de Jujuy. Siguen sin reportar precipitaciones significativas el NEA y la Patagonia.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 05/02/2025 al 11/02/2025

Durante el jueves y el próximo martes se esperan eventos de lluvia en el NOA y NEA, de diversa intensidad. Entre jueves y domingo podrían darse precipitaciones, también de diversa intensidad, en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, este de La Pampa y en algunos sectores de Buenos Aires. Para jueves y viernes podrían sumarse lluvia en Río Negro y Neuquén.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en el centro y norte del país, especialmente en San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Las máximas más altas fueron reportadas desde Rivadavia (45°C), La Rioja (45°C), Santiago del Estero (44.2°C) y San Juan (44°C). Más de diez estaciones del Servicio Meteorológico Nacional reportaron máximas récord para el mes de febrero. Las mínimas más bajas del periodo corresponden a Río Grande (0°C) y Bariloche (0.2°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 05/02/2025 al 11/02/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el norte, normales en la zona central y normales a inferiores a lo normal en el sur del país. Entre jueves y lunes de la próxima semana, el establecimiento de una zona de alta presión en el Atlántico, ocasionará un paulatino aumento en las temperaturas en la zona central y norte del país. Entre viernes y lunes se espera que varias localidades del NOA y NEA, centro y norte de Córdoba, norte de Santa Fe y Entre Ríos registren temperaturas máximas sobre 35°C. Además, entre domingo y lunes se espera que localidades de Formosa, este de Salta, Chaco, norte de Santa Fe, oeste y sur de Corrientes alcancen temperaturas máximas superiores a 40°C. A partir del martes próximo se prevé un leve descenso en las temperaturas en todo el país.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se observa una ampliación de las áreas con reservas regulares o adecuadas en la zona núcleo. Las lluvias que se sumaron en lo que va del mes se vienen concentrando en esa región.

En el resto de las regiones, donde las lluvias fueron menores o nulas, aumenta el área con déficit hídrico. En el NEA, la mayor parte del área se clasificó en la categoría sequía, lo mismo que el centro de Córdoba y de Santa Fe, el centro y norte de Entre Ríos, el sudeste de La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires.

En el NOA las reservas hídricas serían regulares a adecuadas, como saldo de lluvias anteriores más algunas sumadas recientemente.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

No se han registrado precipitaciones en la provincia de Chaco, y el efecto de escasez hídrica junto con las elevadas temperaturas están afectando el estado del cultivo, que ya comienza a deteriorarse reflejando síntomas de estrés.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, correspondiente a la delegación Avellaneda, el cultivo presenta una amplia variabilidad en el estado dependiendo de la zona y la condición hídrica. Las zonas más afectadas por la falta de humedad presentan lotes donde son acentuados los síntomas de estrés tanto hídrico como calórico. Si bien hay lotes que presentan muerte de plantas o plantas con escaso crecimiento aún no se computa superficie perdida. Respecto al estado fenológico la mayoría de los lotes transitan etapas entre pimpollado y llenado de cápsulas.

Tampoco se registraron precipitaciones en la provincia de Santiago del Estero y fueron relevantes las elevadas temperaturas ocurridas en la región. Esta situación se manifiesta en el estado del cultivo que presenta síntomas de estrés, sobre todo en aquellos lotes realizados en secano, aunque en términos generales el estado todavía es bueno. La mayoría de los lotes se encuentran evolucionando y transcurren etapas entre vegetativas y reproductivas para los primeros sembrados. No se informan inconvenientes por presencia de plagas, enfermedades o malezas.

ARROZ

Prosigue la cosecha con buen ritmo en la provincia de Corrientes. Los rindes obtenidos son considerados buenos.

En la zona de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, ya se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes de la variedad Largo Fino. Los restantes lotes, tanto del Largo Fino, como del Largo Ancho, transitan etapas que van desde madurez hasta llenado de granos. El estado de los lotes es muy bueno tanto debido a la insolación recibida como por el aporte del riego.

También se reportan muy buenos lotes en la zona de la delegación Rafaela. Estos se encuentran entre floración y comienzo de llenado de grano. No se informa presencia de plagas o enfermedades que incidan en el rendimiento futuro.



GIRASOL



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones en prácticamente toda la provincia, en donde los mayores volúmenes se registraron en la zona norte. Desde el centro y hasta el sur/sudeste, las lluvias fueron variadas, en general de escaso volumen, y en muchos casos en forma de llovizna. Las marcas térmicas fueron muy elevadas, por lo que esta situación deteriora el estado hídrico de los suelos en aquellas zonas menos beneficiadas.

El cultivo, en general, presenta buenas condiciones sin presencia de plagas o enfermedades y transita etapas entre plena floración a comienzos de llenado de grano, siendo esta última etapa crítica en la definición del rendimiento, sobre todo en aquellas zonas la escasez hídrica es más relevante, pudiendo afectar los rindes futuros.



Se ha iniciado incipientemente la cosecha de los primeros lotes en zonas correspondientes a las delegaciones de Marcos Juárez y San Francisco. En general los rendimientos obtenidos son muy buenos, con reportes de rindes para Marcos Juárez que promedian cerca de los 32 qq/ha.

Las restantes zonas presentan buenos lotes y la mayoría transita la etapa de llenado.



Las precipitaciones registradas durante la semana informada, presentaron mayor relevancia en la zona norte de la provincia, lo que abarca a la delegación General Pico, mientras que hacia el sur, en áreas de la delegación Santa Rosa, las precipitaciones promediaron cerca de los 7mm. No obstante, el cultivo, dadas sus características se encuentra menos afectado que el resto de los cultivos estivales, y presenta buen estado general. En ambos casos el cultivo transita la etapa de floración desde inicios hasta plena floración para los primeros sembrados. Se ha reportado presencia de isocas defoliadoras cuya incidencia sería mayor en los últimos lotes sembrados.





Prosigue la cosecha en la zona norte provincial. En Avellaneda, la misma se encuentra muy avanzada, y se estima que la trilla finalice entre finales de mes o inicios de marzo.

Algo más al sur, en la zona de Rafaela, la cosecha continúa avanzando, y se estima una superficie trillada cercana al 80%. Los rendimientos se mantienen buenos, con valores promedios entre 22 y 26 qq/ha. Los restantes lotes en pie se encuentran entre madurez fisiológica y comercial.

En Cañada de Gómez, avanza la cosecha con excelentes rendimientos que se sitúan alrededor de los 28 qq/ha. Las condiciones climáticas de elevadas temperaturas han acelerado la desecación de lotes, estimándose que en los próximos días las labores de cosecha se intensifiquen.



Prosigue la cosecha en la zona de la delegación Quimilí en los departamentos en donde se encuentran los primeros lotes sembrados. Las adversas condiciones ambientales que acompañaron al cultivo durante una gran parte del desarrollo se ven expresados en los rendimientos, que son considerados bajos, pero dentro de lo esperado.

MAÍZ



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones en todo el ámbito provincial, y principalmente en la zona norte donde se registraron los mayores volúmenes. Tales precipitaciones han permitido la recuperación de la humedad edáfica, y el establecimiento de nuevas reservas hídricas. Sin embargo, para el cultivo implantado en fechas tempranas, estas lluvias resultan indiferentes y llegan tarde, puesto que ya han sido definidos todos los componentes de rendimiento, en malas condiciones ambientales, por lo que, en muchos casos, ante la escasa perspectiva de rendimiento han sido utilizados como recurso forrajero.



En el caso de los maíces de siembra tardía, que en esta zona todavía se encuentran en etapas vegetativas, aunque con escaso desarrollo, esta situación beneficiosa le permitirá revertir y atenuar la afectación por la escasez hídrica.

Hacia el centro y sur, la situación presenta un amplio panorama debido a la gran variabilidad en las condiciones hídricas. En todos los casos, las elevadas temperaturas registradas durante los últimos días, incrementan la escasez hídrica.

En este contexto, existen zonas donde las precipitaciones fueron prácticamente nulas, como por ejemplo en ciertos partidos. de la delegación de Tandil, donde el cultivo se encuentra en muy malas condiciones manifestando importantes síntomas de estrés hídrico.



Solamente se han registrado precipitaciones en algunas zonas de la delegación Marcos Juárez, lo que ha proporcionado alivio ante las elevadas temperaturas ocurridas en todo el ámbito provincial durante la semana informada. En esta región el estado del cultivo en general es bueno, y fenológicamente el 90% de la superficie se encuentra en la etapa de llenado.

En las restantes zonas no se registraron precipitaciones, y se estima que para los lotes de siembra temprana en este contexto climático se han acortado los ciclos, afectando el rinde potencial. Los lotes de siembra tardía se encuentran en etapas vegetativas, y si bien manifiestan síntomas de estrés, se espera que de ocurrir precipitaciones en el corto plazo estos se reviertan. En la zona de San Francisco, se realizan intensos monitoreos por presencia de isocas cogolleras.



La falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas que se registran en la provincia afectan el desarrollo del cultivo agravando la situación de estrés manifiesto en el cultivo. El cultivo se encuentra en etapas vegetativas con una significativa necesidad hídrica y escaso desarrollo.



Al norte de la provincia que comprende a la delegación General Pico, se registraron importantes precipitaciones alcanzando hasta los 100mm en ciertas localidades. Esto resulta sumamente beneficioso para el cultivo de primera que transita



etapas entre floración y comienzos de llenado, mientras que los de segunda ocupación se encuentran en etapas vegetativas.

En la zona de la delegación Santa Rosa, al sur provincial, las precipitaciones fueron menores y promediaron alrededor de los 7mm, y que si bien han sido de alivio aún son necesarios nuevos aportes para la recomposición hídrica. Los maíces de primera de siembra temprana, son los más afectados, ya que han transitado la mayor parte de sus etapas en escasez hídrica. Los maíces de primera de siembra tardía, son los que en mejores condiciones se encuentran y fenológicamente están entre V14 y Vt. Para el caso de los maíces de segunda ocupación, que han sido sembrados en condiciones de escasez hídrica, estas precipitaciones han sido muy bienvenidas ya que evidenciaban severos síntomas de estrés hídrico, y se encuentran entre V8 y V10.



En la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha de los maíces tempranos se encuentra prácticamente finalizada. Los rendimientos promedian 41qq/ha. La superficie afectada por estrés hídrico y térmico fue destinada a consumo animal. En el caso de los maíces de siembra tardía, se ha dado por finalizada la siembra, teniendo en cuenta que los últimos lotes restantes no contaban con la humedad suficiente. Las condiciones climáticas ocurridas durante la semana han agravado el deterioro del cultivo a causa del estrés. No obstante, son factibles de recuperación, de mejorar las condiciones ambientales, teniendo en cuenta que todavía se encuentran en etapas vegetativas.

En Rafaela se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes de maíces tempranos. Los rendimientos se encuentran entre los 80 y 90 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapas que van desde llenado a madurez presentando muy buen estado general. Los maíces de siembra tardía, se encuentran entre etapas vegetativas e inicios de floración, a la espera de precipitaciones en el corto plazo a fin de transitar esta etapa crítica sin inconvenientes. Se realizan monitoreos y control por presencia de chicharrita, aunque no se reportan daños relevantes.

En la zona de Cañada de Gómez los maíces los lotes de maíz de primera ocupación, transitan etapas desde llenado de grano hasta madurez. Los lotes con destino forrajero, presentan muy buenos rendimientos. Los maíces de segunda, se encuentran en etapas desde V8 hasta inicios de floración, sin presencia de chicharrita.

En Casilda los maíces de primera se encuentran en la etapa de madurez. Los mejores lotes se encuentran en el oeste, para los que se estiman rendimientos cercanos a los 100 qq/ha, mientras que en el este los rendimientos son inferiores y se estiman entre los 70/80 qq/ha. Los maíces de siembra tardía, aún se encuentran en etapas vegetativas, muy beneficiados por las últimas precipitaciones.

En Venado Tuerto, las últimas precipitaciones ocurridas, son algo tardías para el cultivo, que ya tiene definido el rendimiento, y que se estima se ubicará por debajo de lo previsto inicialmente.





Nuevamente las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones inciden en el cultivo implantado. Si bien la mayor parte de la superficie sembrada se encuentra todavía en etapas vegetativas, el desarrollo estructural de las plantas se encuentra bastante comprometido, y se reportan lotes muy estresados y se reportan pérdidas de algunos lotes. Hasta la fecha no se reportan daños por achaparramiento.



En las provincias de Salta y Jujuy, ocurrieron algunas precipitaciones durante los últimos días, lo que permitió finalizar con la siembra. No obstante, la ausencia de humedad en ciertos lotes, ha dejado superficies que no se sembrarán por haber finalizado la fecha óptima para tales labores. El cultivo en estas provincias se encuentra en etapas vegetativas.

En la provincia de Tucumán, muchos lotes ya se encuentran ingresando a etapas reproductivas, y la humedad ante las elevadas temperaturas resulta insuficiente. Se estima que de no ocurrir precipitaciones en el corto plazo, podrían comenzar a perderse lotes.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, en áreas de las delegaciones Marcos Juárez y Villa María, el cultivo se encuentra en buen estado general, en etapas entre floración y formación de cajas.

Esta situación no se repite en la zona de Río Cuarto, en donde el cultivo implantado en las zonas más afectadas por la escasez hídrica, presenta menor crecimiento, y no han formado clavos, por lo que podría afectar en el rendimiento final.

En la provincia de La Pampa los lotes continúan su desarrollo, en buen estado general, ya transitando la etapa de floración.

En la zona del NOA los lotes implantados presentan buen estado general, en pleno crecimiento vegetativo.



POROTO

El avance de la siembra en la región del NOA, ha sido poco significativo. La falta de humedad en los suelos, demoran las labores. Los lotes implantados presentan buena emergencia.

Una similar situación ocurre en Santiago del Estero, con una escasa incorporación de superficie implantada debido a la falta de humedad en los suelos. Los primeros lotes han emergido y se encuentran resistiendo las adversas condiciones climáticas.

SOJA



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada, han ocurrido en prácticamente toda la provincia. Los volúmenes registrados fueron muy variables, en donde en la zona norte de la provincia alcanzaron valores de hasta 100mm, mientras que desde el centro hasta el sur las lluvias fueron puntuales, con valores que en muchos casos no superaron los 10mm y que en algunas zonas fueron acompañadas de granizo, ocasionando daños puntuales. En todos los casos estas lluvias resultaron oportunas luego de las elevadas temperaturas que definieron la semana.

Las sojas de primera, que se encontraban afectadas por la situación climática, y que ya presentaban pérdida de flores y vainas, van a poder recuperarse debido a la plasticidad que presenta el cultivo, aunque ya no alcancen el rinde potencial.

Las sojas de segunda también tienen posibilidades de recuperación. Sin embargo, estas, en general, han sido implantadas en condiciones de escasez hídrica determinando un cultivo con escaso crecimiento y desarrollo, situación que incide directamente en el rendimiento potencial. La posibilidad de mitigar en cierta forma la merma ya ocasionada, va a depender de la severidad con que impactó la sequía en la región, ya que existen zonas muy afectadas, en donde el cultivo aún no supera la altura del rastrojo del cultivo de cosecha fina precedente.



En este último periodo las precipitaciones ocurridas en la provincia han sido variables, tanto en el volumen como en la distribución lo que junto a las elevadas temperaturas, han creado condiciones muy desfavorables para el cultivo. Las sojas de



primera, muestran síntomas de estrés, con pérdida de flores y vainas. En algunas zonas donde la situación es más severa, ya se reportan lotes perdidos o manchoneados.

El estado de humedad de los suelos se encuentra entre regular y principio de sequía, siendo muy necesaria la ocurrencia de precipitaciones en los próximos días, a la espera de que se cumplan los pronósticos reportados.

Comparativamente, las soja de segunda se encuentran más afectadas que las de primera, aunque en ambos casos se estiman mermas en el rendimiento potencial. Se realizan monitoreos y controles por presencia de orugas, araña y trips.



La ausencia de precipitaciones y las elevadas temperaturas, continúan afectando el desarrollo del cultivo que se encuentra en etapas iniciales de floración. El estado del cultivo es variable, acentuándose las diferencias según el manejo aplicado, lo que resalta aún más los efectos del estrés en los distintos lotes



Las precipitaciones ocurridas durante la semana fueron más importantes en la zona de la delegación General Pico, al norte de la provincia. Los primeros lotes se encuentran transitando el período de floración. El resto continúa en pleno crecimiento vegetativo. Estas últimas lluvias han sido muy beneficiosas para mejorar el estado general de los cultivos, en particular para los más atrasados.

En ámbitos de la delegación Santa Rosa, las precipitaciones fueron de menor volumen, pero permitieron aliviar la situación generada por las altas temperaturas. Las soja de primera presentan una gran variabilidad en cuanto al estado, ya que las sembradas más tardíamente, presentan mejores condiciones que las más tempranas, los estados fenológicos para estas van desde R2 hasta R5, mientras que las soja de segunda, que se encuentran en estados vegetativos, se encuentran en peores condiciones que las de primera. En todos los casos se reportan intensos ataques de tucuras, que están siendo controlados, así como también se realizan controles por presencia de orugas y araña.



En el área de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia, la ausencia de precipitaciones agrava la situación de estrés que están tolerando los planteos. La mayoría de los lotes se encuentra en etapas vegetativas, presentando una amplia gama en el



estado de los plantíos íntimamente relacionado con la distribución de las precipitaciones. Los lotes de peor calidad han empezado a manchonearse e incluso se reporta pérdida de plantas. Sin embargo, dada la etapa fenológica, aún es factible la recuperación de producirse cambios en la situación climática.

En la zona de Rafaela las soja de primera se encuentran en etapas entre R2 y R5 en los lotes más adelantados. La mayoría de los lotes presentan muy buenas condiciones, con excepción de aquellos grupos cortos que se vieron afectados en el periodo crítico y presentan un estado regular presentando pérdida de flores y vainas. Las soja de segunda son las más afectadas por las temperaturas extremas y la falta de humedad, pese a esto, todavía se mantienen en buen estado, con una proporción de lotes entre regulares y malos a causa de las precipitaciones desiguales y escasas y la baja aptitud de los suelos. Se detectaron presencia de orugas cortadoras y arañuela, las que recibieron su tratamiento para ser controladas. Se reporta un incremento en la presencia de malezas.

En la zona centro, que comprende a la delegación de Cañada de Gómez las soja de primera presentan buen estado general, transitando etapas entre R3 y R5. Se continúan realizando controles para chinche, arañuela e isocas, junto con aplicaciones de fungicidas para enfermedades de fin de ciclo. Las soja de segunda se encuentran en etapas que van desde R1 hasta R3.

En Casilda las precipitaciones ocurridas proporcionan un alivio para el cultivo implantado. Si bien existen zonas menos beneficiadas por las precipitaciones y que ya reflejan una merma en el rendimiento potencial, en general el cultivo presenta muy buen estado general, y se encuentra en etapas entre R3 y R5. Se ha registrado una intensa caída de granizo en el área central del departamento San Lorenzo, y cuyo nivel de daño aún se está evaluando. En el caso de las soja de segunda, se reporta una buena reacción posterior a las precipitaciones. Sin embargo, en las áreas más afectadas por las temperaturas y la escasez hídrica se presentan lotes con muerte de plantas. Se informa presencia de trips y arañuela, junto con incrementos de malezas como yuyo colorado dado el escaso crecimiento del cultivo.

En el sur de la provincia, en ámbitos de la delegación Venado Tuerto, las precipitaciones con volúmenes de hasta 100mm, han permitido una importante recuperación en el estado de las soja de primera, que se encuentran en etapas entre R4 y R5. En el caso de las soja de segunda, aunque han mejorado en su aspecto, el grado de merma previo es importante.



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada no fueron generalizadas y existen zonas donde se mantiene el déficit hídrico, por lo que es necesario que ocurran nuevamente y con continuidad para conservar el buen estado del cultivo implantado.





La semana estuvo caracterizada por el intenso calor y la falta de precipitaciones en todo el ámbito provincial. La condición de los lotes implantados ha empeorado en los últimos días a causa de las adversas condiciones toleradas, y se encuentran con marcados síntomas de estrés. La gran mayoría de los lotes se encuentra en estados vegetativos y tienen posibilidades parciales de recuperación.



En la provincia de Jujuy el cultivo implantado continúa evolucionando en etapas vegetativas, próximo a ingresar a la floración, a la espera de ocurrencia de precipitaciones que acompañen esta etapa crítica.

En Salta, los lotes se encuentran en crecimiento, recuperados luego de los aportes hídricos de las últimas lluvias.

En Tucumán, la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas empeoran el estado de los cultivos. Muchos lotes ya se encuentran en etapas reproductivas siendo esta una etapa crítica en donde es fundamental la presencia de agua.

SORGO GRANÍFERO



El cultivo implantado se encuentra en múltiples etapas dependiendo de la fecha de siembra, con los primeros sembrados ya ingresando a la etapa de llenado, mientras que los restantes se hallan entre etapas vegetativas en pleno crecimiento y floración. El cultivo presenta muy buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades.





El cultivo implantado en la zona norte de la provincia se encuentra en inicios de llenado de grano. Se realizan monitoreos por presencia de pulgón amarillo. Se realizan tareas de picado de lotes con destino forrajero.



En la zona norte que abarca a la delegación Avellaneda, el cultivo se encuentra en estados variados, dependiendo de la condición de cada lote. Se da por finalizada la siembra de lotes de segunda la falta de humedad en el suelo. Los primeros cuadros sembrados se encuentran en la etapa de madurez, presentando síntomas de afectación a causa del estrés hídrico térmico, por lo que se estima que una importante superficie tendrá destino forrajero. Los lotes de siembras tardías se encuentran en estados vegetativos, factibles de recuperación de ocurrir precipitaciones en el corto plazo. Se realizaron aplicaciones para control de pulgón amarillo.

En la zona de Rafaela, la mayoría de los lotes se encuentra entre floración y llenado de granos, con una escasa superficie aún en etapas vegetativas. La tasa de crecimiento es muy baja a causa de las elevadas temperaturas y la falta de humedad en los perfiles. Los lotes presentan estados entre buenos y regulares. Se realizan aplicaciones para control de pulgón amarillo.

En la zona de Casilda, se informa una recuperación de los lotes tras las últimas precipitaciones. Toda la superficie se encuentra en etapas reproductivas con posibilidades de alcanzar rendimientos adecuados luego del estrés hídrico y térmico soportado. Existen lotes muy overos en donde el cultivo presenta un crecimiento irregular y se considera que los rendimientos estarán por debajo de los valores aceptables.



El cultivo implantado se encuentra en etapas vegetativas, muy estresado a causa de las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones.






Prácticamente se ha finalizado la siembra en la provincia de Jujuy. Tanto en Salta como en Jujuy, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas, mientras que en la provincia de Tucumán, existe una importante proporción que ya se encuentra ingresando a floración. En todos los casos el estado del cultivo es bueno, pero es imprescindible la ocurrencia de precipitaciones que acompañen durante las etapas críticas.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	99	100	100	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	366.500	100	100	100	100	100	100	366.500
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	408.177	100	100	100	100	100	100	408.177
25 de Mayo	164.493	99	100	100	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25	3.038.020	99,9	100	100	100	100	100	3.038.020
23/24	3.090.580	99	99	100	100	100	100	
Laboulaye	427.616	98	100	100	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	437.000	100	100	100	100	100	100	437.000
Río Cuarto	665.750	100	100	100	100	100	100	665.750
San Francisco	572.000	97	97	100	100	100	100	572.000
Villa María	442.000	100	100	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25	2.544.366	99	99	100	100	100	100	2.544.366
23/24	3.188.920	98	99	100	100	100	100	
Paraná	127.700	100	100	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	99	99	100	100	100	100	305.000
ENTRE RÍOS 24/25	432.700	99	99	100	100	100	100	432.700
23/24	568.200	96	97	99	100	100	100	
General Pico	476.600	100	100	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25	726.600	100	100	100	100	100	100	726.600
23/24	779.100	97	99	100	100	100	100	
Avellaneda	51.400	7	40	86	93	93	100	48.876
Cañada de Gómez	183.000	100	100	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	100	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25	877.100	94	96	99	99,6	99,6	100	874.576
23/24	1.239.380	85	93	96	99	100	100	
CATAMARCA	8.450	45	70	100	100	100	100	8.450
CORRIENTES	11.100	82	88	88	88	88	97	10.820
CHACO (Charata)	84.500	13	26	45	70	85	99	83.993
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	7	43	43	43	43	43	70.476
FORMOSA	37.100	13	40	42	42	45	48	17.808
JUJUY	12.049		25	46	60	65	100	12.049
MISIONES	23.510	97	97	97	97	97	97	30.565
SALTA	364.206	33	43	49	70	92	100	364.206
SAN LUIS	351.500	100	100	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	120.500	15	40	45	88	98	100	120.500
STGO. ESTERO (Quimilí)	526.610	64	67	67	80	100	100	526.610
TUCUMÁN	61.930	45	68	97	100	100	100	61.930
TOTAL PAÍS 24/25	9.390.741	90	92	94	96	98	99	9.275.169
23/24	11.103.250	88	93	95	97	98	98	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	1ª	188.500	100	100	100	100	100	100	188.500
	2ª	122.000	82	90	100	100	100	100	122.000
Bragado	1ª	289.800	100	100	100	100	100	100	289.800
	2ª	198.700	90	100	100	100	100	100	198.700
General Madariaga	1ª	49.900	100	100	100	100	100	100	49.900
	2ª	44.600	100	100	100	100	100	100	44.600
Junín	1ª	339.550	100	100	100	100	100	100	339.550
	2ª	178.500	100	100	100	100	100	100	178.500
La Plata	1ª	46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
	2ª	19.000	80	85	95	100	100	100	19.000
Lincoln	1ª	524.000	100	100	100	100	100	100	524.000
	2ª	186.000	100	100	100	100	100	100	186.000
Pehuajó	1ª	432.548	100	100	100	100	100	100	432.550
	2ª	109.942	100	100	100	100	100	100	109.940
Pergamino	1ª	462.550	100	100	100	100	100	100	462.550
	2ª	265.750	100	100	100	100	100	100	265.750
Pigüé	1ª	88.000	100	100	100	100	100	100	88.000
	2ª	67.000	100	100	100	100	100	100	67.000
Salliqueló	1ª	151.000	100	100	100	100	100	100	151.000
	2ª	61.000	60	74	96	96	96	100	61.000
Tandil	1ª	270.000	100	100	100	100	100	100	270.000
	2ª	350.000	85	100	100	100	100	100	350.000
Tres Arroyos	1ª	187.397	100	100	100	100	100	100	187.400
	2ª	255.977	100	100	100	100	100	100	255.980
25 de Mayo	1ª	262.808	100	100	100	100	100	100	262.810
	2ª	166.958	90	100	100	100	100	100	166.960
BUENOS AIRES		24/25	97	99	99,9	99,96	99,96	100,00	5.317.480
		23/24	96	99	100	100	100	100	
Laboulaye	1ª	589.030	100	100	100	100	100	100	589.030
	2ª	63.915	90	100	100	100	100	100	63.920
Marcos Juárez	1ª	730.600	100	100	100	100	100	100	730.600
	2ª	151.400	100	100	100	100	100	100	151.400
Río Cuarto	1ª	1.001.430	100	100	100	100	100	100	1.001.430
	2ª	120.000	100	100	100	100	100	100	120.000
San Francisco	1ª	901.000	98	99	100	100	100	100	901.000
	2ª	220.411	98	100	100	100	100	100	220.410
Villa María	1ª	710.700	100	100	100	100	100	100	710.700
	2ª	169.800	100	100	100	100	100	100	169.800
CÓRDOBA		24/25	99	100	100	100	100	100	4.658.286
		23/24	99	100	100	100	100	100	
Paraná	1ª	169.500	100	100	100	100	100	100	169.500
	2ª	166.900	100	100	100	100	100	100	166.900
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100	414.000
	2ª	400.000	100	100	100	100	100	100	400.000
ENTRE RÍOS		24/25	100	100	100	100	100	100	1.150.400
		23/24	97	98	99	99	100	100	

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
General Pico	1ª	408.400	100	100	100	100	100	100	408.400
	2ª	40.300	100	100	100	100	100	100	40.300
	1ª	94.500	100	100	100	100	100	100	94.500
	2ª	4.500	100	100	100	100	100	100	4.500
LA PAMPA		24/25	100	100	100	100	100	100	547.700
		23/24	98	100	100	100	100	100	541.300
Avellaneda	1ª	254.700	84	92	100	100	100	100	254.700
	2ª	80.900	89	100	100	100	100	100	80.900
Cañada de Gómez	1ª	560.000	100	100	100	100	100	100	560.000
	2ª	280.000	100	100	100	100	100	100	280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100	529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100	132.000
Rafaela	1ª	544.500	100	100	100	100	100	100	544.500
	2ª	438.300	98	100	100	100	100	100	438.300
Venado Tuerto	1ª	469.000	100	100	100	100	100	100	469.000
	2ª	130.000	100	100	100	100	100	100	130.000
SANTA FE		24/25	98	99	100	100	100	100	3.418.400
		23/24	99	99	100	100	100	100	3.060.735
CATAMARCA	1ª	21.450	100	100	100	100	100	100	21.450
	2ª	20.000	100	100	100	100	100	100	20.000
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	3.100
	2ª	4.000	100	100	100	100	100	100	4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	27	44	69	88	94	100	301.900
	2ª	49.000	50	77	94	100	100	100	49.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	274.950	100	100	100,0	100	100	100	274.950
	2ª	41.750	100	100	100	100	100	100	41.750
FORMOSA	1ª	17.000	100	100	100	100	100	100	17.000
	2ª	1.100	100	100	100	100	100	100	1.100
JUJUY	1ª	5.312	45	50	72	92	100	100	5.312
	2ª	5.197	42	50	74	93	100	100	5.197
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100	4.324
SALTA	1ª	284.752	57	78	83	100	100	100	284.752
	2ª	30.033	74	100	100	100	100	100	30.033
SAN LUIS	1ª	269.800	100	100	100	100	100	100	269.800
	2ª	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	100	100	100	100	100	100	193.225
	2ª	109.850	100	100	100	100	100	100	109.850
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.200	98	98	98	100	100	100	762.200
	2ª	282.070	94	96	96	100	100	100	282.070
TUCUMÁN	1ª	106.800	100	100	100	100	100	100	106.800
	2ª	78.220	100	100	100	100	100	100	78.220
TOTAL PAÍS		24/25	96	98	99	99,8	99,9	100	17.960.099
		23/24	95	98	99	99	100	100	16.564.537

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	98	100	100	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.316	100	100	100	100	100	100	3.316
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25 23/24	122.243 109.293	99,8 98	100,0 100	100 100	100 100	100 100	100 100	122.243
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	16.300	100	100	100	100	100	100	16.300
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	97	100	100	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25 23/24	135.170 116.303	99 97	100 99	100 99,7	100 99,8	100 99,9	100 99,9	135.170
Paraná	39.300	100	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	99	100	100	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	99 98	100 98	100 100	100 100	100 100	100 100	117.600
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25 23/24	26.000 22.900	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	26.000
Avellaneda	53.300	54	60	86	91	95	99	53.007
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25 23/24	236.350 182.448	90 95	91 96	97 96	98 99	99 99	99,9 99	236.057
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000	36	51	71	87	93	95	52.399
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	47	61	61	61	61	61	34.288
FORMOSA	38.000	50	60	63	63	63	65	24.700
JUJUY	3.010			31	51	66	99	2.968
SALTA	39.158	26	52	57	87	100	100	39.158
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	100	100	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	111.460	50	51	53	80	100	100	111.460
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.057.421 827.086	81 78	85 83	88 91	93 93	96 94	96 94	1.019.271

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800			11	22	26	33		4.915
	LF	95.800			17	28	31	41		39.623
T. CORRIENTES		110.600			16	27	30	40		44.538
R. S. Peña	LA	0								
	LF	3.500								
T. CHACO		3.500								
PARANA	LA	2.200								
	LF	24.520								
T. PARANÁ		26.720								
R. DEL TALA	LA	6.000								
	LF	39.000								
T. R.DEL TALA		45.000								
T. ENTRE RÍOS		71.720								
FORMOSA	LA	0								
	LF	14.400					20	27		3.888
T. FORMOSA		14.400					20	27		3.888
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	12.100						10		1.210
T. AVELLANEDA		13.600						9		1.210
RAFAELA	LA	400								
	LF	15.500								
T. RAFAELA		15.900								
T. SANTA FE		29.500						4		1.210
TOTAL PAÍS	LA	24.900			7	13	15	20		4.915
	LF	204.820			8	13	16	22		44.721
TOTAL PAÍS		24/25 23/24			8 0	13 0	16 0	22 0		49.636

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	09/01 %	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	94.800								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	57.098								
BUENOS AIRES 24/25	1.063.944	0	0	0	0	0	0		
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye	60.337						8		1.750
Marcos Juárez	21.900								3.350
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.000						9		
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25	143.537	0	0	0	0	0	4		5.280
23/24	130.430	0	0	0	0	0	4		
Paraná	5.400		19	64	83	100	100		5.400
Rosario del Tala	15.400				10	25	35		5.390
ENTRE RÍOS 24/25	20.800	0	5	17	29	44	52		10.790
23/24	9.850	0	0	25	51	88	97		
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25	258.900	0	0	0	0	0	0		
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	133.800	33	55	63	70	79	86	500	115.010
Cañada de Gómez	20.000					9	14		2.800
Casilda	3.000								
Rafaela	78.050			8	26	44	79		61.730
Venado Tuerto	1.500								
SANTA FE 24/25	236.350	19	31	51	48	60	76	500	179.540
23/24	210.300	53	55	66	79	85	90		
CATAMARCA	50								
CORRIENTES	1.620			38	55	81	100		1.620
CHACO (Charata)	62.000	55	80	100	100	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	52	84	100	100	100	100		86.150
FORMOSA	2.200				100	100	100		2.200
SALTA	375								
SAN LUIS	74.050								
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	25.385				0	3	5		1.140
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25	1.978.461	6	10	12	14	15	18	500	348.720
23/24	1.857.963	9	10	13	15	16	17		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/02/2025 al 13/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL								Humedad	
		Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	5	95	-	5	93	2	-	A/PS/S
	BRAGADO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	-	84	16	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
	LA PLATA	-	-	20	80	-	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	30	62	8	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	51	49	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	25	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	3	59	38	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	-	12	88	-	-	81	19	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	15	85	-	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	100	-	39	56	5	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	15	85	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	75	25	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	80	20	-	PS
	SAN FRANCISCO	-	-	41	39	20	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	68	32	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	60	40	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	2	11	87	34	49	15	2	R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	28	72	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	6	94	36	51	11	2	PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	22	30	48	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	9	37	54	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	27	73	-	87	13	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/02/2025 al 13/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ								
		Estadio Fenológico					Estado General			
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	61	39	-	-	100	-	-
	BOLÍVAR	-	-	40	60	-	-	64	36	-
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	70	30	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	51	49	-	-	73	27	-
	JUNÍN	-	-	10	90	-	-	49	51	-
	LA PLATA	-	5	25	70	-	20	70	10	-
	LINCOLN	-	12	22	66	-	-	77	23	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	18	47	22	13
	PERGAMINO	-	8	24	-	68	-	56	44	-
	PIGÜÉ	-	-	25	75	-	-	50	50	-
	SALLIQUELÓ	-	11	60	28	-	-	47	43	10
	TANDIL	-	2	71	27	-	-	76	24	-
	TRES ARROYOS	-	0	52	48	-	-	100	-	-
	25 DE MAYO	-	-	65	25	10	23	77	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	10	50	40	-	32	58	8	2
	MARCOS JUÁREZ	-	3	5	92	-	3	94	3	-
	RÍO CUARTO	-	10	60	30	-	-	59	23	18
	SAN FRANCISCO	-	27	35	35	2	4	74	21	-
	VILLA MARÍA	-	41	39	20	-	-	94	6	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	30	70	10	90	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	10	50	40	30	60	10	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	50	30	20	-	-	90	10	-
	SANTA ROSA	-	21	40	35	5	-	73	27	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	92	-	-	8	6	44	27	23
	CAÑADA de GÓMEZ	-	26	-	33	41	55	40	5	-
	CASILDA	-	17	-	4	79	28	56	16	-
	RAFAELA	-	18	7	23	53	23	49	20	8
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	20	50	30
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	-	-	95	5	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	71	29	-
CHACO	CHARATA	12	86	3	-	-	-	53	41	6
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	97	3	1	-	-	49	46	5
JUJUY	JUJUY	20	80	-	-	-	-	100	-	-
MISIONES	POSADAS	-	10	30	60	-	-	90	10	-
SALTA	SALTA	11	89	-	-	-	-	63	37	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	43	33	24	-	-	75	19	6
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	0	-	-	-	100	-	-
	QUIMILÍ	-	87	13	-	-	-	100	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	1	50	49	-	-	-	100	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/02/2025 al 13/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	3	97	-	-	-	-	69	31	-	-	100	-	-	-	-	72	28	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	40	38	22	-	-	72	22	6	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/PS	
	QUIMILÍ	-	69	31	-	-	-	100	-	-	-	70	30	-	-	-	100	-	-	R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	68	32	-	-	100	-	-	-	-	67	33	-	-	100	-	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

