

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

20 de febrero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 20 de febrero de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 20/02/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han acumulado más de 100mm en localidades del NOA: Metán 169mm, Rivadavia 136mm, Tartagal 105mm. También se reportaron algunos montos superiores a 100mm en el Litoral: Rosario del Tala 140mm, Mercedes 124mm. Fuera de estas áreas, se observa en el mapa una franja de lluvias que va desde el noreste de La Pampa hasta el centro-norte de Buenos Aires, con un máximo de 116mm registrado en 9 de Julio. Fueron escasas o nulas las precipitaciones en Patagonia, la mayor parte de Cuyo, de La Pampa y de Buenos Aires y el sur de Santiago del Estero.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 12/02/2025 al 18/02/2025

Entre jueves y viernes se esperan algunos acumulados en el NOA, zonas cordilleranas de Patagonia y algunas precipitaciones de diversa intensidad en Mendoza, La Pampa, sur y centro-sur de Buenos Aires. Entre domingo y martes, con el pasaje de un sistema de baja presión por el sur del país, se esperan lluvias en zonas cordilleranas de Patagonia, Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Santa Fe y centro y sur de Córdoba.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en la mitad norte del país e inferior en la mitad sur. En el norte del país se registraron máximas superiores a los 40°C, en Salta (Orán y Rivadavia), en Chaco (Resistencia y Sáenz Peña) y en Formosa (Las Lomitas). En cuanto a las mínimas, los reportes más bajos corresponden a Río Grande (-4°C) y Río Gallegos (0.6°C). Sin embargo, se destacan las bajas temperaturas registradas en el sudeste bonaerense (1°C en Benito Juárez, 2.3°C en Azul y 2.5°C en Olavarría).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 12/02/2025 al 15/02/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por encima de lo normal para todo el país. Con el establecimiento de una zona de alta presión en el Atlántico, se espera un flujo norte sostenido que ocasionará un aumento paulatino de las temperaturas en todo el país desde el jueves hasta el próximo martes. Varias localidades del norte de Patagonia, Centro, NOA y NEA van a registrar máximas sobre 35°C a partir del jueves. Además, entre este sábado y el martes de la próxima semana, localidades de Cuyo, Córdoba, NOA y NEA van a registrar máximas sobre 40°C.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Las precipitaciones en el Litoral y el norte del país generaron recargas importantes en los perfiles. En particular en Entre Ríos, donde las condiciones de sequía eran generalizadas, se estima ahora un predominio de almacenajes regulares a adecuados, con algunas áreas aún en sequía (al norte) y otras con algunos excesos temporarios (al sur).

Se observa una ampliación del área clasificada con humedad deficitaria en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y en la mayor parte de La Pampa. En Chaco se mantienen las condiciones de sequía, concentrada en el área agrícola principal de la provincia.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Los lotes implantados en la provincia de Chaco se desarrollan en etapas de inicio de floración a formación de cápsulas. Las lluvias registradas en los últimos días continúan siendo escasas para la recuperación del cultivo, estimándose pérdidas totales de, al menos, unas 2.500 ha.

En el norte de Santa Fe el cultivo se encuentra en estado muy malo a bueno según zonas. Las precipitaciones registradas durante la semana mejoraron el aspecto del cultivo, el cual se encuentra entre floración y llenado de cápsulas. Algunas plantas presentan un porte pequeño, afectando el potencial de rinde aunque se espera un rebrote de las mismas luego de estas lluvias.

Una situación similar se observa en la provincia de Santiago del Estero, en donde también se produjeron precipitaciones con un descenso marcado de la temperatura trayendo alivio al cultivo. En la zona de riego, el mismo se encuentra más avanzado en su desarrollo próximo a cosechar en, aproximadamente, 20 días; en la zona de secano el cultivo es más tardío, encontrándose en etapas vegetativas y en floración, con un regular aspecto por la falta de lluvias, informándose algunos lotes perdidos.

ARROZ

Las importantes lluvias registradas en la provincia de Corrientes impidieron continuar con la cosecha al ritmo con el que se venía haciendo. Los rindes obtenidos hasta el momento, promedian los 45 qq/ha para el tipo largo ancho y 70 qq/ha en el caso del largo fino.

En la provincia de Entre Ríos se informa el inicio de la cosecha en la zona de la delegación Paraná, en tanto que en la de Rosario del Tala, comenzaría en las próximas semanas.

En el departamento San Javier, provincia de Santa Fe, comenzó la recolección de los primeros lotes de arroz largo fino, alcanzando un 20% de avance y obteniéndose rindes de 67 qq/ha, en promedio. En esta provincia el cultivo presenta un buen a muy buen aspecto, y la mayor parte está en etapa de llenado de granos a madurez. Se los observa mejores que el año pasado debido a la alta insolación recibida y al buen aporte del riego.



GIRASOL



Durante la semana se registraron precipitaciones en prácticamente toda la provincia, pero con mayores volúmenes en la zona norte. En la región centro-sur y sur, si bien las lluvias fueron menores resultan beneficiosas para el cultivo.

En la zona norte, los lotes se encuentran en etapas de llenado a madurez, mientras que hacia el centro y sur, la mayor parte está en llenado de granos, con algunos más atrasados aún en floración. La situación del cultivo es muy variable según las lluvias registradas, encontrándose mejor en la zona norte y empeorando hacia la región sur.



El cultivo presenta un muy buen estado general. La mayor parte de los lotes están en etapa de llenado de granos y algunos, más tempranos, están en madurez comercial.

Prosigue la cosecha en las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco. En la primera, los rindes son importantes, obteniéndose máximos de más de 40 qq/ha y mínimos de 20 - 25 qq/ha, estimándose un promedio, hasta el momento, de 30 – 32 qq/ha; en tanto que en la zona norte provincial los rindes promedian los 21-23 qq/ha.



En la delegación Rosario del Tala se estima un avance de cosecha del 80%, la que se encuentra detenida por las abundantes lluvias registradas. La presente campaña fue buena para esta oleaginosa en toda la provincia, con rindes que promedian los 20-21 qq/ha.





En la zona norte, perteneciente a la delegación General Pico, se registraron precipitaciones, con acumulados que variaron entre los 10 y 60 mm. Los lotes más atrasados continúan transitando la etapa final de floración y el resto está en llenado de granos con buen estado general. A la fecha no hay presencia de enfermedades.



La cosecha en la región centro-norte se encuentra detenida o se realiza a muy lento ritmo a causa de las abundantes precipitaciones. En el área de la delegación Rafaela, los rindes continúan siendo buenos a muy buenos con promedios entre 22 y 26 qq/ha, mínimos de 14 a 16 qq/ha, máximos entre 28 y 30 qq/ha, y lotes puntuales que llegaron a 41qq/ha.

Hacia la región sur, los lotes se encuentran en etapa de madurez comercial, estimándose el inicio de la cosecha en los próximos días.



Continuaron las tareas de recolección en los departamentos del centro y norte de la delegación Quimilí, aunque de manera lenta por las lluvias. Los rindes obtenidos son bajos, oscilando entre los 9 y 12 qq/ha. En los departamentos del sur (Rivadavia, Belgrano y General Taboada) las siembras fueron posteriores, con mejores condiciones, y los lotes presentan mejor aspecto. En esta zona es donde se implanta la mayor superficie con esta oleaginosa y se estima que la cosecha comenzará en los próximos días.



MAÍZ



Se volvieron a registrar precipitaciones en toda la zona norte provincial las cuales fueron variadas en su intensidad pero con buena cantidad de milímetros. Los acumulados registrados en los primeros días de febrero han sido importantes beneficiando a los maíces tardíos y de segunda. En cambio, llegaron tarde para los maíces de siembra temprana que se encuentran en llenado de grano y los más avanzados, en madurez fisiológica, en estado regular a malo dado que su ciclo de crecimiento y floración, en los meses de diciembre y enero, transcurrieron con una importante falta de humedad edáfica y elevadas temperaturas lo que se reflejará en los bajos rendimientos. Los lotes que no tienen posibilidad de recuperación y en la medida en que puedan ser aprovechados, se están picando para la confección de reservas forrajeras.

Los maíces tardíos y de segunda están, principalmente, en etapa de floración en mejores condiciones gracias a las lluvias, por lo cual, se tiene una buena expectativa en cuanto a rindes.

En la región centro-sur y sur, si bien ocurrieron precipitaciones en la semana, las mismas no fueron suficientes para recargar el perfil del suelo e incluso fueron nulas en algunas zonas. Sumado a esto, continuaron las altas temperaturas, aumentando la evapotranspiración, y afectando al cultivo en sus diferentes estadios de desarrollo, por lo que es esperable una caída del rendimiento final.



En la semana se registraron lluvias de diferentes volúmenes, siendo mayores en la zona centro-norte de la provincia.

El maíz temprano presenta un estado general bueno a regular, encontrándose en etapa de llenado de granos a maduración. Se esperan rindes regulares ya que fueron afectados por el acortamiento del ciclo. Está finalizando el picado de los lotes destinados a forraje. El maíz tardío está entre floración y llenado de granos, y fue beneficiado por las lluvias de febrero.

En el área de la delegación San Francisco se está realizando un activo monitoreo de cogollero, principalmente en refugios, por alta presencia.





El maíz avanza diferenciando hojas y creciendo bajo condiciones de estrés térmico marcado. Se estima que apenas el 42% se encuentra en buen estado, el 46%, regular y el 12% restante en malas condiciones, por los efectos de elevadas temperaturas y baja humedad.



Durante la semana la cosecha del maíz temprano avanzó hasta alcanzar el 56% de la superficie destinada a grano, luego, las lluvias impidieron proseguir. Los rindes obtenidos promedian los 66 qq/ha. Los maíces de segunda se observan regulares por el estrés que los afectó antes de las lluvias; se encuentran en estados vegetativos a inicios de panojamiento, y se espera mejoren luego de las mismas.



En el norte provincial, (ámbito de la delegación General Pico), durante la semana se registraron precipitaciones, con acumulados que variaron entre los 10 y 60 mm. Los lotes de primera continúan transitando el período de floración y llenado de granos. El resto continúa en pleno crecimiento vegetativo, siendo los más beneficiados con las últimas precipitaciones ocurridas. Se reporta la presencia de tucuras en algunos lotes.



Se da por concluida la cosecha del maíz temprano en la zona norte (delegación Avellaneda), con un rinde promedio de 41 qq/ha. Una parte de la superficie implantada, la más afectada por el estrés hídrico-térmico, se picó con destino a ganadería. Se espera que los maíces de siembra tardía, que se encuentran en etapas vegetativas, se recuperen luego de las lluvias de las últimas semanas.



Debido a las lluvias, las tareas de cosecha del maíz temprano en la zona centro-norte (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) fueron escasas. Los rindes son buenos con promedios de 80 a 95 qq/ha, con lotes de menor rinde en el norte de 70 qq/ha aproximadamente. La condición de los cuadros es buena a muy buena. Los maíces tardíos se encuentran en fase vegetativa y floración siendo muy beneficiados por las lluvias. Se observan, en lotes de menor aptitud agrícola y con menor incidencia de lluvias, plantas de menor crecimiento y quemado de hojas.

Se mantiene el monitoreo y los controles con mayor severidad por la presencia de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) la cual ha aumentado principalmente en el norte provincial; por el momento no se registran daños de importancia.

En la zona sur, los maíces tempranos se encuentran en etapa de grano pastoso a madurez comercial. La superficie sembrada con maíces tardíos está en franca recuperación post lluvias. En los próximos días se ingresará a la floración en los planteos más precoces, con antecesor legumbre.



Esta semana se produjeron precipitaciones más o menos parejas con un descenso marcado de la temperatura, trayendo alivio al cultivo. Los primeros lotes de maíz temprano ya se encuentran en floración, mientras que los de maíz tardío están en etapa vegetativa. La presencia de chicharrita, hasta el momento y según los monitoreos, no presenta mayores inconvenientes.



Las abundantes lluvias de la semana permitieron reponer la humedad del perfil. El maíz transita aún etapas de crecimiento en la mayoría de los lotes, por lo que este aporte de humedad permite proyectar rendimientos potenciales buenos a muy buenos, en caso de que las condiciones adecuadas continúen.



MANÍ

El maní implantado en la provincia de Buenos Aires, en general, presenta un estado general bueno, con condiciones de humedad adecuadas. La etapa fenológica en la que se encuentra es floración-clavado.

En la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra transitando diferentes etapas, desde floración hasta llenado de granos. Las lluvias de febrero mejoraron su estado y, en general, presenta un muy buen estado general.

En la provincia de La Pampa los primeros lotes implantados continúan transitando el período de floración, con buen estado general.

En la región del NOA, la mayor parte de los lotes se encuentra atravesando etapas de crecimiento. La condición general del cultivo es buena.

POROTO

Las lluvias registradas en las provincias del NOA permitieron reponer la humedad del perfil que se estaba perdiendo producto de las altas temperaturas y ausencia de las mismas. Se espera que con los nuevos eventos de precipitación en los próximos días se avance en la siembra de las distintas variedades de poroto. Al poroto pallares y el mung se le van sumando el poroto negro y otros distintos a estos, quedando para más adelante las tareas de implantación del alubia. Los lotes ya emergidos evidencian una buena implantación.

En la provincia de Santiago del Estero los lotes implantados se encuentran en emergencia casi en su totalidad, beneficiados por las lluvias de esta semana.



SOJA



Se volvieron a registrar buenos volúmenes de precipitaciones, principalmente, en toda la zona norte provincial.

Las sojas de primera han recuperado vigor, lo cual podría disminuir la merma esperada en el rendimiento producto del estrés de diciembre y enero. Están en los períodos críticos de floración y llenado de granos. Tienen baja altura y poca cantidad de entrenudos, lo que va a bajar el rendimiento pero se espera un buen llenado de los granos.

Las sojas de segunda presentan distintos panoramas, habiendo lotes con una densidad muy pobre con una altura que apenas supera el rastrojo de trigo, mientras que aquellos que lograron mantener el stand de plantas han sido favorecidos por las lluvias, recuperándose y encontrándose en pleno desarrollo, comenzado a florecer los primeros lotes.



El cultivo de soja de primera está en etapa de floración y formación de vainas; el de soja de segunda está en etapa de crecimiento y floración e incluso ya se ven algunas vainas. Las lluvias caídas en estas semanas de febrero redujeron la condición de estrés mejorando la situación del cultivo, el cual ya vio afectado su rinde potencial por las altas temperaturas y la falta de humedad pasadas.



El cultivo se desarrolla en etapas vegetativas a principio de formación de vainas. Las lluvias registradas en los últimos días aún continúan siendo escasas para la recuperación de la oleaginosa, Se estiman, al menos, unas 6.000 ha que se han perdido por completo.





Los lotes de soja de primera presentan una gran variedad en su estado. Muchos han sufrido la sequía con estrés hídrico y térmico, observándose plantas que no alcanzaron a ramificar bien, con pocas yemas para generar flores, y posterior aborto de flores y chauchas a lotes con buenas perspectivas de rendimiento y buena sanidad. En general, se encuentran en estadios R3 a R6, con chaucha formada y llenado de granos los más adelantados, con mejores perspectivas por las excelentes reservas hídricas acumuladas luego de las últimas lluvias.

Los lotes de soja de segunda presentan una mejor situación ya que están comenzando la etapa de floración, y las lluvias resultan beneficiosas para esta etapa crítica.



En la zona de la delegación General Pico, al norte de la provincia, los primeros lotes se encuentran transitando el período de floración. El resto continúa en pleno crecimiento vegetativo. Las lluvias de las últimas semanas han sido muy beneficiosas para mejorar el estado general de los lotes, en particular para los más atrasados.



El estado de los lotes de soja en el área de la delegación Avellaneda es muy variable, observándose buenos a muy malos. En zonas de regular calidad, se aprecian manchones o baja densidad por muerte de plantas debido al estrés hídrico-térmico sufrido durante enero. Las lluvias registradas durante la semana permitirán la recuperación del resto de los lotes aunque estará supeditada al estado fenológico del cultivo, las sojas tempranas ya no recuperarán tamaño de planta, aunque si siguen las lluvias pueden recuperar potencial de rinde con el llenado de granos.



En el resto de la provincia, las sojas de primera se encuentran principalmente entre R3 (inicio formación vainas) y R5 (inicio formación semillas) los más adelantados. La condición de los cuadros es buena a muy buena y una proporción coincidente con grupo de madurez corto se vio más afectada en su período crítico por la falta de agua teniendo pérdida de vainas bajando su condición a regular. Se observan muy buenas respuestas a las precipitaciones registradas esta semana. Se realizaron aplicaciones contra chinches y, en determinadas zonas, contra arañuela y orugas. También las sojas de segunda están dando buenas respuestas a las precipitaciones. Actualmente se encuentran transitando las etapas R1 (inicio de floración) a R4 (plena vaina) las más adelantados. Se detectó presencia de orugas y arañuelas, que fueron tratadas.



En esta semana se produjeron precipitaciones con un descenso marcado de la temperatura trayendo un poco de alivio al cultivo que presenta muchos lotes en etapas reproductivas de floración, por lo que tendrían que seguir registrándose lluvias y de más volumen para restituir la humedad perdida en los suelos. Los lotes, en general, quedaron limitados en su crecimiento vegetativo, con menor altura y estructura de lo esperado.



Las precipitaciones registradas en la región del NOA trajeron alivio al cultivo, en momentos que está iniciando la fase reproductiva de floración. Su condición, en líneas generales, es aceptable, pero las jornadas de estrés hídrico que tuvo que atravesar lo afectaron de manera variable en relación con la situación de cada lote en particular.

SORGO GRANÍFERO



Las lluvias ocurridas favorecen al cultivo el cual se encuentra en diferentes etapas fenológicas según la fecha de siembra, desde floración a llenado de granos.





La misma situación se presenta en esta provincia, en donde se registraron lluvias que beneficiaron al cultivo, el cual, en general se encuentra comenzando el llenado de granos. En la delegación San Francisco se realizan monitoreos por encontrarse umbrales considerables de pulgón amarillo. Se están picando aquellos lotes con destino forrajero.



El cultivo está entre las etapas fenológicas de floración y madurez comercial. Su aspecto es muy dispar según la zona, la semilla implantada y la etapa fenológica afectada durante la etapa de estrés hídrico.



En la zona norte, perteneciente a la delegación Avellaneda, los sorgos más adelantados, de primera época, se encuentran madurando. Estos fueron muy afectados por el estrés hídrico-térmico de enero, por lo que una gran parte se destinará, o ya se ha destinado, a forraje. Los de segunda época de siembra están en estados vegetativos y pueden llegar a recuperarse con las lluvias de esta semana.

En el resto de la provincia el estado del cultivo se condice con el tipo de suelo y la oportunidad de haber recibido precipitaciones en momentos de mayor demanda, es por esto que hay cuadros panojados y llenando los granos con humedad adecuada en contraste con otros de desarrollo desparejo y plantas comenzando la fase de madurez.






El cultivo se encuentra en pleno crecimiento vegetativo a floración, favorecido por las lluvias de la semana.



Se da por finalizada la siembra en la provincia de Jujuy. El cultivo transita aún etapas de crecimiento en la mayoría de los lotes. El aporte de humedad de las lluvias permite proyectar rendimientos potenciales de buenos a muy buenos, en caso de que las condiciones adecuadas continúen.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	100	100	100	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	336.650	100	100	100	100	100	100	336.650
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	429.660	100	100	100	100	100	100	429.660
25 de Mayo	164.493	100	100	100	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25	3.029.653	100	100	100	100	100	100	3.029.653
23/24	3.090.580	99	100	100	100	100	100	
Laboulaye	427.616	100	100	100	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	425.700	100	100	100	100	100	100	425.700
Río Cuarto	664.520	100	100	100	100	100	100	664.520
San Francisco	572.000	97	100	100	100	100	100	572.000
Villa María	442.000	100	100	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25	2.531.836	99	100	100	100	100	100	2.531.836
23/24	3.188.920	99	100	100	100	100	100	
Paraná	127.700	100	100	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	99	100	100	100	100	100	305.000
ENTRE RÍOS 24/25	432.700	99	100	100	100	100	100	432.700
23/24	568.200	97	99	100	100	100	100	
General Pico	476.600	100	100	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25	726.600	100	100	100	100	100	100	726.600
23/24	779.100	99	100	100	100	100	100	
Avellaneda	50.000	40	86	93	93	100	100	50.000
Cañada de Gómez	183.000	100	100	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	100	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25	875.700	96	99	99,6	99,6	100	100	875.700
23/24	1.239.380	93	96	99	100	100	100	
CATAMARCA	8.450	70	100	100	100	100	100	8.450
CORRIENTES	9.590	88	88	88	88	97	100	9.590
CHACO (Charata)	84.000	26	45	70	85	99	100	84.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	43	43	43	43	43	58	94.250
FORMOSA	37.000	40	42	42	45	48	60	22.200
JUJUY	12.049	25	46	60	65	100	100	12.049
MISIONES	31.510	97	97	97	97	97	100	31.510
SALTA	359.206	43	49	70	92	100	100	359.206
SAN LUIS	351.500	100	100	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	124.100	40	45	88	98	100	100	124.100
STGO. ESTERO (Quimilí)	397.240	67	67	80	100	100	100	397.240
TUCUMÁN	61.930	68	97	100	100	100	100	61.930
TOTAL PAÍS 24/25	9.235.564	92	94	96	98,2	98,8	99,1	9.152.514
23/24	11.103.250	93	95	97	97,5	97,9	99,9	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.790	100	100	100	100	100	100	3.790
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25 23/24	122.717 109.293	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	122.717
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	15.150	100	100	100	100	100	100	15.150
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	100	100	100	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25 23/24	134.020 116.303	100 99	100 99,7	100 99,8	100 99,9	100 99,9	100 99,9	134.020
Paraná	39.300	100	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	100	100	100	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	100 98	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	117.600
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25 23/24	26.000 22.900	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	26.000
Avellaneda	49.100	60	86	91	95	99	100	49.100
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25 23/24	232.150 182.448	91 96	97 96	98 99	99 99	99,9 99	100 100	232.150
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000	51	71	87	93	95	100	55.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	61	61	61	61	61	76	42.712
FORMOSA	38.000	60	63	63	63	65	78	29.640
JUJUY	2.800		31	51	66	99	100	2.800
SALTA	39.158	52	57	87	100	100	100	39.158
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	100	100	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	110.000	51	53	80	100	100	100	110.000
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.050.875 827.086	85 83	88 91	93 93	96 94	96 94	98 94	1.029.027

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800		11	22	26	33	37		5.476
	LF	95.800		17	28	31	41	45		43.110
T. CORRIENTES		110.600		16	27	30	40	44		48.586
R. S. Peña	LA	0								
	LF	3.500								
T. CHACO		3.500								
PARANA	LA	2.200						22		484
	LF	24.520						9		2.207
T. PARANÁ		26.720						10		2.691
R. DEL TALA	LA	6.000								
	LF	39.000								
T. R.DEL TALA		45.000								
T. ENTRE RÍOS		71.720						4		2.691
FORMOSA	LA	0								
	LF	14.400				20	27	30		4.320
T. FORMOSA		14.400				20	27	30		4.320
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	12.100					10	20		2.420
T. AVELLANEDA		13.600					9	18		2.420
RAFAELA	LA	400								
	LF	15.500								
T. RAFAELA		15.900								
T. SANTA FE		29.500					4	8		2.420
TOTAL PAÍS	LA	24.900		7	13	15	20	24		5.960
	LF	204.820		8	13	16	22	25		52.057
TOTAL PAÍS		229.720		8	13	16	22	25		58.017
		202.450		0	0	0	0	1		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/01 %	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	90.522								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	59.780								
BUENOS AIRES 24/25 23/24	1.062.348 1.050.314	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	33.100					8	11		3.640
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.600					9	19		7.710
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25 23/24	155.337 130.430	0 0	0 0	0 0	0 0	4 4	7 7	0	11.350
Paraná	5.400	19	64	83	100	100	100		5.400
Rosario del Tala	15.400			10	25	35	80		12.320
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	20.800 9.850	5 0	17 25	29 51	44 88	52 97	85 100	0	17.720
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25 23/24	258.900 226.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4		
Avellaneda	139.700	55	63	70	79	86	86	50	120.490
Cañada de Gómez	20.000					9	14		5.400
Casilda	4.600								
Rafaela	78.050		8	26	44	79	87		67.900
Venado Tuerto	1.500								
SANTA FE 24/25 23/24	243.850 210.300	31 55	51 66	48 79	60 85	76 90	79 94	50	193.790
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.820		38	55	81	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	80	100	100	100	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	84	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600			100	100	100	100		2.600
SALTA	759								
SAN LUIS	74.050								
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440			0,5	3	5	6		1.350
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.994.254 1.857.963	10 10	12 13	14 15	15 16	18 17	19 19	580	376.250


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/02/2025 al 20/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	86	14	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	5	95	-	5	93	2	-	A/PS
	BRAGADO	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	-	84	16	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A/R
	LA PLATA	-	-	5	95	-	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	64	36	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	51	49	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	47	53	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	49	51	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	-	5	95	-	-	81	19	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	7	93	-	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	95	5	39	56	5	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	10	80	10	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	72	28	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	80	20	-	80	20	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	-	27	49	24	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	32	54	14	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	10	90	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	95	5	-	100	-	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	13	87	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	36	51	11	2	PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	6	29	65	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	5	25	70	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	27	73	-	87	13	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/02/2025 al 20/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ								
		Estadio Fenológico					Estado General			
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	16	84	-	-	100	-	-
	BOLÍVAR	-	-	24	76	-	-	67	33	-
	BRAGADO	-	20	10	70	-	-	70	30	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	43	57	-	-	73	27	-
	JUNÍN	-	-	10	80	10	-	49	51	-
	LA PLATA	-	-	15	85	-	20	70	10	-
	LINCOLN	-	-	22	53	25	-	77	23	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	18	47	22	13
	PERGAMINO	-	-	21	11	68	-	56	44	-
	PIGÜÉ	-	-	25	75	-	-	50	50	-
	SALLIQUELÓ	-	3	54	43	-	-	47	43	10
	TANDIL	-	-	63	37	-	-	76	24	-
	TRES ARROYOS	-	-	42	53	-	-	97	3	-
	25 DE MAYO	-	-	60	27	13	23	77	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	5	60	35	32	58	8	2
	MARCOS JUÁREZ	-	-	4	95	1	3	92	5	-
	RÍO CUARTO	-	-	60	30	10	-	59	23	18
	SAN FRANCISCO	-	19	38	41	2	4	75	21	-
	VILLA MARÍA	-	28	46	24	2	-	94	6	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	5	20	75	10	90	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	2	13	15	70	30	60	10	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	30	40	30	-	-	90	10	-
	SANTA ROSA	-	8	47	35	10	-	73	27	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	91	-	-	9	7	43	27	23
	CAÑADA de GÓMEZ	-	24	2	14	60	55	40	5	-
	CASILDA	-	17	-	-	83	28	58	14	-
	RAFAELA	-	5	19	6	70	23	49	20	8
	VENADO TUERTO	-	-	-	75	25	-	20	50	30
CATAMARCA	CATAMARCA	-	28	72	-	-	-	95	5	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	84	16	-
CHACO	CHARATA	3	92	5	-	-	-	34	49	17
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	79	18	3	-	-	49	44	7
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-
MISIONES	POSADAS	-	10	30	60	-	-	90	10	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	63	37	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	28	32	40	-	-	69	23	8
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	62	37	-	-	-	100	-	-
	QUIMILÍ	-	82	18	-	-	-	74	26	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	31	69	-	-	-	100	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/02/2025 al 20/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	3	97	-	-	-	-	69	31	-	-	100	-	-	-	-	72	28	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	31	38	31	-	-	67	27	6	-	100	-	-	-	-	64	36	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	60	40	-	-	-	100	-	-	-	62	38	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	73	27	-	-	77	23	-	-	-	80	20	-	-	80	20	-	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	48	52	-	-	100	-	-	-	-	47	53	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

