

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

27 de febrero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 27 de febrero de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 27/02/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han concentrado las precipitaciones sobre el centro de la región pampeana. Los máximos acumulados se registraron en Pehuajó (193mm), Nueve de Julio (156mm) y Trenque Lauquen (133mm). En el periodo analizado, en Rosario se sumaron 93mm y en Marcos Juárez 86mm. Fuera de la región pampeana, sólo en la provincia de San Luis se registraron precipitaciones significativas: 54mm en la capital y 52mm en Villa Reynolds.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 19/02/2025 al 25/02/2025

Entre jueves y domingo se esperan lluvias en Buenos Aires, este de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Durante el mismo periodo, en el NOA y el NEA también se podrían dar precipitaciones, pero con diversa intensidad. Durante el jueves y también el lunes, podrían darse lluvias en Neuquén y Río Negro. Luego, a partir del lunes y hasta el martes, se esperan lluvias de diversa intensidad, no tan generalizadas, en el NOA, San Luis, oeste de Córdoba y algunos sectores de la zona centro de Buenos Aires.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en prácticamente todo el territorio nacional, sobre todo en el centro y centro-oeste del país. Se registraron máximas de 43°C en las estaciones Rivadavia (Salta), Santiago del Estero y La Rioja. Solo se registraron mínimas inferiores a 5°C en Patagonia. En la región pampeana, la mínima más baja del periodo corresponde a Tandil (6.3°C).



Anomalia de la temperatura media de la semana del 19/02/2025 al 25/02/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el norte y centro del país, y en el norte de Patagonia, mientras que para el sur de Patagonia se esperan temperaturas medias normales a inferiores a lo normal. Entre jueves y martes de la próxima semana se esperan altas temperaturas en el NOA y el NEA, con varias localidades que podrían registrar máximas sobre 35°C. Además, entre lunes y martes de la próxima semana, localidades de Formosa, norte de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y sur de Misiones podrían registrar máximas sobre 40°C. Para la zona central se espera que se mantengan temperaturas cálidas entre jueves y sábado, pero entre domingo y martes se acentuarían, con máximas previstas por encima de los 35°C en el sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. En Patagonia, debido al pasaje de sistemas frontales en los próximos siete días, se esperan temperaturas bajas.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se aprecia un cambio importante en el nivel de reservas hídricas de la zona núcleo, con respecto al comienzo del mes. Incluso se estimaron algunas unidades de suelo con almacenajes excesivos en el cuadrante noroeste de Buenos Aires y, en menor medida, en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe. En el sudeste de Entre Ríos, las precipitaciones de las últimas semanas habrían generado almacenajes excesivos en lotes de soja.

Por otro lado, se mantienen las condiciones hídricas deficitarias en el este de Formosa, centro y sudoeste de Chaco, este de Santiago del Estero, este de La Pampa y sudoeste bonaerense. En el sudeste de Buenos Aires se han registrado precipitaciones, pero los almacenajes previos eran muy deficientes y las reservas profundas no se habrían recuperado aún.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

El cultivo de algodón implantado en la provincia de Chaco se encuentra en las etapas de inicio de floración a formación de cápsulas en los lotes más avanzados. Sin embargo, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones continúan condicionando el desarrollo del cultivo, que ya presenta áreas con pérdidas totales. Se reportan más de 5.500 hectáreas afectadas de manera irreversible.

En el norte de Santa Fe el cultivo se encuentra en estado muy malo a bueno según zonas, desde floración a apertura de cápsulas. Se reanudó el estrés térmico, con perspectivas en el corto plazo de estrés hídrico también. En algunos casos comenzó la etapa de madurez, con perspectivas de cosecha de los primeros lotes (algodón temprano) dentro de 10 días. Hay algodones intermedios (incluso algunos tempranos), en mal estado, que se dejarán para una segunda floración, debido a las precipitaciones ocurridas pero con la consiguiente pérdida de potencial de rinde y calidad de fibra. El algodón tardío continuará su ciclo de floración, pues no había entrado en la etapa de capsulado. El algodón de los departamentos del este está más complicado que el del oeste que ha recibido mejores lluvias, y presentan suelos mejores, además de menor presión de malezas.

En la zona de riego de la provincia de Santiago del Estero, el cultivo se encuentra más avanzado en su desarrollo próximo a cosechar en, aproximadamente, 15 días; en la zona de secano el cultivo es más tardío, encontrándose en etapas vegetativas y en floración, con un malo a regular aspecto por la falta de lluvias, informándose algunos lotes perdidos.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, la cosecha de arroz avanzó de manera lenta, con rendimientos generales bastante favorables, alcanzando un valor promedio de 45 qq/ha para el arroz largo ancho y de 70 qq/ha para el largo fino.

La provincia de Entre Ríos continúa con un buen ritmo de cosecha en la zona de la delegación Paraná, destacándose especialmente el avance del arroz largo ancho, que ya alcanzó el 54%, mientras que el largo fino el 29%. En la delegación Rosario del Tala, se trillaron los primeros lotes del largo fino en el departamento San Salvador, obteniéndose rindes que promedian los 75 qq/ha.

En Santa Fe, la cosecha de arroz largo fino avanza de manera constante en el departamento de San Javier y ha comenzado en el departamento de Garay. El rendimiento promedio en San Javier es de 68 qq/ha, mientras que en Garay alcanza los 75 qq/ha.



GIRASOL



El cultivo se encuentra entre las etapas de llenado de granos y madurez y su estado general es bueno. Las lluvias que se registraron en el transcurso de la última semana en toda la provincia resultan beneficiosas para el llenado, llegando tarde para los lotes que sufrieron estrés hídrico y térmico en sus primeras etapas. En los más avanzados, las lluvias demorarán la pérdida de humedad de los granos para comenzar la cosecha, pero antes de las mismas pudo iniciarse en el ámbito de la delegación Bolívar, obteniéndose rindes promedio del orden de los 20-23 qq/ha.



El cultivo presenta un muy buen estado general, aunque hay mucha variabilidad dada por la calidad de los suelos donde se implantó. La mayor parte de los lotes están en etapa de llenado de granos a madurez comercial.

Prosigue la cosecha de los primeros girasoles implantados en septiembre en la delegación Marcos Juárez, obteniéndose rindes muy buenos, con máximos de más de 40 qq/ha y mínimos de 20 - 25 qq/ha, estimándose un promedio, hasta el momento, de 32 – 35 qq/ha.



Con la cosecha de los últimos lotes pendientes en el área de la delegación Rosario del Tala, se da por concluida la misma en toda la provincia. Los rindes obtenidos fueron muy buenos, con valores de 21-25 qq/ha en promedio.





En la zona sur, perteneciente a la delegación Santa Rosa, se registraron algunas lluvias que promediaron los 36 mm y elevadas temperaturas, las que no afectan tanto al cultivo por poseer un sistema de raíces profundamente desplegadas. Los primeros lotes implantados se encuentran en R7-8, con algunos en R9, estimándose que en 10 días se inicia la cosecha. Los más atrasados están en R6, también en muy buen estado.



Comenzaron a cosecharse los lotes más avanzados de girasol con rendimientos acordes al promedio provincial, de unos 21 qq/ha.



En la semana, se registró un muy buen ritmo de cosecha favorecido por las altas temperaturas que aceleraron la pérdida de humedad de los granos y el pronóstico de lluvias, que adelantó las tareas, alcanzando el 87% a nivel provincial. Los rindes son buenos a muy buenos con promedios de 24 qq/ha, mínimos de 14 a 16 qq/ha, máximos entre 29 y 32 qq/ha, con lotes puntuales que llegaron a 41qq/ha.



Las tareas de recolección del girasol implantado en los departamentos del centro y norte de la delegación Quimilí están finalizadas, con rindes muy bajos del orden de los 7 a 10 qq/ha. En los departamentos del sur (Rivadavia, Belgrano y General Taboada) las siembras fueron posteriores, con mejores condiciones, por lo que los lotes presentan mejor aspecto. En esta zona es donde se implanta la mayor superficie con esta oleaginosa y se estima que la cosecha comenzará en los próximos días.



MAÍZ



Durante la semana se registraron precipitaciones en prácticamente toda la provincia, con mayores milimetrajes en la región del noroeste. Las mismas resultan beneficiosas para los maíces tardíos y de segunda, en cambio, llegan tarde para los maíces de siembra temprana que se encuentran en llenado de grano y los más avanzados, en madurez fisiológica. Los lotes que no tienen posibilidad de recuperación se están picando para la confección de reservas forrajeras.

Comenzaron a cosecharse los primeros lotes de maíz temprano en la zona perteneciente a la delegación Junín. Los rendimientos están por debajo del promedio de los últimos años, reflejando el daño ocasionado por la falta de agua y las elevadas temperaturas durante los períodos críticos de cultivo.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran entre las etapas vegetativas, floración y los más adelantados, en llenado de granos, en muy buenas condiciones, beneficiados por la adecuada humedad.

En la zona sur de la provincia las lluvias fueron muy heterogéneas en cuanto a milimetraje y distribución, registrándose mayores volúmenes en el área de las delegaciones Tandil y Tres Arroyos, siendo muy escasas hacia el este, en jurisdicción de la delegación General Madariaga y en el sudoeste, en las delegaciones Pigüé y Bahía Blanca agravándose las condiciones de estrés hídrico al sumarse las altas temperaturas, afectando al cultivo en sus diferentes estadios de desarrollo.



En la semana se registraron lluvias de diferentes volúmenes, siendo mayores en la zona centro-sur de la provincia.

El maíz sembrado temprano está finalizando su ciclo, acelerado por las altas temperaturas del mes de enero y de la semana pasada. Se esperan rindes regulares ya que fueron afectados por el acortamiento del ciclo. El maíz tardío está entre la etapa de floración y grano lechoso, beneficiado por las lluvias de esta semana y la anterior.





El maíz se encuentra desarrollándose en sus primeras etapas vegetativas con pérdidas importantes de planta entera y lento desarrollo, como resultado de un estrés térmico e hídrico importante.



Se reanudó la cosecha del maíz de primera en los lotes en que hubo piso, hasta las nuevas precipitaciones. El avance a nivel provincial se estima en 58%, con rindes de 64 a 70 qq/ha.

Los maíces de segunda se observan regulares por el estrés que los afectó antes de las lluvias. Se encuentran en estados vegetativos a inicios de panojamiento y se espera mejoren luego de las mismas.



En la delegación Santa Rosa los maíces de primera sembrados temprano actualmente se encuentran en etapa de madurez y fueron los más afectados en su rinde por haber soportado estrés hídrico y térmico en sus etapas críticas de floración y llenado. Los maíces de primera siembra tardíos, que se encuentran en etapas R1 a R2, toleraron mejor las condiciones adversas y presentan un muy buen estado. Los maíces de segunda que se sembraron con muy poca humedad, se encuentran en V10-V14, también sufrieron las situaciones de estrés, además de ataques de tucura, por lo que las lluvias de esta semana resultaron beneficiosas para revertir la situación.





En la zona norte (delegación Avellaneda) se registró un aumento de la presencia de chicharrita en las trampas de monitoreo. Se siguen aplicando insecticidas de control en las etapas vegetativas del maíz tardío, y por el momento no se observan síntomas del mal del achaparramiento. Las plantas se han recuperado debido a las lluvias recibidas la semana pasada. No se observa mortandad de plantas, pero sí estrés térmico.

En la delegación Rafaela se registró un buen avance de cosecha del maíz temprano, obteniéndose buenos rindes con promedios de 80 a 95 qq/ha, máximos puntuales de 105 qq/ha y lotes de menor rinde de 65 a 70 qq/ha, aproximadamente. Estos maíces se encuentran en su mayoría en madurez y su condición es buena a muy buena. Los maíces tardíos están en fases vegetativas, de floración y comienzo de llenado de grano, los más avanzados. Se observan en lotes de baja aptitud agrícola y con menor incidencia de lluvias, plantas de escaso crecimiento y quemado de hojas. Se mantienen los monitoreos y controles con mayor severidad por la presencia de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) la cual ha aumentado su presencia principalmente en el norte de la delegación; por el momento no se registran daños de importancia.

Durante el fin de semana se cosecharon algunos lotes en la delegación Casilda, principalmente los afectados por granizo en el sector norte del departamento Caseros y los materiales más precoces en el resto del área. Para los primeros hubo rendimientos de 70 a 80 qq/ha con 19 a 20% de humedad de grano. Los cuadros precoces sin afección por el evento de granizo están con humedad en torno al 17% y rinden cerca de 90 qq/ha. Se estima que para el grueso de la superficie implantada, el nivel productivo promedio se ubicará entre los 90 a 100 qq/ha. El maíz de segunda ha comenzado la etapa de floración y sostiene buenas expectativas de performance ya que después de las altas temperaturas del fin de semana regresaron las lluvias con volúmenes importantes.

También comenzó la cosecha en la delegación Venado Tuerto con rendimientos muy dispares según la zona, promediando, hasta el momento, los 82-83 qq/ha.



Esta semana no se produjeron precipitaciones y las temperaturas fueron elevadas afectando al cultivo el cual se encuentra en la última etapa vegetativa o en floración en el caso de los maíces tempranos. Hay lotes que ya están seriamente comprometidos y probablemente no se lleguen a cosechar. Continúan realizándose los monitoreos por la chicharrita, la cual por el momento presenta poblaciones que no son significativas.





En la semana se registraron precipitaciones en toda la zona productiva de las provincias de Salta y Jujuy. La mayor parte de los planteos con maíz aún transitan etapas vegetativas que se beneficiaron con las últimas lluvias. La situación del cereal es mayormente buena, aunque hay planteos, en algunas partes de la región, que han atravesado situaciones de estrés hídrico más prolongadas y presentan lotes en condiciones más deficientes.

MANÍ

El maní implantado en la provincia de Buenos Aires se encuentra en la etapa de floración y clavado, fase crítica para la definición del rendimiento. En términos generales, el cultivo presenta un estado sanitario favorable, con condiciones de humedad óptimas para su desarrollo.

En la provincia de Córdoba, los lotes se presentan en excelentes condiciones, con buenas perspectivas de rendimiento. Sin embargo, en Río Cuarto, la ola de calor de esta semana impactó severamente en las zonas donde no se registraron precipitaciones la semana anterior. El cultivo se encuentra en pleno clavado y llenado de grano, y en las áreas sin lluvias, ya se observa una disminución en los rendimientos.

En la región del NOA, la semana estuvo marcada por un significativo aporte de humedad debido a las precipitaciones registradas. El cultivo continúa avanzando en sus etapas de floración en la mayoría de los lotes sembrados en primera instancia, con buenas perspectivas en general, gracias al aporte hídrico reciente, que coincide con la etapa crítica del cultivo.

POROTO

Las precipitaciones registradas en las provincias del NOA permitieron la reposición de la humedad del perfil, destacándose especialmente Jujuy, donde la semana se caracterizó por un importante aporte de humedad. Este aporte hídrico ha favorecido el avance en la siembra de los distintos porotos, permitiendo continuar con las labores durante la semana. En cuanto a la emergencia, se observa un adecuado establecimiento de las plantas y un buen desarrollo inicial de los cultivos.

En la provincia de Santiago del Estero los lotes implantados se encuentran en emergencia- crecimiento, siendo necesarias precipitaciones. Se observaron algunos lotes de poroto perdidos por déficit hídrico y térmico en la zona de Río Hondo.



SOJA



Durante la semana se registraron abundantes precipitaciones en gran parte de la provincia, principalmente en las regiones norte, centro y el sudeste, siendo muy escasas en el este y sudoeste.

Las sojas de primera siguen recuperando su potencial de rendimiento. Están en los períodos críticos de floración y llenado de granos, y si bien presentan baja altura y poca cantidad de entrenudos, las lluvias aseguran el cuaje y llenado de las vainas.

Muchas sojas de segunda han sido muy afectadas por la falta de humedad edáfica y las altas temperaturas de enero, observándose un cultivo desperejo en su nacimiento, con muy poco crecimiento. Sin embargo, en las zonas que recibieron precipitaciones esporádicas durante el mes de enero, el cultivo se encuentra en una mejor situación, en etapa de floración y se observa una buena recuperación luego de las últimas lluvias.



Los lotes de soja de primera están en etapas de inicio de formación de vainas a llenado de granos; las altas temperaturas provocaron un adelantamiento del cultivo, observándose lotes que ya presentan pérdidas de hojas. Los lotes de soja de segunda están entre V3 e inicio de formación de vainas, los más avanzados, algunos de los cuales se observan desperejos y manchoneados.

Las lluvias caídas en las últimas semanas redujeron la condición de estrés mejorando la situación de aquellos lotes que pueden recuperarse. Las sojas de segunda se observan más afectadas y ya vieron reducido su rinde potencial por las altas temperaturas y la falta de humedad pasada.

En la zona de la delegación Marcos Juárez se reporta la presencia de arañuelas y trips, los que se están controlando, en tanto que en la delegación San Francisco se están realizando aplicaciones para el control del complejo de chinches.





El cultivo se desarrolla en etapas vegetativas a principio de formación de vainas bajo condiciones climáticas de temperaturas elevadas y falta de precipitaciones que continúan reduciendo la posibilidad de recuperación del cultivo. Se registran más de 7.000 ha que se han perdido por completo. Sólo una proporción de lotes, con mejor reserva de humedad en barbecho, podrían recuperarse si se registran lluvias oportunas y de buen volumen de agua en los próximos días.



Se registraron lluvias dispares pero generalizadas en toda la provincia. Las sojas de primera que venían siendo afectadas por un fuerte estrés hídrico y calórico se han recuperado con las lluvias del presente mes. En su mayor parte se encuentran en etapa fenológica de llenado de granos. También las sojas de segunda, en etapa de floración a llenado de granos, han mejorado gracias a las excelentes reservas hídricas.



En la delegación Santa Rosa, localizada en la región centro-sur de la provincia, se registraron elevadas temperaturas con máximos entre 37-40°C y lluvias que promediaron los 36 mm que aliviaron el estrés calórico e hídrico. Las sojas más adelantadas o sembradas muy temprano (principios de noviembre) están en etapas R3-R5 (inicio de formación de vainas a inicio de formación de semillas), en tanto que las más atrasadas implantadas en la primera semana de diciembre se encuentran en R3. Las sojas de segunda presentan una peor situación, encontrándose en estado vegetativo a floración (V10-R2). Se observan ataques de tucuras, arañuelas y orugas defoliadoras que se están controlando.





El estado de los lotes de soja en el área de la delegación Avellaneda es muy variable, observándose buenos a muy malos. En zonas de regular calidad se observan manchones o baja densidad por muerte de plantas debido al estrés hídrico-térmico sufrido durante enero. Las lluvias registradas en las últimas semanas permitirán la recuperación del resto de los lotes aunque estará supeditada al estado fenológico del cultivo, las sojas tempranas ya no recuperarán tamaño de planta, aunque si siguen las lluvias pueden recuperar potencial de rinde con el llenado de granos.

En el resto de la provincia, las sojas de primera se encuentran principalmente entre R3 (inicio formación vainas) y R6 (completa formación de semillas) los más adelantados. La condición de los cuadros es buena a muy buena y una proporción del grupo de madurez corto se vio más afectado en su período crítico por la falta de agua teniendo pérdidas de vainas, bajando su condición a regular. Se observan muy buenas respuestas a las precipitaciones registradas esta semana. Se realizaron aplicaciones contra chinches y, en determinadas zonas, contra arañuela y orugas.

El panorama de las sojas de segunda ha cambiado significativamente tras las últimas recargas hídricas. Se observan plantas con mayor altura, y con un número de flores cuajadas relevante tras sortear una importante etapa de sequía y estrés térmico. Algunos cuadros manifiestan irregularidades de crecimiento, ya difíciles de revertir, pero la mayor parte del área presenta un buen número de flores y vainas.



La semana nuevamente estuvo caracterizada por el intenso calor y la falta de lluvias, complicando la situación del cultivo, el cual ha empeorado notoriamente en los últimos 15 por las elevadas temperaturas. La mayoría de los lotes está en floración y algunos, aún en estado vegetativo, presentando escaso crecimiento y menor estructura.



En la semana se registraron precipitaciones en las provincias de Salta y Jujuy. Los lotes de soja empiezan su etapa de floración, beneficiada con los nuevos aportes de agua. La condición del cultivo va de regular a mayormente buena.



En la provincia de Tucumán no se registraron lluvias por lo que, junto con las temperaturas excesivamente altas, se complica la situación del cultivo el cual se encuentra en etapas reproductivas de floración y principios de llenado.

SORGO GRANÍFERO



Las lluvias ocurridas favorecen al cultivo el cual se encuentra en diferentes etapas fenológicas según la fecha de siembra, desde floración a llenado de granos.



El cultivo está transitando el periodo crítico de definición de rendimientos (floración a llenado de granos) por lo que son muy importantes las lluvias registradas durante la semana, principalmente, en la región centro-sur. Su estado general es bueno y se inició el picado de aquellos lotes destinados a forraje.

En la delegación San Francisco el cultivo se encuentra en llenado de grano, viéndose afectado por la ausencia de lluvias y las elevadas temperaturas. Se realizan monitoreos por encontrarse umbrales considerables de pulgón amarillo. Se están picando aquellos lotes con destino forrajero.



El cultivo está entre las etapas fenológicas de floración y madurez comercial. Se inició la cosecha de los primeros lotes en los departamentos de Villaguay y San Salvador, con rindes que promedian los 32 qq/ha. En general el estado del cultivo es regular con problemas de isoca cogollera y pulgón, sumado a la falta de material seminal de calidad.





En la zona norte, perteneciente a la delegación Avellaneda, los sorgos más adelantados, de primera época, se encuentran madurando, inclusive se cosecharon los primeros lotes en los departamentos Nueve de Julio y Vera con rindes que promedian los 15 y 20 qq/ha, respectivamente. Estos fueron muy afectados por el estrés hídrico-térmico de enero, por lo que una gran parte se destina a forraje. Los de segunda época de siembra están en estados vegetativos, recuperándose luego de las lluvias.

En el resto de la provincia el estado del cultivo varía según el tipo de suelo y la oportunidad de haber recibido precipitaciones en momentos de mayor demanda. En general, están finalizando su ciclo productivo e iniciando la madurez, con buenas lluvias y altas temperaturas. Continuaron las tareas de picado para consumo animal con buenos rendimientos. Se realizan aplicaciones contra pulgón amarillo.




El cultivo se encuentra en pleno crecimiento vegetativo a floración, sufriendo las altas temperaturas y la ausencia de lluvias de esta semana. La mayor parte de los lotes está en la última etapa vegetativa o inicio de la floración. Algunos lotes se ven más afectados que otros por el calor. Hay lotes que ya están seriamente comprometidos y probablemente no se lleguen a cosechar.



Los lotes de sorgo se encuentran en crecimiento vegetativo con un buen aspecto en general, a la espera de rendimientos adecuados en caso de seguir el aporte de humedad por las lluvias.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	100	100	100	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	336.650	100	100	100	100	100	100	336.650
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	429.660	100	100	100	100	100	100	429.660
25 de Mayo	164.493	100	100	100	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25	3.029.653	100	100	100	100	100	100	3.029.653
23/24	3.090.580	100	100	100	100	100	100	
Laboulaye	427.616	100	100	100	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	425.700	100	100	100	100	100	100	425.700
Río Cuarto	664.520	100	100	100	100	100	100	664.520
San Francisco	572.000	100	100	100	100	100	100	572.000
Villa María	442.000	100	100	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25	2.531.836	100	100	100	100	100	100	2.531.836
23/24	3.188.920	100	100	100	100	100	100	
Paraná	127.700	100	100	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	100	100	100	100	100	100	305.000
ENTRE RÍOS 24/25	432.700	100	100	100	100	100	100	432.700
23/24	568.200	99	100	100	100	100	100	
General Pico	476.600	100	100	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25	726.600	100	100	100	100	100	100	726.600
23/24	779.100	100	100	100	100	100	100	
Avellaneda	50.000	86	93	93	100	100	100	50.000
Cañada de Gómez	183.000	100	100	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	100	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25	875.700	99	99,6	99,6	100	100	100	875.700
23/24	1.239.380	96	99	100	100	100	100	
CATAMARCA	8.450	100	100	100	100	100	100	8.450
CORRIENTES	9.590	88	88	88	97	100	100	9.590
CHACO (Charata)	84.000	45	70	85	99	100	100	84.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	43	43	43	43	58	58	94.250
FORMOSA	37.000	42	42	45	48	60	80	29.600
JUJUY	12.049	46	60	65	100	100	100	12.049
MISIONES	31.510	97	97	97	97	100	100	31.510
SALTA	359.206	49	70	92	100	100	100	359.206
SAN LUIS	351.500	100	100	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	124.100	45	88	98	100	100	100	124.100
STGO. ESTERO (Quimilí)	397.240	67	80	100	100	100	100	397.240
TUCUMÁN	61.930	97	100	100	100	100	100	61.930
TOTAL PAÍS 24/25	9.235.564	94	96	98,2	98,8	99,1	99,2	9.159.914
23/24	11.103.250	95	97	97,5	97,9	99,9	100	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.790	100	100	100	100	100	100	3.790
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25	122.717	100	100	100	100	100	100	122.717
23/24	109.293	100	100	100	100	100	100	
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	15.150	100	100	100	100	100	100	15.150
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	100	100	100	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25	134.020	100	100	100	100	100	100	134.020
23/24	116.303	99,7	99,8	99,9	99,9	99,9	100	
Paraná	39.300	100	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	100	100	100	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25	117.600	100	100	100	100	100	100	117.600
23/24	63.150	100	100	100	100	100	100	
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25	26.000	100	100	100	100	100	100	26.000
23/24	22.900	100	100	100	100	100	100	
Avellaneda	49.100	86	91	95	99	100	100	49.100
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25	232.150	97	98	99	99,9	100	100	232.150
23/24	182.448	96	99	99	99	100	100	
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000	71	87	93	95	100	100	55.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	61	61	61	61	76	76	42.712
FORMOSA	38.000	63	63	63	65	78	90	34.200
JUJUY	2.800	31	51	66	99	100	100	2.800
SALTA	39.158	57	87	100	100	100	100	39.158
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	100	100	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	110.000	53	80	100	100	100	100	110.000
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25	1.050.875	88	93	96	96	97,9	98,4	1.033.587
23/24	827.086	91	93	94	94	94	100	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	11	22	26	33	37	39		5.772
	LF	95.800	17	28	31	41	45	45		43.110
T. CORRIENTES		110.600	16	27	30	40	44	44		48.882
R. S. Peña	LA	0								
	LF	3.500								
T. CHACO		3.500								
PARANA	LA	2.200					22	54		1.188
	LF	24.520					9	29		7.111
T. PARANÁ		26.720					10	31		8.299
R. DEL TALA	LA	6.000								
	LF	39.000						1		359
T. R.DEL TALA		45.000						1		359
T. ENTRE RÍOS		71.720					4	12		8.658
FORMOSA	LA	0								
	LF	14.400			20	27	30	35		5.040
T. FORMOSA		14.400			20	27	30	35		5.040
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	12.100				10	20	25		3.025
T. AVELLANEDA		13.600				9	18	22		3.025
RAFAELA	LA	400								
	LF	15.500						10		1.550
T. RAFAELA		15.900						10		1.550
T. SANTA FE		29.500				4	8	16		4.575
TOTAL PAÍS	LA	24.900	7	13	15	20	24	28		6.960
	LF	204.820	8	13	16	22	25	29		60.195
TOTAL PAÍS		229.720	8	13	16	22	25	29		67.155
		24/25								
		23/24	0	0	0	0	1	3		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/01 %	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800						9		7.632
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	90.522								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	59.780								
BUENOS AIRES	24/25 23/24	1.062.348 1.050.314	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	7.632
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	33.100				8	11	20		6.620
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.600				9	19	19		7.714
Villa María	8.800								
CÓRDOBA	24/25 23/24	155.337 130.430	0 0	0 0	0 0	4 4	7 7	9 14	14.334
Paraná	5.400	64	83	100	100	100	100		5.400
Rosario del Tala	15.400		10	25	35	80	100		15.400
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	20.800 9.850	17 25	29 51	44 88	52 97	85 100	100 100	20.800
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA	24/25 23/24	258.900 226.500	0 0	0 0	0 0	0 4	0 7		
Avellaneda	139.700	63	70	79	86	86	88	50	122.892
Cañada de Gómez	20.000				9	14	27		11.400
Casilda	4.600								
Rafaela	78.050	8	26	44	79	87	98		76.489
Venado Tuerto	1.500						30		450
SANTA FE	24/25 23/24	243.850 210.300	51 66	48 79	60 85	76 90	79 94	87 95	211.231
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.820	38	55	81	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600		100	100	100	100	100		2.600
SALTA	759								
SAN LUIS	74.050						1		741
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440		0,5	3	5	6	7		1.571
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.994.254 1.857.963	12 13	14 15	15 16	18 17	19 19	20 21	580 408.348


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/02/2025 al 27/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	70	30	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	47	53	5	93	2	-	A
	BRAGADO	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	98	2	-	82	18	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	100	-	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	27	73	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	57	43	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	37	63	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	68	32	-	81	19	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	1	99	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	76	24	39	56	5	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	80	20	30	60	7	3	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	69	31	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	50	50	-	80	20	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	-	21	49	30	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	44	56	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	9	91	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	36	51	11	2	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	11	72	17	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	12	87	1	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	12	88	-	87	13	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/02/2025 al 27/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	97	3	-	100	-	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	-	8	81	11	-	67	33	-	A
	BRAGADO	-	10	20	50	20	-	50	50	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	20	80	-	-	70	30	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	80	20	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	13	87	-	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	11	54	35	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	23	50	17	10	E/A
	PERGAMINO	-	-	6	26	68	-	56	44	-	A
	PIGÜÉ	-	-	25	75	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	50	50	-	-	47	43	10	A/R
	TANDIL	-	2	51	47	-	-	76	24	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	27	73	-	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	40	44	16	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	5	60	35	32	58	8	2	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	-	4	83	13	3	92	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	40	40	20	-	59	23	18	A/R
	SAN FRANCISCO	-	13	37	48	2	4	75	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	9	58	31	2	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	5	20	75	10	90	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	2	13	5	80	30	60	10	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	10	50	40	-	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	2	37	41	20	-	73	27	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	82	7	-	11	18	29	31	22	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	10	15	5	70	55	40	5	-	A/R/PS
	CASILDA	-	17	-	-	83	28	58	14	-	A
	RAFAELA	-	1	10	13	76	23	49	20	8	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	25	75	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	19	81	-	-	-	95	5	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	8	-	-	92	-	84	16	-	A/R
CHACO	CHARATA	-	86	14	-	-	-	19	53	28	R/PS/S
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	59	38	3	-	-	38	37	25	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	3	5	25	67	-	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	66	34	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	19	32	49	-	-	58	31	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	68	32	-	-	-	40	40	20	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	13	87	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/02/2025 al 27/02/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	94	6	-	-	-	77	23	-	-	93	7	-	-	-	80	20	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	31	38	31	-	-	67	27	6	-	100	-	-	-	-	64	36	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	50	50	-	-	40	40	20	-	-	60	40	-	-	47	37	16	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	29	71	-	-	100	-	-	-	-	32	68	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

