

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

6 de marzo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 6 de marzo de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 06/03/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han acumulado más de 150mm en el centro y este del país. El máximo reportado fue de 204mm en Villa María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Lo siguen los acumulados de localidades de Buenos Aires: 170mm en Bolívar, 161mm en 9 de Julio y 158mm en La Plata.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 26/02/2025 al 04/03/2025

Para el jueves se prevén tormentas en el NOA, Córdoba, sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Además, se esperan lluvias y chaparrones en el centro y sur de la Patagonia. Durante el viernes, un frente avanza desde el sudoeste hacia el noreste, provocando lluvias y tormentas sobre el norte de la Patagonia, la zona central del país y Cuyo. Hacia el sábado 8 y domingo 9, las precipitaciones alcanzan el Litoral y el NOA. Para lunes y martes de la próxima semana se esperan acumulados de diversa intensidad en el NOA.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en prácticamente todo el centro y norte del país. Se registraron máximas de más de 40°C en Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Corrientes, con un valor máximo reportado de 43.3°C en Resistencia. Solo en el sur de Patagonia la temperatura media del periodo resultó inferior a la normal.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 26/02/2025 al 04/03/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en NEA y algunos sectores del centro-este. Para el NOA, centro-oeste y sur de Argentina se esperan temperaturas normales a levemente por debajo de lo normal para esta época. Para mañana jueves hasta el viernes se esperan temperaturas máximas sobre 35°C e incluso sobre 40°C en localidades del centro y norte del Litoral y en el este de Salta y en Santiago del Estero. El avance de un sistema frontal en el país hará descender las temperaturas el sábado en el centro del país y se extendería el descenso para el norte durante el domingo. A partir del lunes se espera que paulatinamente vayan en aumento nuevamente las temperaturas en la zona central y norte de Argentina.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En los últimos días se han registrado lluvias persistentes en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Entre Ríos, que han generado un aumento considerable del área afectada por excesos hídricos. Las reservas deficitarias del periodo previo en esta zona han sido revertidas totalmente.

En Córdoba no se habrían generado excesos hídricos (solo en el extremo norte) pero las lluvias fueron significativas y recuperaron ampliamente los perfiles, llevando las reservas a condiciones adecuadas a óptimas.

Contrariamente, se mantiene la falta de lluvias normales en gran parte del NEA. El área clasificada con sequía abarca actualmente la mayor parte de Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Fuera de estas provincias, persisten las condiciones secas en el límite entre Corrientes y Entre Ríos, además del extremo sudoeste de Buenos Aires y sudeste de La Pampa.

El NOA continuó recibiendo lluvias, aunque se estima un leve desecamiento que lleva la franja agrícola a condiciones de humedad regulares a adecuadas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

La situación del cultivo de algodón en la provincia de Chaco sigue siendo adversa debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, factores que continúan limitando el desarrollo fenológico de las plantaciones. Las pérdidas han aumentado a 7.000 hectáreas, afectando de forma irreversible las áreas comprometidas.

En la delegación Avellaneda, al norte de Santa Fe, el cultivo presenta un estado variable, desde condiciones casi óptimas hasta buenas, dependiendo de la zona. El desarrollo va desde el estadio de pimpollado hasta la apertura de cápsulas. El estrés térmico sigue siendo una constante, aunque el estrés hídrico ha sido parcialmente aliviado por las precipitaciones recientes. Actualmente, se están aplicando reguladores de crecimiento con el fin de inducir la sincronización de la cosecha, que se prevé se inicie en los próximos días. En algunas áreas, se observa una marcada variabilidad fenológica, con casos de segunda floración en desarrollo.

En la provincia de Santiago del Estero, el cultivo se encuentra atravesando una etapa crítica de su ciclo de desarrollo. En la zona de Tintina, los lotes han alcanzado el final de la floración efectiva. En la región de riego, el cultivo muestra un mayor avance fenológico, con los primeros lotes próximos a ser cosechados en aproximadamente 15 días. Por otro lado, en la zona de secano, el desarrollo es más retrasado, y el cultivo está siendo gravemente afectado por la escasez de precipitaciones, aunque aún mantiene cierta resistencia. Se reportan, además, algunos lotes perdidos debido a estas condiciones adversas. En la delegación Quimilí, el cultivo continúa su desarrollo, habiéndose completado la mayoría de las etapas reproductivas, aunque seriamente perjudicado por los efectos del estrés térmico y la falta de precipitaciones en la mayoría de los lotes.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, la cosecha ha avanzado 5 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, alcanzando a cubrir casi la mitad de la superficie implantada. Se mantienen los rendimientos elevados.

En la provincia de Entre Ríos, en la zona de la delegación Paraná, la cosecha avanza a buen ritmo, con rendimientos promedio de 61 qq/ha para la variedad largo ancho y 77 qq/ha para la variedad largo fino. En la delegación Rosario del Tala, el acumulado mensual de precipitaciones ha provocado desbordes generalizados de arroyos y acequias, por lo que, los caminos están intransitables dificultando considerablemente el progreso de la cosecha del cultivo.



Durante la presente semana, se han registrado abundante precipitaciones en el norte de Santa Fe por lo que el avance de cosecha fue mínimo o nulo. El arroz largo fino se encuentra en estado bueno a muy bueno, predominando la fase de llenado de granos o madurez. Ya se ha cosechado, aproximadamente, el 33% de la superficie sembrada. En los lotes de arroz largo ancho, los más avanzados en su proceso de maduración presentan un estado que varía de bueno a muy bueno.

GIRASOL



Durante la semana informada se han registrado abundantes precipitaciones en todo el ámbito provincial. Esta situación repercute de diferentes maneras en el cultivo en función del estado fenológico del mismo. En la zona centro norte provincial el mismo se encuentra, mayoritariamente, entre madurez fenológica y comercial por lo que en aquellas zonas donde se iniciaron las labores de cosecha de los primeros lotes, estas se han interrumpido, mientras que en los restantes, el descenso hídrico para alcanzar la humedad óptima de cosecha será complejo. Desde el centro y hacia el sur/sudeste, donde se encuentra la mayor superficie, el cultivo se encuentra en llenado de granos, por lo que en el actual contexto climático este proceso será prolongado en el tiempo. Se espera que los rendimientos se encuentren dentro de los valores promedios, ya que el cultivo en general, se desarrolló sin inconvenientes y no se han reportado problemas sanitarios por enfermedades o presencia de plagas importantes.



La cosecha prosigue en áreas que abarcan las delegaciones de Marcos Juárez y San Francisco. Si bien el cultivo se encuentra implantado en una amplia zona con una gran variabilidad de ambientes, en general el cultivo se ha desarrollado sin inconvenientes y en lo que respecta a los rendimientos que se vienen obteniendo, estos son considerados muy buenos, y se reportan valores que en lotes puntuales superan los 40 qq/ha. Los lotes restantes se desarrollan en etapas que van desde llenado hasta madurez fisiológica en muy buen estado general.





Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, en donde los mayores valores pluviométricos ocurrieron en la zona norte que comprende a la delegación General Pico, y en donde las lluvias alcanzaron hasta los 200mm en algunas localidades. También ocurrieron precipitaciones en la zona sur, algo más moderadas y que promediaron aproximadamente los 30mm. En ambos casos, los primeros lotes sembrados ya se encuentran en madurez comercial, a la espera de alcanzar la humedad óptima de cosecha, y se estima que de no mediar inconvenientes las labores se inicien los próximos días. Los lotes restantes se encuentran entre llenado e inicios de madurez, en muy buen estado. En todos los casos se prevén buenos rendimientos.



La cosecha iniciada la semana pasada se ha interrumpido a causa de las precipitaciones ocurridas durante la semana. Se estima que las tareas se reanuden en cuanto se produzca un descenso de humedad. Los rendimientos obtenidos a la fecha se sitúan dentro de los promedios regionales.



También se registraron importantes precipitaciones en todo el ámbito provincial, provocando la interrupción generalizada de la cosecha.

En la zona norte provincial, que corresponde a la delegación Avellaneda, la cosecha ya ha finalizado en los departamentos al este, con rendimientos que promediaron los 17 qq/ha, mientras que en los departamentos del oeste, la cosecha se prolongará hasta el mes de abril. Los rendimientos obtenidos se ubican por encima de los 20 qq/ha.

En la zona de Rafaela, restan escasos lotes para finalizar la cosecha. Los rendimientos obtenidos fueron muy buenos y promediaron alrededor de los 26 qq/ha.

En la zona de Cañada de Gómez, los rendimientos se encuentran en torno a los 30 qq/ha.





La cosecha ya ha finalizado en los departamentos del centro y norte de la delegación Quimilí, mientras que en los departamentos Rivadavia, Belgrano y General Taboada, que es la zona con mayor superficie sembrada, los lotes fueron implantados más tardíamente, y el cultivo presenta mejores condiciones, y la cosecha aún no ha iniciado.

MAÍZ



Durante la semana se registraron lluvias en toda la provincia con valores elevados superiores a los 100 mm en la región centro-noroeste que provocaron anegamientos temporarios en los lotes.

Las mismas no tienen incidencia en los maíces tempranos listos para cosecharse en el norte provincial o en inicios de maduración en la región sur cuyos rindes ya están afectados por el déficit hídrico y las altas temperaturas de diciembre y enero pero son beneficiosas para los maíces tardíos y de segunda que se encuentran en floración y tendrán buena disponibilidad hídrica para su posterior llenado de granos, y si bien no tienen gran altura, la mayoría presentan dos espigas y bien completas con sus granos.

En la zona de General Madariaga las precipitaciones han dado un alivio a la situación de marcado estrés hídrico, si bien para muchos lotes llegaron tarde, ya que han pasado prácticamente todo su período crítico de definición de rendimiento en situación de estrés, lo que impactará en el rendimiento final.

Se informa el inicio de la cosecha de los primeros lotes en los partidos de General Arenales y Rojas en el norte provincial, obteniéndose rindes de 80 qq/ha.





En la semana se registraron lluvias de diferentes volúmenes, siendo mayores en la zona centro-norte de la provincia.

El maíz sembrado temprano está finalizando su ciclo, acelerado por las altas temperaturas de los meses de enero y febrero. Se esperan rindes regulares ya que fueron afectados por el acortamiento del ciclo. El maíz tardío está entre las etapas de floración y llenado de granos, favorecido por las lluvias de fines de febrero y comienzos de marzo.

Se inició la cosecha de los primeros lotes en el departamento de Marcos Juárez con rindes muy dispares que varían de 80 a 140 qq/ha, siendo el promedio de 90 - 95 qq/ha.



El maíz se desarrolla en etapas de crecimiento vegetativo a grano lechoso bajo condiciones de muy elevadas temperaturas y ausencia de lluvias provocando daños severos al cultivo con quemado de hojas y estrés hídrico generalizado, registrándose ya pérdidas de lotes. Se da por concluida la siembra en el área de la delegación Roque Sáenz Peña con una menor superficie implantada a la estimada inicialmente debido a las condiciones de sequía.



Las abundantes precipitaciones ocurridas en gran parte de la provincia han mejorado la condición de los lotes tardíos y de segunda, que se encuentran transitando etapas entre R1 y R3 con una condición buena a muy buena. Debido a este evento meteorológico no hubo un mayor avance en la cosecha la cual se estima en un 61%.

Según el informe del 27/02 de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis se registró un nuevo incremento de la presencia de la plaga, en consonancia con la época del año y la masividad de los cultivos de maíz, aunque lejos de la situación del año anterior. La decisión de haber optado por un mayor porcentaje de siembras tempranas permitió evitar a la plaga en una gran parte de la superficie implantada con el cereal, ya que, aproximadamente, el 90% de la superficie total de maíz o bien está cosechado o ya se encuentra en madurez o estadios reproductivos avanzados. El riesgo persiste para el maíz tardío o de segunda, que si bien se ha sembrado poco hay que seguir monitoreando intensivamente para eventualmente incrementar los controles.





En la región norte (delegación General Pico) durante la semana se registraron precipitaciones, con acumulados que, en algunas localidades, llegaron a los 200 mm. Los lotes de primera más avanzados ya se encuentran en período de madurez. El resto continúa transitando el periodo de floración y llenado de granos, siendo los más beneficiados con las últimas precipitaciones ocurridas.

En la región centro-sur (delegación Santa Rosa), las lluvias promediaron los 36 mm. Los maíces de primera tempranos que pasaron el mes de enero con pocas lluvias y altas temperaturas actualmente se encuentran en plena madurez (R5-R6), siendo los cultivos de primera siembra tardía (que se encuentran entre R3-R4) los que mejor toleraron estas condiciones adversas y en la actualidad se encuentran en muy buen a excelente estado. Los sembrados de segunda que se sembraron con muy poca humedad, se observan con pocas plantas, soportando mucho estrés, actualmente se encuentran en etapas VT- R1 mejorando un poco su condición. Se observa incipiente evolución de roya anaranjada que se estima no va a afectar al cultivo.



Se registraron precipitaciones en diferentes sectores de la provincia, con milimetrajes muy variados los cuales fueron desde los 10 hasta los 290mm, por lo cual hay zonas donde los maíces ya van a reflejar una disminución en el rendimiento final. Se están picando varios lotes de maíz para forraje.



En la zona norte (delegación Avellaneda) el maíz de segunda época comenzó la etapa de floración presentando un estado bueno a muy bueno. Si bien sigue la ola de calor, la cual está generando una notable situación de estrés térmico, las últimas lluvias atemperaron los síntomas. La zona más afectada es el norte del departamento General Obligado, en donde no se registraron grandes volúmenes de precipitaciones. Se observan plantas con síntomas de Spiroplasma, en algunos lotes del departamento General Obligado, pero aún no son graves.



En la región que abarca la delegación Rafaela, se registraron precipitaciones abundantes con acumulados entre 90 y 170mm, con zonas puntuales como Curupaity con una marca de 260mm, lo que impidió avanzar con la cosecha. Los maíces tempranos se encuentran en madurez, en condiciones buenas a muy buena, en tanto que los tardíos están en floración y llenado de granos, siendo muy beneficiados por las abundantes lluvias. Se observan dos realidades distintas, una con lotes muy afectados por las temperaturas y la poca disponibilidad de agua en el norte de la delegación que presentan plantas de menor porte y menor cantidad de granos fijados con mermas de rendimiento, e incluso lotes que se destinaron a forraje y otra, en el centro-sur, que muestran plantas con mejor estructura y menor afectación durante la floración y buena determinación de número de granos. Se mantienen los monitoreos y controles con mayor severidad debido al aumento de población de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) principalmente en el norte de la delegación.

La persistencia del mal tiempo impide continuar con las labores de recolección del maíz temprano en el área de las delegaciones Cañada de Gómez y Casilda. El maíz tardío recupera su potencial ante las abundantes precipitaciones. En general, se encuentran en floración y comenzando a formar granos, por lo que las expectativas de lograr buenos rendimientos se incrementan. No se registra presencia de chicharritas, por el momento.

En el ámbito de la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha, pero por el momento está detenida debido a las lluvias en toda la zona. Los rendimientos siguen siendo muy dispares según la fecha de siembra y lluvias ocurridas durante el ciclo.



La situación de los cultivos se ha complicado aún más principalmente en el área de la delegación Quimilí por las elevadas temperaturas salvo algunas zonas que recibieron buenas lluvias en la presente semana (de 50 a 120 mm), que son las mismas que venían recibiendo mejores registros, pero son una proporción pequeña con respecto a la zona donde llovió poco y nada (0 a 7 mm). En esta amplia zona las pérdidas en algunos casos son totales y sin posibilidades de recuperación, y hay otras en las que todavía una lluvia puede mejorar los rendimientos. La mayor parte de los lotes está en la última etapa vegetativa o inicio de la floración. Hay también campos que se sembraron muy tarde, estando ahora en V5 o V6. Algunos lotes se ven más afectados que otros por el calor en los que las pérdidas son totales. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, con lotes en buen estado.





Si bien la mayor parte de los planteos con maíz aún transitan etapas vegetativas, un porcentaje importante ha alcanzado la floración y atraviesa el período crítico al tiempo que se ve beneficiada por los renovados eventos de precipitaciones. La situación del cereal es mayormente buena, aunque hay planteos en algunas partes de la región que han atravesado situaciones de estrés hídrico más prolongadas y presentan lotes con el cereal en condición más deficiente.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires el cultivo se encuentra en las etapas de floración y llenado de vainas, fases críticas para la definición del rendimiento. En términos generales, el cultivo exhibe un estado sanitario favorable, con condiciones de humedad óptimas que favorecen su desarrollo. De todas maneras, las precipitaciones excesivas registradas en algunas zonas podrían afectar negativamente al cultivo.

En la provincia de Córdoba, los lotes se encuentran en el período crítico de definición del rendimiento, presentando condiciones óptimas en la mayoría de las localidades y buenas perspectivas productivas. Sin embargo, en la localidad de Río Cuarto, el cultivo, que se encuentra en pleno proceso de clavado y llenado de granos, está siendo afectado por la presencia de arañuelas.

En la zona de influencia de la delegación General Pico, al norte de La Pampa, los primeros lotes del cultivo se encuentran en la fase de llenado de granos, exhibiendo un estado general óptimo.

En la región del NOA, el cultivo continúa avanzando en las etapas de floración en los lotes implantados en primera instancia, mientras que otros se encuentran en estado vegetativo, en condiciones generales favorables. El reciente aporte hídrico, ha mejorado significativamente los cuadros afectados por la sequía de febrero, favoreciendo el desarrollo del cultivo.

POROTO

Debido a la falta de humedad en el perfil del suelo, se suspendió la siembra de porotos en la provincia de Jujuy. No obstante, se ha reanudado la siembra de algunos lotes gracias a las precipitaciones recientes, cuya intensidad varió según la zona.



En Salta, las últimas lluvias han facilitado el avance en la siembra de poroto. En este momento, las labores se están intensificando especialmente en la variedad alubia, aprovechando la adecuada disponibilidad de humedad superficial, lo que permite realizar la siembra en fechas óptimas.

En Santiago del Estero, las precipitaciones fueron irregulares, con valores bajos y distribuidas de manera desigual a lo largo de la provincia. Las temperaturas se mantuvieron elevadas, al igual que la semana anterior. La siembra de poroto en la región se realizó de manera tardía, por lo que actualmente se encuentra en estado de emergencia y crecimiento activo. Además, se registraron pérdidas en algunos lotes de porotos en la zona de Termas de Río Hondo. En la delegación Quimilí, en las semanas previas, se pudo realizar la siembra de poroto, mayoritariamente de la variedad negra. La mayoría de los lotes se encuentra en fase vegetativa, pero están siendo afectados por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones.

En Tucumán, las lluvias se han presentado de manera irregular, acompañadas de altas temperaturas, lo que está generando dificultades en los cultivos que se encuentran en etapas reproductivas, las cuales son críticas para la definición del rendimiento. Se estima una reducción en la superficie de porotos, debido a que las precipitaciones fueron tardías y de baja intensidad.

SOJA



Durante esta última semana, se han desarrollado precipitaciones de forma generalizada en toda la provincia. Estos aportes hídricos resultan muy beneficiosos para el cultivo que se desarrolla en diferentes etapas dependiendo de la fecha de siembra.

Las sojas de primera implantadas en la zona norte provincial, presentan importantes mejoras en el estado general ante este nuevo contexto climático. Si bien se estima que los efectos de la escasez hídrica podrían haber afectado el rendimiento potencial, las mermas no serán relevantes ya que podrán ser compensadas por la mejora en otros componentes del rendimiento. Las sojas de segunda, en cambio, presentan cierto grado de recuperación, pero en muchos casos, el deterioro es irreversible ante la prolongada escasez hídrica durante la emergencia y etapas posteriores, lo que ha provocado pérdida de lotes, manchoneo y escaso desarrollo.

En la zona centro y sur de la provincia, las mejoras en las condiciones de humedad inciden positivamente en el cultivo, tanto de primera como de segunda, que presenta progresivos síntomas de recuperación.





Durante la semana informada, se registraron precipitaciones de variada intensidad, pero de forma generalizada en todo el ámbito provincial.

Las sojas de primera que en la mayoría de los casos se encuentran en la etapa de llenado, si bien afectadas por la falta de humedad, presentan buen estado general, y se prevé que los últimos aportes hídricos impacten en el componente del peso de los granos evitando grandes mermas en la producción final.

Respecto a las sojas de segunda, se han desarrollado prácticamente desde las etapas iniciales, en condiciones desfavorables, y el cultivo presenta escaso desarrollo. Sin embargo, ante este nuevo escenario climático se espera una leve mejora en el aspecto general, y por lo tanto una reducción de las pérdidas.

En el aspecto sanitario se reporta presencia de chinches, en cantidades moderadas.



Las condiciones de elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones que se registran en prácticamente toda la provincia continúan deteriorando el estado del cultivo implantado. Las pérdidas son significativas, en donde los cuadros más comprometidos muestran daños irreversibles, y solamente los cuadros con mejor manejo podrían alcanzar cierto potencial productivo de producirse mejoras climáticas en el corto plazo.



Durante la semana han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial. En la zona norte de la delegación Paraná, los registros fueron menores y ocurrieron de forma tardía para ser aprovechados por el cultivo. No obstante, el cultivo se encuentra recuperado y en términos generales, presenta un estado entre bueno y muy bueno. En lo que respecta a la fenología la soja de primera transita etapas de formación de vainas hasta llenado de granos y las de segunda entre inicio de floración y formación de vainas.





Las últimas lluvias ocurridas en la provincia resultan muy beneficiosas para el cultivo implantado. Estas fueron de mayor envergadura en la zona de la delegación General Pico con registros que alcanzaron hasta los 200mm. En esta zona los lotes de primera más adelantados se encuentran transitando el período de llenado de granos, con buen estado general. Los cultivos de segunda están empezando a transitar la etapa de floración.

En el sur de la provincia que comprende a la delegación Santa Rosa, las precipitaciones promediaron los 36,6mm, y la reserva hídrica se mantiene entre buena y regular. En esta zona, el cultivo de soja de primera en términos generales presenta buen estado general, mientras que las sojas de segunda, muy afectadas por la escasez hídrica, presenta lotes desperejados, con ataques intensos de arañuela, isocas defoliadoras y chiches.



En la zona norte de la provincia, que abarca a la delegación Avellaneda, el cultivo presenta síntomas de recuperación luego de las últimas precipitaciones registradas. No obstante, la importante afectación por la sequía, induce a estimar importantes pérdidas en el potencial de rendimiento.

Algo más al sur, en la zona de la delegación Rafaela, el cultivo de soja de primera que se encuentra atravesando etapas entre R3 y R5 muestra una buena respuesta ante las abundantes precipitaciones recibidas. El estado de los planteos es bueno, pero dependiente del grupo de madurez, ya que los ciclos cortos se han visto más perjudicados por la falta de humedad durante etapas críticas. Estos se ubican mayoritariamente en la zona de San Cristóbal, en donde el cultivo presenta un estado entre regular y malo. En el caso de las sojas de segunda, se presentan dos situaciones: los lotes implantados en el norte de la delegación, con escasas precipitaciones, lo que determina planteos deteriorados, cuyos lotes presentan plantas de escaso porte, pérdida de vainas y por ende menor número de granos por planta, y aquellos ubicados en el centro sur, con muy buenas precipitaciones recibidas y en donde se presentan lotes recuperados, y con buenas expectativas de rendimiento.

En la zona centro sur provincial, las sojas de primera presentan en general buenas condiciones y muchos planteos se presentan recuperados, sobre todo aquellos que se encuentran transitando la etapa de llenado.



Las sojas de segunda que se encuentran en etapas entre R2 y R5, manifiestan una mejoría en el estado general, incrementando la altura de plantas, el área foliar y la producción de flores y vainas. Respecto al estado sanitario, la elevada humedad relativa predispone condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades de fin de ciclo, cuyos tratamientos preventivos podrán realizarse a medida que mejoren las condiciones de piso de los lotes.



Las precipitaciones ocurridas en el contexto de las elevadas temperaturas, junto con los escasos volúmenes recibidos, impiden modificar el estado hídrico de los suelos que se mantienen en niveles entre regulares y principio de sequía.

En la zona de Quimilí, el cultivo implantado, continúa deteriorándose y se manifiestan importantes síntomas de estrés y escaso desarrollo vegetativo. La mayoría de los lotes se encuentra en etapas entre floración e inicios de llenado, por lo que es importante la ocurrencia de precipitaciones en el corto plazo. En los Departamentos Belgrano, General. Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, y se informan lotes con muy buen estado general.



Durante la semana se han registrado precipitaciones de variada intensidad en toda la región. Si bien el volumen registrado no fue importante, estas han favorecido al cultivo que en la mayoría de los planteos se encuentra transitando la etapa de floración. La condición del cultivo es entre buena y regular dependiendo de los aportes hídricos recibidos.



SORGO GRANÍFERO



Las lluvias ocurridas en toda la provincia favorecen al cultivo el cual se encuentra en diferentes etapas fenológicas según la fecha de siembra, desde floración a maduración, aunque en este caso las mismas no tienen incidencia ya que están listos para comenzar a cosecharse.



El cultivo está transitando el periodo crítico de definición de rendimientos (floración a llenado de granos) por lo que son muy importantes las lluvias registradas durante las últimas semanas, principalmente, en la región centro-norte. Su estado general es bueno y se inició el picado de aquellos lotes destinados a forraje.



El sorgo se encuentra en estado regular a malo debido a la falta de lluvias y a los continuos días con temperaturas extremas. Se observan daños irreversibles en hojas y estructuras reproductivas, impidiendo su adecuado desarrollo.



El cultivo está entre las etapas fenológicas de floración y madurez comercial. Se generalizó la cosecha en todo el ámbito de la delegación Rosario del Tala, con rindes que promedian los 32 qq/ha. En general el estado del cultivo es regular con problemas de isoca cogollera y pulgón, sumado a la falta de material seminal de calidad.



Prosiguió la cosecha de los sorgos más adelantados, de primera época en el departamento Nueve de Julio en el norte provincial, con rindes que promedian los 17 qq/ha. Estos fueron muy afectados por el estrés hídrico-térmico de enero, por lo que una gran parte se destina a forraje. Los de segunda época de siembra están en estados vegetativos, la mayor parte, en tanto que los más avanzados están floreciendo, recuperándose luego de las lluvias.

En el resto de la provincia, los lotes de sorgo reactivaron su tasa de crecimiento luego de las precipitaciones. Las etapas fenológicas predominantes son floración y llenado de granos, con los más avanzados iniciando la madurez. La condición de los cuadros es muy buena en lotes agrícolas, buena a regular en el resto y mala en lotes de menor aptitud agrícola con plantas de menor desarrollo y altura.




El cultivo se encuentra en pleno crecimiento vegetativo a floración, sufriendo las altas temperaturas y siendo beneficiado por las lluvias en las zonas en donde se registraron buenos volúmenes. Hay lotes que ya están seriamente comprometidos y probablemente no se lleguen a cosechar.



El sorgo granífero se encuentra mayormente en estado vegetativo, aunque un porcentaje importante ha alcanzado la floración. La condición del cultivo, por lo general, es buena.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	06/03 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	100	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	100	100	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	100	100	100	100	100	100	60.000
Lincoln	300.000	100	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	336.650	100	100	100	100	100	100	336.650
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	429.660	100	100	100	100	100	100	429.660
25 de Mayo	164.493	100	100	100	100	100	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25	3.029.653	100	100	100	100	100	100	3.029.653
23/24	3.090.580	100	100	100	100	100	100	
Laboulaye	427.616	100	100	100	100	100	100	427.616
Marcos Juárez	425.700	100	100	100	100	100	100	425.700
Río Cuarto	664.520	100	100	100	100	100	100	664.520
San Francisco	572.000	100	100	100	100	100	100	572.000
Villa María	442.000	100	100	100	100	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25	2.531.836	100	100	100	100	100	100	2.531.836
23/24	3.188.920	100	100	100	100	100	100	
Paraná	127.700	100	100	100	100	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	100	100	100	100	100	100	305.000
ENTRE RÍOS 24/25	432.700	100	100	100	100	100	100	432.700
23/24	568.200	100	100	100	100	100	100	
General Pico	476.600	100	100	100	100	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25	726.600	100	100	100	100	100	100	726.600
23/24	779.100	100	100	100	100	100	100	
Avellaneda	50.000	93	93	100	100	100	100	50.000
Cañada de Gómez	183.000	100	100	100	100	100	100	183.000
Casilda	139.400	100	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	100	100	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25	875.700	99,6	99,6	100	100	100	100	875.700
23/24	1.239.380	99	100	100	100	100	100	
CATAMARCA	8.450	100	100	100	100	100	100	8.450
CORRIENTES	9.590	88	88	97	100	100	100	9.590
CHACO (Charata)	84.000	70	85	99	100	100	100	84.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	43	43	43	58	58	100	162.500
FORMOSA	37.000	42	45	48	60	80	100	37.000
JUJUY	12.049	60	65	100	100	100	100	12.049
MISIONES	31.510	97	97	97	100	100	100	31.510
SALTA	359.206	70	92	100	100	100	100	359.206
SAN LUIS	351.500	100	100	100	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO	124.100	88	98	100	100	100	100	124.100
STGO. ESTERO (Quimilí)	397.240	80	100	100	100	100	100	397.240
TUCUMÁN	61.930	100	100	100	100	100	100	61.930
TOTAL PAÍS 24/25	9.235.564	96	98	98,8	99,1	99,2	100	9.235.564
23/24	11.103.250	97	98	97,9	99,9	100	100	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	06/03 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.790	100	100	100	100	100	100	3.790
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25 23/24	122.717 109.293	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	122.717
Laboulaye	14.670	100	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	15.150	100	100	100	100	100	100	15.150
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	100	100	100	100	100	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25 23/24	134.020 116.303	100 99,8	100 99,9	100 99,9	100 99,9	100 100	100 100	134.020
Paraná	39.300	100	100	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	100	100	100	100	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	117.600
General Pico	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25 23/24	26.000 22.900	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	26.000
Avellaneda	49.100	91	95	99	100	100	100	49.100
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25 23/24	232.150 182.448	98 99	99 99	100 99	100 100	100 100	100 100	232.150
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000	87	93	95	100	100	100	55.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	61	61	61	76	76	100	56.200
FORMOSA	38.000	63	63	65	78	90	100	38.000
JUJUY	2.800	51	66	99	100	100	100	2.800
SALTA	39.158	87	100	100	100	100	100	39.158
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	100	100	100	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	110.000	80	100	100	100	100	100	110.000
TUCUMÁN	20.600	100	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.050.875 827.086	93 93	96 94	96 94	98 94	98,4 100	100 100	1.050.875

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	06/03	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	22	26	33	37	39	45		6.660
	LF	95.800	28	31	41	45	45	50		47.900
T. CORRIENTES		110.600	27	30	40	44	44	49		54.560
R. S. Peña	LA	0								
	LF	3.500						30		1.050
T. CHACO		3.500						30		1.050
PARANA	LA	2.200				22	54	85		1.870
	LF	24.520				9	29	46		11.279
T. PARANÁ		26.720				10	31	49		13.149
R. DEL TALA	LA	6.000						7		420
	LF	39.000					1	8		3.120
T. R.DEL TALA		45.000					1	8		3.540
T. ENTRE RÍOS		71.720				4	12	23		16.689
FORMOSA	LA	0								
	LF	14.400		20	27	30	35	42		6.048
T. FORMOSA		14.400		20	27	30	35	42		6.048
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	12.100			10	20	25	35		4.235
T. AVELLANEDA		13.600			9	18	22	31		4.235
RAFAELA	LA	400						10		40
	LF	15.500					10	35		5.425
T. RAFAELA		15.900					10	34		5.465
T. SANTA FE		29.500			4	8	16	33		9.700
TOTAL PAÍS	LA	24.900	13	15	20	24	28	36		8.990
	LF	204.820	13	16	22	25	29	39		79.057
TOTAL PAÍS		24/25	13	16	22	25	29	38		88.047
		23/24	0	0	0	1	3	9		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/01 %	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	06/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800					9	9		7.632
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	90.522						10		9.052
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Saliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	59.780							598	
BUENOS AIRES 24/25 23/24	1.062.348 1.050.314	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	2 8	598	16.684
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	33.100			8	11	20	21		7.011
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.600			9	19	19	21		8.481
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25 23/24	155.337 130.430	0 0	0 0	4 4	7 7	9 14	10 23		15.492
Paraná	5.400	83	100	100	100	100	100		5.400
Rosario del Tala	15.400	10	25	35	80	100	100		15.400
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	20.800 9.850	29 51	44 88	52 97	85 100	100 100	100 100		20.800
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25 23/24	258.900 226.500	0 0	0 0	0 0	0 4	0 7	0 30		
Avellaneda	139.700	70	79	86	86	88	89	50	124.051
Cañada de Gómez	20.000		9	14	27	57	71		14.200
Casilda	4.600								
Rafaela	78.050	26	44	79	87	98	99		77.316
Venado Tuerto	1.500					30	90		1.350
SANTA FE 24/25 23/24	243.850 210.300	48 79	60 85	76 90	79 94	87 95	89 95	50	216.917
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.820	55	81	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600	100	100	100	100	100	100		2.600
SALTA	759								
SAN LUIS	74.050					1	1		1.089
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440	0	2,6	5	6	7	7		1.571
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.994.254 1.857.963	14 15	15 16	18 17	19 19	20 21	21 29	1.178	424.593


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/02/2025 al 06/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	39	61	5	92	2	-	A/E
	BRAGADO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	50	50	-	82	18	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	3	95	2	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	57	43	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	95	5	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	14	74	13	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	47	53	-	81	19	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	1	99	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	46	54	39	56	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	50	50	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	69	31	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	33	67	-	80	20	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	11	49	40	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	22	78	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	80	20	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	70	30	15	85	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	9	91	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	69	31	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	36	51	11	2	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	39	61	-	-	-	83	17	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	71	29	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	4	94	2	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	12	89	-	85	13	2	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/02/2025 al 06/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ								
		Estadio Fenológico					Estado General			
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	84	16	-	100	-	-
	BOLÍVAR	-	-	5	84	11	2	65	33	-
	BRAGADO	-	-	30	30	40	-	50	50	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	95	5	-	70	30	-
	JUNÍN	-	-	-	70	30	-	49	51	-
	LA PLATA	-	-	11	87	2	20	70	10	-
	LINCOLN	-	-	3	52	45	-	77	23	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	23	50	17	10
	PERGAMINO	-	-	3	29	68	-	56	44	-
	PIGÜÉ	-	-	25	75	-	-	50	50	-
	SALLIQUELÓ	-	-	30	64	6	-	47	43	10
	TANDIL	-	-	32	68	-	-	76	24	-
	TRES ARROYOS	-	-	11	89	-	-	97	3	-
	25 DE MAYO	-	-	30	44	26	23	77	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	5	60	35	32	58	8	2
	MARCOS JUÁREZ	-	-	1	79	20	3	92	5	-
	RÍO CUARTO	-	-	17	53	30	-	59	23	18
	SAN FRANCISCO	-	7	37	54	2	4	75	21	-
	VILLA MARÍA	-	-	56	41	3	-	94	6	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	3	21	76	10	90	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	10	10	80	30	60	10	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	10	30	50	10	-	90	10	-
	SANTA ROSA	-	-	24	46	30	-	73	27	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	20	69	-	11	20	38	22	20
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	11	18	71	55	40	5	-
	CASILDA	-	-	17	-	83	30	60	10	-
	RAFAELA	-	-	6	18	76	21	50	21	8
	VENADO TUERTO	-	-	-	8	95	-	20	50	30
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	95	5	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	8	-	-	92	-	84	16	-
CHACO	CHARATA	-	74	25	1	-	-	1	27	72
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	47	44	9	-	-	38	37	25
JUJUY	JUJUY	-	90	10	-	-	-	100	-	-
MISIONES	POSADAS	-	10	25	50	15	-	90	10	-
SALTA	SALTA	-	63	37	-	-	-	80	20	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	7	30	63	-	-	58	31	11
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	12	88	-	-	-	100	-	-
	QUIMILÍ	-	68	32	-	-	-	31	47	22
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	13	87	-	-	-	100	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/02/2025 al 06/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	52	48	-	-	-	78	22	-	-	51	49	-	-	-	82	18	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	4	38	59	-	-	67	27	6	-	33	47	20	-	-	64	36	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	14	86	-	-	-	100	-	-	-	11	89	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	50	50	-	-	31	47	22	-	-	60	40	-	-	37	42	21	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	18	82	-	-	100	-	-	-	-	19	81	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

