

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

13 de marzo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 13 de marzo de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 13/03/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se han registrado altas precipitaciones en el centro y noroeste del país. Entre ellos el acumulado en Bahía Blanca con 312mm. Luego se destacan los máximos en Córdoba (199mm), Coronel Suárez (173mm), Trenque Lauquen (149mm) en Buenos Aires. Tartagal (153mm) en Salta y Tucumán (134mm) destacan en el NOA. Misiones y algunos sectores de Santa Fe y Entre Ríos registraron lluvias entre 20 a 50mm. En el resto del país no se superó el umbral de 20mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 05/03/2025 al 11/03/2025

Entre jueves y sábado se esperan lluvias de diversa intensidad en NOA, Cuyo, Neuquén, Río Negro y también algunas localidades de Misiones y norte de Corrientes. Entre domingo y lunes de la próxima semana se prevén precipitaciones aisladas en San Luis, centro y sur de Córdoba y el NOA. Entre domingo y martes se esperan lluvias y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas del centro y sur de Patagonia.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días fue normal en la mayor parte del país, exceptuando algunas zonas del NEA, donde fueron levemente por encima de lo normal y en sur de Patagonia, donde fueron ligeramente inferior a lo normal. Se registraron valores superiores a 40°C en Resistencia y Roque Sáenz Peña en Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero. Además, se destacaron temperaturas sobre 35°C en Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Villa María del Río Seco en Córdoba, Rosario en Santa Fe y Paraná y Concordia en Entre Ríos.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 05/03/2025 al 11/03/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normales en todo el centro y norte de Argentina, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a levemente por sobre lo normal en el sur. Durante el jueves y viernes se esperan temperaturas bajas, afectadas por el frente frío que alcanza a estar en el sur y centro de Argentina. A partir del sábado y hasta el próximo martes se espera que las temperaturas vayan paulatinamente aumentando habiendo posibilidad de máximas sobre 35°C en localidades de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En los últimos días las áreas con reservas hídricas excesivas y excesos, aumentó debido a las precipitaciones acumuladas en la última semana incluyendo las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, este de La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El NOA también se aprecia una mejora en las reservas donde ya se estiman suelos con reservas adecuadas a óptimas e incluso sectores con reservas excesivas.

Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes se mantienen con reservas estimadas escasas y sequía en casi toda el área.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la delegación Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, el cultivo se encuentra en etapas que van desde la plena floración hasta la apertura de cápsulas en los lotes más avanzados. Las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones siguen condicionando su desarrollo, que ya registra, al menos, unas 9.000 ha de lotes con pérdidas totales.

En la delegación Avellaneda, al norte de Santa Fe, comenzó la cosecha en el departamento San Javier, con rendimientos muy bajos y una calidad de fibra deficiente. El estado del cultivo varía entre muy malo a bueno, según las zonas, encontrándose en etapas que van desde el pimpollado hasta la apertura de cápsulas. Si bien se ha interrumpido el estrés térmico, persiste el estrés hídrico. Se están aplicando reguladores de crecimiento para facilitar el inicio de la cosecha. Los rendimientos esperados oscilan entre 4 y 12 qq/ha en el este, y entre 18 y 25 qq/ha en el oeste. Además, se observa una alta variabilidad en el estado fenológico de los lotes, con algunos iniciando una segunda floración.

En la zona de influencia de la delegación Santiago del Estero, el cultivo presenta una floración avanzada, con capullos formados y próximos a iniciar la cosecha. En las áreas de secano, como Fortín Inca, Bandera y Malbrán, los cultivos tardíos han mostrado una recuperación significativa gracias al aporte hídrico de las precipitaciones recientes. Por su parte, en Quimilí, el algodón sigue su ciclo de desarrollo, finalizando las etapas reproductivas, aunque se encuentra gravemente afectado por las condiciones climáticas adversas.

En Salta, el cultivo se encuentra entre floración y llenado, mientras que los más adelantados se aproximan a la madurez fisiológica, en condiciones aceptables.

ARROZ

La cosecha en la provincia de Corrientes se desarrolla de manera favorable, con rendimientos elevados, registrándose un aumento del 7% en el rendimiento promedio de arroz largo fino respecto de los valores históricos.

En la delegación Paraná, en el norte de la provincia de Entre Ríos, ha concluido la cosecha del arroz largo ancho, mientras que la del largo fino ha alcanzado aproximadamente un 70%, estimándose su finalización en las próximas semanas.



En la delegación Rosario del Tala, persisten condiciones de intransitabilidad en los caminos debido al exceso hídrico, lo que retrasa significativamente las labores de cosecha. Se ha declarado emergencia regional debido a la proliferación descontrolada de capín arroz (*Echinochloa crus-galli*), una maleza que ha desarrollado resistencia a herbicidas graminícolas. Esta especie presenta un alto potencial competitivo, lo que impacta negativamente en la calidad de las cosechas.

En la delegación Avellaneda, al norte de Santa Fe, la cosecha del arroz largo fino ha avanzado aproximadamente un 55%. El cultivo presenta un estado bueno a muy bueno, con rendimientos superiores a los del año pasado, gracias a la alta insolación recibida y al adecuado aporte hídrico. Actualmente, predomina la fase de llenado de granos y madurez. Los lotes de arroz largo ancho, también presentan un estado bueno a muy bueno. En la zona de la delegación de Rafaela, se registraron precipitaciones durante la semana, lo que ha ralentizado el avance de la cosecha. Sin embargo, el cultivo mantiene una buena condición, sin la presencia de plagas ni enfermedades que puedan comprometer el rendimiento futuro.

GIRASOL



Durante la semana informada se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Si bien en todos los casos los valores pluviométricos fueron importantes y en general han permitido la recomposición hídrica, existieron zonas donde estas han superado los 100mm, ocasionando importantes áreas de anegamiento. La región comprendida en este contexto climático abarca zonas de las delegaciones Bolívar, Pehuajó, Pigüé, Salliqueló, Tres Arroyos y Bahía Blanca, siendo esta última la más afectada, ya que se han registrado importantes daños en el ejido urbano y en las vías de comunicación tanto caminos rurales y rutas, lo que impactará en el traslado del material cosechado a los puertos y acopios. En lo que respecta al terreno cultivable, los anegamientos más relevantes se registran en los terrenos más bajos, que en general tienen un destino ganadero. Los lotes implantados presentan anegamientos que se estiman temporales y que se espera que escurran y percolen durante los próximos días. La elevada humedad ambiental, ha provocado brotado de granos en planta, y dependiendo del tiempo de permanencia de agua en superficie, se podrían generar ambientes propicios para el desarrollo de enfermedades fúngicas y por lo tanto vuelco y caída de plantas lo que entorpecería las labores de cosecha. No obstante, en este contexto, el cultivo presenta, en términos generales, buen estado, y transita etapas entre llenado y madurez.



En aquellas zonas donde se habían iniciado las tareas de cosecha, se han interrumpido por falta de piso. Por otro lado, el descenso térmico y la presencia de nubes, dificulta la caída de humedad de grano en aquellos lotes que ya se encuentran en madurez. A igual fecha para la campaña pasada, la superficie cosechada representaba el 24% del total implantado, mientras que actualmente la misma se ubica en un 2% y se prevé que en este contexto climático la trilla se extienda en el tiempo.



Se han registrado precipitaciones en todo el ámbito provincial. Estas lluvias fueron copiosas con importantes volúmenes caídos provocando anegamientos temporales que retrasan la cosecha en aquellas zonas donde ya se había iniciado. En general, el cultivo tuvo un muy buen desarrollo y performance durante todo el ciclo el ciclo productivo reflejándose en los muy buenos rendimientos obtenidos.



También se registraron precipitaciones en toda la provincia durante la semana informada. Los niveles de humedad edáfica posteriores a las lluvias se encuentran entre adecuados y excesivos. Las tareas de cosecha que ya habían iniciado, se restringen a aquellas áreas con adecuadas condiciones de piso para el paso de maquinaria.

En la zona norte, correspondiente a la delegación General Pico, los lotes trillados fueron puntuales y presentan una gran variabilidad en los rendimientos, presentándose valores entre los 7 y los 27 qq/ha, por lo que se estima que en cuanto las tareas se generalicen, los rindes se estabilizarán. Hacia el sur, en el ámbito de la delegación Santa Rosa, la cosecha ha alcanzado un 2% del total implantado obteniéndose resultados satisfactorios, mientras que los lotes más atrasados aún se encuentran entre R6/7, con presencia de isocas defoliadoras.



Si bien hubo precipitaciones en una importante superficie de la provincia con abundantes milimetrajés caídos, en la zona norte que comprende a la delegación Avellaneda, prácticamente no se registraron lluvias.



No obstante, debido al prolongado período de siembra, todavía resta un remanente de superficie en pie que se estima que se continuará cosechando hasta el mes de abril. En las zonas restantes, la cosecha se encuentra detenida hasta que mejoren las condiciones de piso para el paso de maquinaria. En todos los casos, los rendimientos son considerados muy buenos, con valores que superan los promedios históricos zonales.



Todavía no se ha iniciado la cosecha de la mayor superficie implantada en la zona de la delegación Quimilí, y que se encuentra circunscripta a los departamentos General Belgrano, General Taboada y Rivadavia. Las siembras tardías, determinan que estos lotes permanezcan aún entre finales de la etapa de llenado y madurez, sin alcanzar todavía la madurez comercial.

MAÍZ



Durante la semana se registraron elevadas precipitaciones en toda la provincia con valores superiores a los 100 mm en la región sudoeste y centro-oeste provocando anegamientos en dichas regiones, principalmente en zonas bajas y medias lomas. Se espera una mejora en la condición climática para que el área anegada disminuya. Por el momento, no se informa pérdida de superficie de maíz pero habrá que evaluarlo en los próximos días, una vez que escurra el agua.

En la zona norte se comenzaron a cosechar los primeros lotes de maíz en el ámbito de la delegación Pergamino en tanto que continuaron y se extendieron en todos los partidos de la delegación Junín pero se detuvieron por las excesivas precipitaciones registradas durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Se espera una mejora en la condición de los suelos para continuar con la trilla de los maíces de primera sembrados temprano que ya están maduros. Los primeros rindes obtenidos son regulares debido a que el ciclo de crecimiento del cultivo y la etapa de floración transcurrieron con una importante falta de humedad edáfica y elevadas temperaturas, principalmente en el mes de enero. Los valores oscilan entre valores promedio de 60 a 84 qq/ha.



Las lluvias de fines de febrero y marzo llegaron tarde para los maíces tempranos que ya están ingresando en madurez o en esta etapa, pero mejoraron notablemente el estado de los maíces tardíos y los de segunda que se encuentran entre etapas vegetativas a llenado de grano, según la zona y fecha de implantación, por lo que se esperan buenos rendimientos.



También se registraron abundantes lluvias en todo el ámbito provincial, principalmente en la zona centro-norte con valores superiores a los 100mm.

El maíz sembrado temprano está finalizando su ciclo, acelerado por las altas temperaturas de los meses de enero y febrero. Se esperan rindes regulares ya que fueron afectados por el acortamiento del ciclo. El tardío está entre las etapas de floración y llenado de granos, favorecido por las lluvias de fines de febrero y comienzos de marzo por lo que su estado es bueno a muy bueno.

Continuó la cosecha en el departamento de Marcos Juárez en tanto que se inició en el de Unión hasta la ocurrencia de las lluvias. Los rindes son muy dispares y varían entre los 80 y 140 qq/ha, siendo el promedio de 92 - 97 qq/ha.



El maíz avanza en su etapa crítica, con lotes que presentan pérdidas de hasta el 70%, especialmente en aquellos que han alcanzado las fases reproductivas bajo condiciones extremas de sequía y estrés térmico. Si bien se registraron menores temperaturas hacia fines de la semana, no ocurrieron precipitaciones importantes lo que complica la situación del cereal.

Por otro lado, los lotes sembrados más tardíamente mantienen un estado regular, aunque su desarrollo depende de un cambio en las condiciones hídricas. Sin embargo, en términos generales, el cultivo atraviesa diferentes estados y niveles de afectación, sin presencia de cuadros en condiciones óptimas. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas registradas durante un largo período han comprometido la reproducción y desarrollo del cultivo, impactando directamente en los rendimientos esperados.





Las lluvias ocurridas durante las últimas semanas en casi toda la provincia han mejorado la condición de los lotes tardíos y de segunda, que habían sufrido períodos de escasa disponibilidad hídrica con altas temperaturas. Los lotes de primera ya se encuentran cosechados en su totalidad en la zona norte, en tanto que va por un 85% en la zona sur. Los maíces de segunda y tardíos transitan etapas de finales de floración a inicio de llenado de granos, ya que se sembraron lo más temprano que se pudo para escapar de la chicharita. Continúan los monitoreos para realizar los controles de ser necesario.



En la región norte (delegación General Pico) durante la semana se registraron abundantes precipitaciones, con acumulados que, en algunas localidades, superaron los 100mm. Los lotes de maíz de primera más avanzados ya se encuentran en etapa de madurez. El resto continúa transitando el período de floración y llenado de granos, siendo los más beneficiados con las últimas precipitaciones ocurridas. Todos se encuentran en buen estado general.

En la región centro-sur (delegación Santa Rosa), las lluvias promediaron los 99mm. Entre la última semana de febrero y lo que va de marzo se llevan registrados 172 mm. Los maíces de primera tempranos que pasaron el mes de enero con pocas lluvias y altas temperaturas actualmente se encuentran en plena madurez (R5-R6), siendo los cultivos de primera siembra tardía (que se encuentran entre R3-R4) los que mejor toleraron estas condiciones adversas y en la actualidad se encuentran en muy buen a excelente estado. Los sembrados de segunda que se implantaron con muy poca humedad, se observan con pocas plantas, y soportaron mucho estrés, actualmente se encuentran en R1 mejorando un poco su condición. Se observa incipiente evolución de roya anaranjada que se estima no va a afectar al cultivo.



Se registraron precipitaciones con milimetrajes muy variables de 5 hasta 80mm que no fueron generalizadas por lo cual hay zonas donde los maíces no van a recuperarse viendo afectado su rendimiento. Se están picando varios lotes de maíz para forraje.





En la zona norte, el paso de un frente frío detuvo la ola de calor pero prácticamente no se registraron lluvias por lo cual las condiciones hídricas son adecuadas a malas, en general. Las reservas hídricas de las anteriores precipitaciones se están agotando, según las zonas. Los maíces de segunda época comenzaron la etapa de llenado de granos, y presentan un estado entre regular a muy bueno, observándose una importante recuperación luego de las precipitaciones ocurridas, pero ahora están entrando en déficit nuevamente. Se observan síntomas leves de Spiroplasma, debido a la chicharrita, pero no son graves todavía.

En el resto de la provincia se registraron muy buenos valores de precipitaciones del orden de los 20 a 80 mm por lo que hubo poco o nulo movimiento de cosecha de los maíces tempranos. Los rindes que se están obteniendo son muy buenos, del orden de los 80-90 qq/ha, en promedio.

En tanto que los maíces tardíos se encuentran en floración y llenado de granos, en excelente estado, siendo muy beneficiados por las lluvias.



En la presente semana se registraron lluvias principalmente en la zona noroeste y sur de la provincia acompañadas de un descenso de temperatura. La mayor parte del cultivo está en floración presentando un buen aspecto y sin daños por chicharrita.

En el este provincial las precipitaciones fueron muy pobres o nulas, con máximos de apenas 10mm, por lo que la situación del cultivo es muy mala observándose muy afectado por estrés hídrico, en etapa vegetativa a inicio de floración. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia, al sudeste provincial, la situación es muy diferente, con lotes en buen estado por haber recibido mejores registros pluviométricos.



Las lluvias continúan con alta frecuencia, reponiendo la humedad del perfil de manera continua y favoreciendo a los cultivos que, en la mayoría de los casos, se encuentran atravesando etapas críticas de floración a llenado de granos.



Se realizan monitoreos permanentes para el seguimiento de chicharritas y de esa manera evitar que el *Spiroplasma* avance; hasta el momento solo se observan focos muy puntuales.

MANÍ

En la zona de Lincoln, Buenos Aires, los lotes de maní continúan en las etapas de floración y llenado de vainas. El desarrollo del cultivo sigue siendo favorable, manteniendo condiciones sanitarias óptimas.

En la provincia de Córdoba, los lotes se encuentran en pleno período de llenado de granos. En términos generales, presentan un buen estado sanitario y se esperan buenos rendimientos. Sin embargo, en la zona este del departamento Juárez Celman, se registraron excesos hídricos debido a las lluvias recientes, lo que incrementa el riesgo de problemas fúngicos. En la delegación Villa María, el cultivo se encuentra en la etapa de formación de cajas; aunque aún se observan algunos clavos, estos no presentan relevancia significativa. El estado general del cultivo es excelente, y se prevé que a finales de mes se inicien los primeros arranques de lotes. Se esperan buenos rendimientos y calidad.

En la zona de influencia de la delegación de General Pico, La Pampa, el cultivo se encuentra en la fase de llenado de granos, presentando un estado general óptimo.

En las provincias de Jujuy y Salta, se han registrado precipitaciones que reponen la humedad del perfil del suelo de manera continua, lo que favorece el desarrollo de los lotes los cuales, en su mayoría, atraviesan etapas fenológicas críticas. Hasta la fecha, las condiciones observadas indican un pronóstico favorable para la campaña, con rendimientos que se estiman entre adecuados y elevados.

POROTO

Las precipitaciones continúan registrándose en la provincia de Jujuy, lo que contribuye a la recarga de la humedad del perfil edáfico y favorece el desarrollo vegetativo de los cultivos. El poroto Mung, ya ha iniciado su etapa reproductiva de floración, beneficiado por las condiciones de humedad constante y las temperaturas óptimas de este último mes.

En Salta se logró avanzar significativamente con la siembra debido a las buenas condiciones de humedad superficial, lo que permitió que se completara la implantación de todas las variedades, excepto el poroto Alubia. En este caso, aún se mantienen hectáreas reservadas en el norte de la provincia para esta variedad.



En Santiago del Estero, se observó un cambio en las condiciones climáticas previas, con una disminución en las temperaturas, lo cual resulta crucial para el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, en la zona este, las precipitaciones fueron escasas o nulas. A pesar de esta falta de lluvias, las precipitaciones que se registraron beneficiaron al cultivo sembrado de manera tardía, el cual se encuentra en etapa de crecimiento. En Quimilí, se logró la siembra en la gran mayoría de poroto negro, con una buena germinación. Actualmente, los lotes se encuentran en estado vegetativo, atravesando las consecuencias de las altas temperaturas y faltas de lluvias.

Se estima una reducción en la superficie destinada a este cultivo en Tucumán debido a las precipitaciones escasas y tardías, sumadas a las elevadas temperaturas que impactaron negativamente en el cultivo durante etapas críticas de su desarrollo, generando estrés térmico y deficiencias hídricas.

SOJA



Durante la semana informada se registraron precipitaciones en todo el territorio provincial. Los volúmenes fueron importantes y en la mayoría de los casos los suelos han recuperado su disponibilidad hídrica. Por otro lado, estas lluvias provocaron anegamientos en una gran superficie y cobraron relevancia en las áreas urbanas con caminos y rutas dañados lo que ha dificultado los accesos y la movilidad. En cuanto a las zonas rurales, la presencia de agua en superficie es mayor en las zonas bajas en donde principalmente se desarrolla la actividad ganadera. La zona más afectada por estas precipitaciones fue el centro oeste y sur oeste de la provincia en donde se han informado anegamientos con situaciones de diferente envergadura, los casos más leves con encharcamientos, mientras que los de mayor seriedad presentan mayores volúmenes de agua en superficie. Sin embargo, se estima que de acompañar las condiciones climáticas no permanecería mucho tiempo en superficie. En cuanto al estado del cultivo, luego de estos aportes hídricos, en todos los casos se reporta una recuperación de los mismos, sobre todo de las sojas de segunda, que se han visto afectadas por el déficit hídrico y térmico desde la implantación. Si bien la recuperación no será absoluta, mitigará parcialmente la merma en la producción. Las sojas de primera se encuentran en la fase de llenado, y se estima que la adecuada disponibilidad hídrica impacte en el componente de peso de grano. En el aspecto sanitario, se reporta una disminución en la presencia de arañuela luego de las precipitaciones, y se estima que en los próximos días comenzarían las aplicaciones para el tratamiento de enfermedades de fin de ciclo.





También se registraron precipitaciones en toda la provincia en el período informado. Estas lluvias no resultan muy oportunas para los planteos de soja de primera de siembra temprana que ya se encuentran en la etapa de madurez, aunque todavía existen lotes que se encuentran en llenado, para los que la disponibilidad hídrica contribuirá parcialmente en incrementos del rendimiento. Si bien el cultivo tuvo una performance aceptable durante todo el ciclo, en general se espera que los rendimientos se encuentren dentro de los promedios históricos sin llegar a superarlos.

Las sojas de segunda comienzan a recuperarse luego de las lluvias, sin embargo, el déficit hídrico y térmico ha impactado negativamente en el cultivo y se estiman mermas de relativa importancia en la producción final.

En el aspecto sanitario se ha reportado presencia de chiches de manera moderada, isocas, arañuela, y enfermedades como ojo de rana y mildiu.



Los registros de precipitaciones del último tiempo en la provincia, muestran un marcado déficit hídrico, ya que los valores se encuentran muy por debajo de los promedios históricos, junto a esto, las elevadas temperaturas con marcas por encima de los 30°C durante prolongados períodos incrementan las situaciones de estrés hídrico y térmico en el cultivo.

En la zona sur, que comprende a la delegación Charata el cultivo se encuentra en estado reproductivo entre R1 y R3, en condiciones que van de malas a muy malas, en donde se han registrado pérdidas de entre el 70 y 100% en diversos lotes, y solamente una proporción de planteos con reservas hídricas regulares podrían recuperarse en caso de ocurrencia de precipitaciones en el corto plazo.

Hacia el norte, en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, se repite la situación hídrica, y la diferencia radica en el estado fenológico, ya que el cultivo transita todavía etapas vegetativas, y se encuentra en malas condiciones, agravándose la situación diariamente.





En la zona norte de la provincia que abarca a la delegación Paraná, los lotes de soja mejoraron notablemente su condición a partir de las últimas lluvias, que se registraron en prácticamente toda la jurisdicción, con excepción de la zona norte donde los milimetrajes caídos fueron menores o nulos. En términos generales, el cultivo presenta un estado general entre bueno y muy bueno, con las sojas de primera en etapas entre formación de vaina y llenado, y las de segunda ocupación entre inicio de floración y formación de vainas.

Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Rosario del Tala, las últimas lluvias han permitido una muy buena recuperación del cultivo, presentando muy buenas condiciones. La mayoría de los planteos de soja de primera se encuentran en la etapa de llenado, con una escasa superficie correspondiente a grupos cortos, ya en madurez. En cuanto a las sojas de segunda, el estado general es muy bueno, y se encuentran en la etapa de llenado.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones en toda la provincia, con importantes volúmenes que en algunos casos han superado los 100mm.

En la zona norte, que abarca a la delegación General Pico, los lotes más adelantados de soja de primera, se encuentran transitando la etapa de llenado en buen estado general. En el caso de las sojas de segunda, estas lluvias resultan muy oportunas ya que se encuentran en la etapa crítica de floración.

En la zona de la delegación Santa Rosa, las sojas de primera de siembra temprana se encuentran en muy buen estado general en la etapa R6. Los más atrasados se encuentran entre R4 y R5, para los que los últimos aportes fueron muy oportunos. Las sojas de segunda, son las que presentan las peores condiciones, con una importante disparidad en el estado fenológico. En todos los casos se han reportado intensos ataques de arañuela, isocas defoliadoras y chinches, para los que se han realizado los controles correspondientes.





En la zona de la delegación Avellaneda, en la zona norte de la provincia, prácticamente no se registraron precipitaciones durante la última semana. En esta región el cultivo presenta una amplia variabilidad en el estado general, siendo este cultivo el más afectado por el estrés hídrico y térmico, y son importantes las mermas en el potencial de rendimiento. El oeste de la delegación es la zona menos afectada, siendo el departamento Nueve de Julio el que presenta los mejores planteos.

Entre el centro norte y sur de la provincia, se han registrado abundantes precipitaciones que han permitido la recomposición hídrica de los suelos.

En la zona de la delegación Rafaela, con excepción de planteos en el departamento San Cristóbal en donde las condiciones de sequía fueron más severas y los lotes implantados con cultivares de ciclos cortos, el cultivo de soja de primera presenta muy buen estado general, y se encuentra en etapas entre R4 y R6, en donde se realizan monitoreos a fin de evaluar la presencia de enfermedades de fin de ciclo y su posterior control a partir de la mejora en las condiciones de piso. Para las sojas de segunda se repite la misma situación, y se reporta que aquellos lotes ubicados en la zona norte presentan peores condiciones con lotes con pérdidas tanto de plantas, menor porte y pérdida de vainas.

Desde la zona central y hasta el sur provincial, el cultivo de soja de primera presenta buen estado general, con la mayoría de los lotes en la etapa de llenado, mientras que los de siembra temprana y de ciclos cortos se encuentran ingresando en madurez. Los planteos de soja de segunda fueron los más beneficiados por las últimas precipitaciones ya que se encuentran en etapas que van desde R3 hasta R5. Se ha reportado la realización de controles por presencia de isocas, trips y chinches, y se efectúan aplicaciones preventivas para el control de enfermedades de fin de ciclo.



Durante la semana informada, solamente se registraron precipitaciones relevantes en el oeste provincial que comprende a la delegación Santiago del Estero, mientras que en el área de la delegación Quimilí, al este de la provincia, estas fueron prácticamente nulas.



A partir de estas precipitaciones, el contenido de humedad en los suelos se ha modificado y dependiendo de los volúmenes recibidos se encuentran entre regulares y adecuados. En cuanto al estado del cultivo, los planteos muestran síntomas de recuperación y mejoría en las condiciones generales.

En la zona de Quimilí, el cultivo implantado, continúa deteriorándose periódicamente. Las elevadas temperaturas registradas de manera prolongada junto con la escasez hídrica, han provocado marcados síntomas de estrés. Los lotes presentan escaso crecimiento y poco desarrollo vegetativo. Respecto al estado fenológico, la mayoría se encuentra en floración con los más adelantados en inicios de llenado. En los departamentos al sur de esta delegación, las mejores condiciones climáticas predisponen lotes con mejor estado general.



Se han registrado precipitaciones en prácticamente toda la región. Los volúmenes precipitados fueron variables, pero en todos los casos aportan en la mejora de las condiciones hídricas de los suelos. El cultivo implantado se encuentra atravesando la etapa de llenado, y la adecuada disponibilidad eleva las perspectivas productivas.

SORGO GRANÍFERO



Las lluvias ocurridas en toda la provincia favorecen al cultivo el cual se encuentra en diferentes etapas fenológicas según la fecha de siembra, desde floración a maduración, aunque en este caso las mismas no tienen incidencia ya que están listos para comenzar a cosecharse.



El cultivo está transitando el periodo crítico de definición de rendimientos (floración a llenado de granos) beneficiado por las últimas lluvias. Su estado general es bueno y está finalizando el picado de aquellos lotes destinados a forraje.





El sorgo se encuentra en estado regular a malo debido a la falta de lluvias. Se observan daños irreversibles en hojas y estructuras reproductivas, impidiendo su adecuado desarrollo.



El cultivo está entre las etapas fenológicas de floración y madurez comercial. En la delegación Rosario del Tala se estima un avance de cosecha del 9% en promedio, ya que se da prioridad a la cosecha del maíz.



En el ámbito de la delegación Avellaneda prosiguió la cosecha de los sorgos más adelantados, de primera época, obteniéndose rindes que promedian los 21 qq/ha, poniendo en evidencia la afectación por estrés hídrico-térmico, siendo alto el porcentaje que se destina a forraje. Los de segunda época de siembra están en estados vegetativos la mayor parte, con los más avanzados en floración.

En el resto de la provincia el cultivo presenta muy buenas tasas de crecimiento luego de las precipitaciones. Los lotes se encuentran transitando las etapas de llenado de grano a inicio de madurez los más adelantados.



El cultivo se encuentra en pleno crecimiento vegetativo a floración, beneficiado por las lluvias registradas en la región oeste y sur de la provincia y el descenso de las temperaturas.






El sorgo granífero presenta una alta dispersión en sus etapas fenológicas. Hay un porcentaje importante, de siembra más tardía, que no llega a estados reproductivos pero se encuentra en muy buena situación. Al mismo tiempo, una parte mayoritaria se encuentra en floración, mientras que hay planteos en llenado que alcanzaron la etapa de grano pastoso, todos en una condición aceptable.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/02	13/02	20/02	27/02	06/03	13/03	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	26	33	37	39	45	51		7.475
	LF	95.800	31	41	45	45	50	62		59.109
T. CORRIENTES		110.600	30	40	44	44	49	60		66.584
R. S. Peña	LA	0								0
	LF	3.500					30	50		1.750
T. CHACO		3.500					30	50		1.750
PARANA	LA	2.200			22	54	85	100		2.200
	LF	24.520			9	29	46	69		16.946
T. PARANÁ		26.720			10	31	49	72		19.146
R. DEL TALA	LA	6.000					7	10		590
	LF	39.000				1	8	10		4.079
T. R.DEL TALA		45.000				1	8	10		4.669
T. ENTRE RÍOS		71.720			4	12	23	33		23.815
FORMOSA	LA	0								0
	LF	14.400	20	27	30	35	42	57		8.208
T. FORMOSA		14.400	20	27	30	35	42	57		8.208
AVELLANEDA	LA	1.500								0
	LF	12.100		10	20	25	35	55		6.655
T. AVELLANEDA		13.600		9	18	22	31	49		6.655
RAFAELA	LA	400					10	30		120
	LF	15.500				10	35	50		7.750
T. RAFAELA		15.900				10	34	49		7.870
T. SANTA FE		29.500		4	8	16	33	49		14.525
TOTAL PAÍS	LA	24.900	15	20	24	28	36	42		10.385
	LF	204.820	16	22	25	29	39	51		104.497
TOTAL PAÍS		229.720	16	22	25	29	38	50		114.882
		23/24	0	0	1	3	9	24		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	06/03 %	13/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600				9	9	9	24	7.732
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500						2		250
Lincoln	47.500						3		1.207
Pehuajó	90.522					10	10		9.052
Pergamino	3.200						19		612
Pigüé	90.000							12	
Salliqueló	160.000						1		2.112
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296						2		4.314
25 de Mayo	59.780							634	
BUENOS AIRES	24/25 23/24	1.062.348 1.050.314	0 0	0 0	0 0	1 1	2 8	2 24	670 25.278
Laboulaye	60.337						10		6.034
Marcos Juárez	33.100		8	11	20	21	41		13.631
Río Cuarto	12.500						10		1.250
San Francisco	40.600		9	19	19	21	21		8.481
Villa María	8.800								
CÓRDOBA	24/25 23/24	155.337 130.430	0 0	4 4	7 7	9 14	10 23	19 47	29.396
Paraná	5.400	100	100	100	100	100	100		5.400
Rosario del Tala	15.400	25	35	80	100	100	100		15.400
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	20.800 9.850	44 88	52 97	85 100	100 100	100 100		20.800
General Pico	138.900						2		
Santa Rosa	120.000								2364
LA PAMPA	24/25 23/24	258.900 226.500	0 0	0 0	0 4	0 7	0 30	1 50	2364
Avellaneda	139.700	79	86	86	88	89	94	50	131.844
Cañada de Gómez	20.000	9	14	27	57	71	81		16.200
Casilda	4.600								
Rafaela	78.050	44	79	87	98	99	99		77.316
Venado Tuerto	1.500				30	90	90		1.350
SANTA FE	24/25 23/24	243.850 210.300	60 85	76 90	79 94	87 95	89 95	93 98	50 226.710
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.820	81	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100	360	61.640
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600	100	100	100	100	100	100		2.600
SALTA	759								
SAN LUIS	74.050				1	1	19		13.773
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440	2,6	5	6	7	7	8		1.795
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.994.254 1.857.963	15 16	18 17	19 19	20 21	21 29	24 43	1.610 471.796

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/02 %	13/02 %	20/02 %	27/02 %	06/03 %	13/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500								0
Bolívar	246.000								0
Bragado	206.400								0
General Madariaga	156.300								0
Junín	183.950				2	2	7	18.200	11.600
La Plata	60.000								0
Lincoln	300.000								0
Pehuajó	336.650								0
Pergamino	197.700						9	17.500	16.220
Pigüé	148.000								0
Salliqueló	250.000								0
Tandil	330.000								0
Tres Arroyos	429.660								0
25 de Mayo	164.493								0
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.029.653 3.090.580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	35.700	27.820
Laboulaye	427.616				1	2	7	38.500	0
Marcos Juárez	425.700								27.100
Río Cuarto	664.520								0
San Francisco	572.000								0
Villa María	442.000								0
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.531.836 3.188.920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	38.500	27.100
Paraná	127.700	43	61	68	73	73	73	6.500	88.480
Rosario del Tala	305.000	20	35	50	52	56	62	10.860	182.370
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	432.700 568.200	27 0	43 0	55 0	58 10	61 22	65 29	17.360	270.850
General Pico	476.600								
Santa Rosa	250.000								
LA PAMPA 24/25 23/24	726.600 779.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Avellaneda	50.000	7	8	8	8	8	8	1.500	3.880
Cañada de Gómez	183.000	1	1	3	3	10	15	30	27.450
Casilda	139.400				5	5	20		27.880
Rafaela	293.300		11	19	45	45	50	112.200	90.550
Venado Tuerto	210.000				5	15	15	12.000	29.700
SANTA FE 24/25 23/24	875.700 1.239.380	1 0,4	3 1	6 1	14 1	19 3	24 7	125.730	179.460
CATAMARCA	8.450								
CORRIENTES	9.590	76	79	91	91	91	93	700	8.270
CHACO (Charata)	84.000								
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500								
FORMOSA	37.000								
JUJUY	12.049								
MISSIONES	31.510								
SALTA	359.206								
SAN LUIS	351.500								
STGO. ESTERO	124.100								
STGO. ESTERO (Quimilí)	397.240								
TUCUMÁN	61.930								
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.235.564 11.103.250	1 0,1	2 0,2	3 0,2	4 0,6	5 1,4	6 3	217.990	513.500

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/03/2025 al 13/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	40	60	-	100	-	-	E/A
	BOLÍVAR	-	-	-	15	85	7	87	6	-	E
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	40	60	-	82	18	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	20	80	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	57	43	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	45	5	A
	SALLIQUELÓ	-	-	5	78	17	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	25	75	-	81	19	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	32	68	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	23	77	39	56	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	35	65	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	29	71	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	33	67	-	80	20	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	2	50	48	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	60	40	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	50	50	15	85	-	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	4	96	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	69	31	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	36	51	11	2	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	23	74	3	-	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	55	45	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	84	16	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	12	89	-	75	18	7	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/03/2025 al 13/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	65	35	-	100	-	-	E/A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	72	28	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	10	30	60	-	50	50	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	90	10	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	50	50	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	3	57	40	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	54	46	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	23	50	17	10	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	32	68	-	56	44	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	16	76	8	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	10	73	17	-	76	24	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	6	88	6	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	10	49	41	23	77	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	2	58	40	32	58	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	1	70	29	3	92	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	4	66	30	-	59	23	18	A
	SAN FRANCISCO	-	1	38	57	4	4	75	21	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	43	46	11	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	2	22	76	10	90	-	-	E/A/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	-	5	10	85	30	60	10	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	10	20	55	15	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	10	55	35	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	1	42	46	11	20	39	23	18	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	5	24	71	55	40	5	-	A
	CASILDA	-	-	17	-	83	38	56	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	5	19	76	21	50	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	3	97	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	78	22	-	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	6	-	-	94	-	84	16	-	A/R
CHACO	CHARATA	-	62	35	3	-	-	1	25	74	PS/S
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	36	51	13	-	-	31	38	31	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	95	5	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	25	50	15	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	-	44	56	-	-	-	80	20	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	7	30	63	-	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	86	14	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	60	40	-	-	-	46	32	22	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	1	73	26	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/03/2025 al 13/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	15	65	20	-	-	88	12	-	-	13	66	22	-	-	90	10	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	2	37	60	-	-	68	26	6	-	33	47	20	-	-	64	36	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	80	20	-	-	100	-	-	-	-	80	20	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	50	50	-	-	46	32	22	-	-	60	40	-	-	50	30	21	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	15	85	-	-	100	-	-	-	-	18	82	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

