

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

27 de marzo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 27 de marzo de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 27/03/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados de los últimos 7 días se concentraron en el norte del país: 130mm en Sáenz Peña, 121mm en Formosa, 100mm en Rivadavia (Salta), 80mm en Resistencia y 70mm en Metán. Estas intensas precipitaciones se han sumado al ya elevado nivel del Bermejo, generando desbordes. Fuera de esta área, también se registraron más de 50mm en Chamental, Villa Reynolds, Corrientes capital, CABA, Córdoba capital y Santiago del Estero capital.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 18/03/2025 al 25/03/2025

Entre jueves y sábado, con el avance de un sistema de baja presión, se esperan sucesivas lluvias con diversa intensidad en La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, NEA y algunos sectores del NOA. Entre domingo y lunes, con el avance de un sistema frontal, se prevén precipitaciones en Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, NEA y el NOA.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura máxima más alta corresponde a Formosa (37.5°C). En promedio, la temperatura semanal resultó algo superior a la normal en el sur de Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, además del noreste de Santa Cruz. En cuanto a las mínimas, se registraron heladas en algunas localidades patagónicas, con un reporte mínimo de -3.1°C en El Calafate.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 18/03/2025 al 25/03/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en el NEA, NOA y centro-este del país, mientras que para centro-oeste y sur se prevén temperaturas medias normales a inferiores a lo normal. Entre jueves y domingo las temperaturas tenderán a aumentar en el norte y centro-este del país. A partir del lunes y hasta el próximo martes se prevé que las temperaturas tengan una leve disminución en la misma zona, debido al avance de un sistema frontal que atravesará el país. Para las zonas centro-oeste y sur se espera que las temperaturas se mantengan bajas durante toda la semana, con un leve descenso entre domingo y lunes debido al sistema frontal. Podrían darse heladas agronómicas en el oeste de Patagonia.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Los cambios más notables con respecto a la situación de la semana pasada se concentran en el NEA y el NOA. En el este de Salta y áreas limítrofes de Formosa y Chaco se estimaron excesos generados por las precipitaciones, agravados en ciertas áreas por desbordes. En el NEA se observan importantes recargas, con una disminución significativa del área clasificada con déficit hídrico.

Las reservas hídricas en la zona núcleo pampeana se mantendrían óptimas a algo excesivas en algunas unidades de suelo con mayor dificultad de drenaje. Nuevamente se observan reservas cercanas a capacidad de campo en la zona de influencia de Bahía Blanca, debido a los 43mm acumulados en los últimos 7 días.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, en la zona de influencia de la delegación Charata, la cosecha avanza con rendimientos que promedian los 18 qq/ha, aunque presentan variabilidad en su estado. Si bien se registraron buenos volúmenes de precipitaciones los lotes más afectados por la sequía no experimentarán mejoras significativas, pero aquellos con un desarrollo adecuado, podrían aumentar el peso de fibra en los capullos aún en formación. Los cuadros tardíos siguen siendo los más comprometidos y su evolución dependerá de las condiciones climáticas en las próximas semanas. En la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha alcanza el 25% de la superficie, con rendimientos promedio de 13 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en plena floración a apertura de cápsulas, mientras que las pérdidas superan las 15.000 ha.

En la provincia de Santa Fe, en el área de influencia de la delegación Avellaneda, la cosecha avanza en todos los departamentos, con cultivos en estados fenológicos, que van desde llenado hasta apertura de cápsulas. Se están aplicando reguladores de crecimiento y/o desecantes para facilitar la cosecha. El estado de los cultivos varía considerablemente, siendo muy malo en algunas zonas y muy bueno en otras. Se esperan rendimientos de entre 4 y 12 qq/ha en el este, y de 18 a 25 qq/ha en el oeste.

En Santiago del Estero, los lotes continúan en floración avanzada con capullos formados. En la delegación Quimilí, el cultivo avanza hacia el final de las etapas reproductivas, aunque se vio seriamente afectado por las condiciones climáticas. Las lluvias de esta semana interrumpieron una larga sequía, que, sumada a las altas temperaturas, impactaron a la mayoría de los lotes. Dado que el cultivo muestra potencial para rebrotar, permitiría la recuperación de los más dañados.

ARROZ

En Corrientes, la cosecha avanza alcanzando casi el 76% de progreso. En Entre Ríos, en el área correspondiente a la delegación Rosario del Tala, la cosecha progresa al 50%, adelantada para la fecha, con rendimientos promedio de 80 qq/ha para arroz largo fino y 60 qq/ha para largo ancho.



En Santa Fe, en la zona de la delegación Avellaneda, se ha cosechado el 78% del arroz largo fino, con muy buenos rendimientos. Comenzó la cosecha del arroz largo ancho, con rendimientos aproximados de 60 qq/ha. En la región de la delegación Rafaela, la cosecha alcanzó el 80% de avance, con rendimientos promedio de 60 a 64 qq/ha para largo ancho y de 72 a 76 qq/ha para largo fino.

GIRASOL



La situación sigue complicándose debido a la falta de piso ocasionada por los desbordes de arroyos y canales en las delegaciones de Bolívar, Veinticinco de Mayo y Pehuajó. A pesar de estas condiciones, algunas áreas afectadas continúan con la cosecha, aunque no logran alcanzar la humedad óptima del grano, y se realiza el embolsado en el campo hasta que los caminos sean transitables. En la zona norte, la cosecha avanza sin mayores inconvenientes y se esperan buenos rendimientos. En la delegación Lincoln, el progreso es adecuado, aunque persisten problemas de falta de piso. En la zona sur, la cosecha se desarrolla con normalidad, a medida que la humedad del grano lo permite.



La cosecha avanza mientras las lluvias lo permiten. A nivel provincial, el avance es del 68%, y los rindes promedian los 22 a 30 qq/ha según la zona.



La cosecha progresa al 65%, con rendimientos satisfactorios a muy buenos en ciertos lotes.





La cosecha del cultivo avanza conforme alcanza la humedad comercial, con rendimientos dentro del promedio provincial.



En la delegación Avellaneda, al norte de la provincia, la cosecha continúa a buen ritmo, quedando sólo pendiente el departamento Nueve de Julio. Los rendimientos oscilan entre 12 y 20 qq/ha, con resultados satisfactorios a pesar de la siembra tardía. Se estima que la cosecha finalizará en abril. En Cañada de Gómez, la cosecha concluyó con excelentes rendimientos, alcanzando los 28-30 qq/ha, promedio según la zona.



En los departamentos del centro y norte de la delegación Quimilí, donde el girasol fue sembrado primero y en condiciones más limitantes, la cosecha ya ha finalizado con rendimientos bajos, entre 7 y 10 qq/ha, tal como se esperaba. En los departamentos del sur (Rivadavia, Belgrano y parte de Gral. Taboada), con siembras más tardías y mejores condiciones, los cultivos alcanzaron rindes del orden de los 18-20 qq/ha.

MAÍZ



Durante la semana ocurrieron precipitaciones que oscilaron entre los 5 y 50mm, según la zona, ralentizando las tareas de trilla del maíz temprano en aquellas con mayores registros.



En la zona norte, además de proseguir la cosecha en el ámbito de las delegaciones Pergamino, Junín, Lincoln y La Plata, se ha iniciado en la delegación Bragado, obteniéndose rindes aceptables, que promedian los 68 qq/ha, a pesar de haber sido afectado por una importante falta de humedad edáfica y elevadas temperaturas durante sus etapas de crecimiento y floración. También se han logrado levantar algunos lotes localizados en la delegación Veinticinco de Mayo con rindes bastante buenos (promedio de 74 qq/ha) aunque con algo de humedad por encima de los valores límites de entrega. Los maíces tardíos y de segunda siguen su evolución hacia la madurez, observándose una mejora en su estado general gracias a las excelentes condiciones climáticas de humedad y temperatura.

Hacia la zona sur, los lotes tempranos se encuentran en inicios de madurez, mientras que los lotes tardíos se encuentran entre finales de floración y llenado, favorecidos por los aportes hídricos de las últimas lluvias.



Avanzó la cosecha del maíz temprano pero se vio interrumpida por las lluvias del fin de semana. A nivel provincial se lleva trillada el 9% de la superficie total vs el 3% del año pasado para la misma fecha. Los rindes son muy dispares oscilando entre promedios de 65 a 95 qq/ha, según la zona, siendo el valor provincial medio de unos 84 qq/ha. Continúa el picado de los lotes con destino a forraje.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran finalizando el período de llenado de granos, con muy buen estado general, muy favorecidos por las lluvias de fines de febrero y marzo.



En toda la provincia se registraron lluvias de muy buenos milimetrajes, con un máximo de 130mm, que mejoraron las condiciones de humedad del suelo. No obstante, la situación sigue siendo delicada, especialmente en los lotes más adelantados, donde las pérdidas ya se produjeron y superan el 70%, en promedio. En cambio, los cuadros más tardíos, que aún se encuentran en fases reproductivas, podrían beneficiarse de esta mejora en la humedad, al mejorar el llenado de los granos y disminuir el impacto de las condiciones previas.





El avance de cosecha a nivel provincial, se estima en un 79%, quedando muy pocos lotes aún en pie del maíz temprano en el ámbito de la delegación Rosario del Tala.

Los maíces de siembra tardía presentan muy buenas condiciones y han atravesado las etapas críticas con buena disponibilidad hídrica proporcionada por las últimas precipitaciones. Se reporta presencia de oruga de la espiga y mermas por el ataque de cotorras.



Durante la semana se registraron precipitaciones, con acumulados variados, entre 30 y 80mm. Los maíces de primera más avanzados ya se encuentran en período de madurez, en tanto que el resto continua transitando el periodo de floración y llenado de granos, en buen estado general con adecuada oferta hídrica para transitar estas etapas críticas. Se realizan aplicaciones para el control de malezas, y se reporta una incipiente presencia de roya anaranjada, que a la fecha se encuentra por debajo de los umbrales de daño. Continúa el picado de maíces forrajeros para reserva.



La cosecha del maíz temprano avanzó lentamente hasta la jornada del lunes donde comenzaron las lluvias. Los rindes siguen siendo buenos con promedios en el sector norte de 70 a 75 qq/ha y en el centro centro-sur de 85 a 95 qq/ha, con máximos puntuales entre 110 y 120 qq/ha. Los maíces tardíos se encuentran en llenado de granos, muy beneficiados por las precipitaciones. Se observa un aumento de población de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) muy marcado, principalmente en el norte de la delegación Rafaela, aunque estarían ya fuera del período fenológico crítico de susceptibilidad al complejo de enfermedades que ésta transmite.





En la presenta semana ocurrieron las esperadas lluvias en toda la provincia, con registros que variaron entre los 20 y 130 mm, lo que interrumpe la larga sequía que, junto a las altísimas temperaturas, afectaron gravemente a la mayoría de los cultivos, llegando tarde para muchos lotes. También bajaron mucho las temperaturas con máximas entre 26 a 31°C. La mayor parte del maíz está en la última etapa vegetativa o inicio de la floración por lo que estas precipitaciones pueden mejorar la situación de muchos lotes que estaban al límite de la pérdida total. Se observa muy poca presencia de chicharrita y las plantas presentan un buen estado sanitario.



El cultivo volvió a recibir aportes pluviales en momentos definitorios de rendimiento para un amplio espectro de casos. Los maíces de siembra temprana se encuentran en llenado, mientras que los más tardíos en floración. La adecuada disponibilidad hídrica proporciona buenas perspectivas para el cultivo.

MANÍ

En la delegación Lincoln, noroeste de Buenos Aires, los lotes se encuentran en estado de llenado a inicio de arrancado, con un estado general adecuado.

En Córdoba, el cultivo se encuentra en llenado de granos, con lotes próximos al arrancado, buen estado general y una buena carga de cajas por planta. Tras un periodo de sequía seguido de excesos hídricos en Río Cuarto, el estado de los cultivos se complica, lo que favorece la aparición de hongos. En Marcos Juárez, se mantienen buenas expectativas de rendimiento, con un aumento de la superficie para esta campaña. Las precipitaciones generalizadas en Villa María han favorecido el desarrollo del cultivo, lo que permite estimar buenos rendimientos y calidad.

Los implantados en la provincia de La Pampa avanzan en la etapa de llenado de granos, presentando un buen estado general.



En Jujuy, algunos lotes ya iniciaron la madurez, mientras que la mayoría se encuentra en llenado de granos, beneficiados por las recientes lluvias, lo que mejora las expectativas de rendimiento. En Salta, una parte importante de los cultivos está en llenado de cajas, y algunos pocos siguen en floración, pudiendo aprovechar las lluvias recientes para mejorar el rendimiento. En general, la condición de los cultivos sigue siendo buena.

POROTO

En Salta y Jujuy, las precipitaciones recientes favorecieron las etapas de crecimiento del cultivo. En Salta, la humedad disponible en los primeros centímetros del suelo facilita el avance de la siembra de Alubia. El resto de las variedades se encuentra en buenas condiciones, en etapas de crecimiento vegetativo.

El poroto sembrado tarde en Santiago del Estero se encuentra en crecimiento activo, con algunos lotes resemebrados beneficiados por las recientes precipitaciones. En Quimilí, donde predomina el cultivo de poroto negro, la mayoría de los lotes sigue siendo afectada por las altas temperaturas y la falta de lluvias.

SOJA



En la región norte provincial, las sojas de primera han comenzado a entregarse, observándose el amarilleo de las hojas superiores. Si las condiciones climáticas lo permiten, la semana que viene comenzaría la cosecha de los primeros lotes, los que, en general, presentan buen aspecto. Las sojas de segunda presentan mayor diversidad, con lotes muy buenos que van a rendir arriba de 30 qq/ha y otros que no van a llegar a los 10 qq/ha pero son los menos, lo que refleja una gran respuesta a las lluvias tardías. Fenológicamente se encuentran entre floración y llenado de granos.

En la zona centro y sur, la soja de primera finalizó el período crítico de floración y se encuentra en pleno o finales de llenado de granos, presentando un buen estado gracias a la mejoría hídrica de fines de febrero y marzo. Las sojas de segunda siguen su muy buena evolución, observándose lotes muy vigorosos, con brotes y vainas nuevas. Se registran aplicaciones preventivas de insecticidas para bajar la incidencia de chinches y de fungicidas, con la intención de cuidar el estado del área foliar para lograr aprovechar al máximo estas excelentes condiciones.





Se han registrado precipitaciones con mayor preponderancia en la zona del noroeste y sudoeste provincial, muy beneficiosas para el cultivo, sobre todo para las sojas de segunda las cuales se encuentran entre fines de floración y llenado de granos. Los lotes de soja de primera se encuentran entre llenado y madurez. Los primeros cuadros levantados en el ámbito de la delegación San Francisco, en el norte provincial, están dando rendimientos del orden de los 30 a 40 qq/ha, con un avance de cosecha del 5%, demorada por falta de piso y precipitaciones intermitentes.



Las lluvias registradas durante la última semana en todo el ámbito provincial, con volúmenes que oscilan entre 30 y 130 mm, según la zona, llegan de manera tardía para muchos lotes de soja que ya han sufrido daños irreversibles. Sin embargo, en aquellos cuadros donde no hubo muerte temprana de plantas, la humedad podría contribuir a una leve recuperación y compensar, parcialmente, la caída del rendimiento. En estos casos, se espera que la planta complete su desarrollo con un impacto negativo menor contribuyendo a la mejora en la producción por campo.



Las lluvias registradas en las últimas semanas mejoraron de manera importante el estado de las sojas tanto de primera como de segunda estimándose valores de rindes muy buenos del orden de los 28 qq/ha, promedio.



Se registraron precipitaciones del orden de los 30 a 80mm que favorecen el desarrollo del cultivo, el cual se encuentra en el período de llenado de granos en el caso de los lotes de primera, y de floración a llenado de granos los de segunda.



Aunque el estado del cultivo es desparejo por haberse visto afectado durante el inicio del ciclo, en términos generales las condiciones del mismo van de regulares a buenas. Se han realizado controles para arañuela roja, chinches e isocas defoliadoras.



En el norte provincial, que comprende a la delegación Avellaneda, se registraron abundantes lluvias que favorecerán la etapa de llenado de granos en la que se encuentra el cultivo. De todas maneras, la situación de marcado déficit hídrico que lo afectó determina que el mismo se encuentre en estado muy malo a regular y presenta pérdidas muy elevadas.

En la zona centro-sur, la situación del cultivo mejora. Las buenas condiciones ambientales favorecen el llenado de granos de las sojas de primera que aún se encuentran en esta etapa ya que las más adelantadas iniciaron las etapas fenológicas de R5 a R8 (madurez), previéndose que se inicie la cosecha la próxima semana si las condiciones climáticas permiten la pérdida de humedad del grano. Las sojas de segunda presentan buenas tasas de crecimiento para transitar las etapas R3 a R5. La condición del cultivo, en general, es buena.



En esta semana se registraron precipitaciones y temperaturas moderadas que benefician al cultivo, el cual presentaba síntomas de estrés hídrico principalmente en la mitad este de la provincia, más afectada por la falta de lluvias. La mayoría de los lotes están en floración con algunos iniciando el llenado de granos. En general, las plantas localizadas en los departamentos del este presentan un limitado crecimiento vegetativo, a excepción de los de Belgrano, General Taboada y Rivadavia en donde la situación es muy diferente, observándose lotes en buen estado.



Nuevamente se registraron lluvias, que permiten mejorar las condiciones de los lotes destinados a esta oleaginosa. Si bien algunos ya se encuentran iniciando la etapa de madurez, la mayoría está en llenado de granos, pudiendo recuperarse.



SORGO GRANÍFERO



El cultivo se encuentra, en su mayoría, en etapa de llenado de granos favorecido por muy buenas condiciones hídricas. En la delegación Pergamino, prosigue el avance de cosecha de los primeros lotes, obteniéndose rindes que promedian los 58 qq/ha.



En general, el cultivo se encuentra en etapa de llenado de granos con buen estado general favorecidos por las precipitaciones ocurridas durante este último período. Los lotes con destino forraje fueron picados con buenos rendimientos.



Continúa desarrollándose la cosecha sin inconvenientes, ya que las lluvias registradas en esta semana fueron de escasos milímetros en la mayor parte de la provincia. Con un avance del 87%, los rindes obtenidos promedian los 35 qq/ha.



Las lluvias registradas disminuyen el deterioro sufrido por el cultivo por la situación de sequía que lo venía afectando, esperándose una mejora en la condición del mismo. Las etapas fenológicas son 20% crecimiento, 40% floración y 40% llenado de granos, por lo que aún hay posibilidades de recuperación, al no estar tan avanzado el ciclo del cultivo.





Se estima un avance de cosecha del 27% a nivel provincial, con rindes muy variables que promedian los 32 a 50 qq/ha según la zona.



Continúa el picado de maíces y sorgos forrajeros para reserva invernal en la zona de la delegación Santa Rosa.



En delegación Avellaneda el estado del cultivo es muy variable. Los más adelantados ya están en etapa de madurez, con algunos lotes ya cosechados pero la mayoría se destinará a forraje por haber sido muy afectados por estrés hídrico térmico.

Comenzó la cosecha en el centro sur de la delegación Rafaela, con rindes que van desde 45 a 57 qq/ha, y valores puntuales que alcanzan los 62qq/ha. El cultivo se encuentran transitando grano lechoso a grano duro y madurez los más adelantados. La condición de los cuadros es muy buena en lotes agrícolas, buena a regular en el resto y mala en lotes de menor aptitud agrícola con plantas de menor desarrollo y altura principalmente en el departamento San Cristóbal.

Hacia el sur el cultivo transita etapas entre llenado y madurez y se inició la cosecha en el ámbito de la delegación Cañada de Gómez, obteniéndose rindes que promedian los 40 qq/ha.



Las lluvias registradas durante la semana resultan beneficiosas para impedir un mayor deterioro del cultivo el cual se encuentra un 18% en etapa de crecimiento vegetativo, 28% floración, 51% llenado de granos y 3% madurez.






Nuevas precipitaciones continúan apuntalando el cultivo. Una parte importante todavía puede aprovechar estos aportes, mientras que hay un pequeño porcentaje, más adelantado, que ya alcanza el estado de grano pastoso. Por lo general el estado del cultivo es bueno a muy bueno.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	20/02 %	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	37	39	45	51	57	69		10.270
	LF	95.800	45	45	50	62	69	77		73.709
T. CORRIENTES		110.600	44	44	49	60	67	76		83.978
R. S. Peña	LA	0								0
	LF	3.500			30	50	70	85		2.975
T. CHACO		3.500			30	50	70	85		2.975
PARANA	LA	2.200	22	54	85	100	100	100		2.200
	LF	25.720	9	29	46	69	81	89		21.806
T. PARANÁ		27.920	10	31	49	72	83	90		24.006
R. DEL TALA	LA	6.000			7	10	40	50		3.000
	LF	39.000		1	8	10	40	50		19.500
T. R.DEL TALA		45.000		1	8	10	40	50		22.500
T. ENTRE RÍOS		72.920	4	12	23	33	56	65		46.506
FORMOSA	LA	0								0
	LF	14.400	30	35	42	57	60	66		9.504
T. FORMOSA		14.400	30	35	42	57	60	66		9.504
AVELLANEDA	LA	1.500						5		75
	LF	12.100	20	25	35	55	70	78		9.438
T. AVELLANEDA		13.600	18	22	31	49	62	70		9.513
RAFAELA	LA	400			10	30	50	80		320
	LF	15.500		10	35	50	70	85		13.175
T. RAFAELA		15.900		10	34	49	69	85		13.495
T. SANTA FE		29.500	8	16	33	49	66	78		23.008
TOTAL PAÍS	LA	24.900	24	28	36	42	53	64		15.865
	LF	206.020	25	29	39	51	64	73		150.106
TOTAL PAÍS		230.920	25	29	38	50	63	72		165.971
		202.450	1	3	9	24	42	54		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/02 %	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600						8		460
Bolívar	84.800		9	9	9	15	23	1.505	19.508
Bragado	8.270						50		4.135
General Madariaga	62.750					1	19		11.778
Junín	4.130					5	20		826
La Plata	12.500				2	50	80		10.001
Lincoln	47.000				3	34	82		38.686
Pehuajó	90.522			10	10	61	88		80.012
Pergamino	3.200				19	29	100		3.200
Pigüé	90.000					3	20	12	17.998
Salliqueló	160.000				1	7	29		46.096
Tandil	175.000					13	32		55.528
Tres Arroyos	258.296				2	8	25		64.677
25 de Mayo	61.000					26	67	1.747	39.516
BUENOS AIRES <i>24/25</i> <i>23/24</i>	1.063.068 1.050.314	0 0	1 1	2 8	2 24	16 46	37 69	3.264	392.421
Laboulaye	70.337				10	30	70		49.236
Marcos Juárez	33.100	11	20	21	41	61	86		28.380
Río Cuarto	12.500				10	20	67		8.350
San Francisco	50.600	19	19	21	21	39	47		23.954
Villa María	18.800					50	86		16.130
CÓRDOBA <i>24/25</i> <i>23/24</i>	185.337 130.430	7 7	9 14	10 23	19 47	39 52	68 82		126.050
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.400	80	100	100	100	100	100		15.400
ENTRE RÍOS <i>24/25</i> <i>23/24</i>	27.720 9.850	85 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		27.720
General Pico	138.900					30	60		83.340
Santa Rosa	120.000				2	32	70		84.000
LA PAMPA <i>24/25</i> <i>23/24</i>	258.900 226.500	0 4	0 7	0 30	1 50	31 65	65 85		167.340
Avellaneda	139.700	86	88	89	94	97	98	50	137.304
Cañada de Gómez	20.000	27	57	71	81	91	100		20.000
Casilda	8.000					17	54	10	3.757
Rafaela	78.050	87	98	99	99	100	100		78.050
Venado Tuerto	1.500		30	90	90	100	100		1.500
SANTA FE <i>24/25</i> <i>23/24</i>	247.250 210.300	79 94	87 95	89 95	93 98	95 98	98 100	60	240.611
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100	360	61.640
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600	100	100	100	100	100	100		2.600
SALTA	980								
SAN LUIS	89.000		1	1	19	51	67		59.256
STGO. ESTERO	2.850								0
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440	6	7	7	8	100	100		22.440
TUCUMÁN	250								0
TOTAL PAÍS <i>24/25</i> <i>23/24</i>	2.049.465 1.857.963	19 19	20 21	21 29	24 43	39 58	58 78	4.214	1.187.518

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/02 %	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500							7.498	
Bolívar	246.000							24.685	
Bragado	206.400						15	10.780	29.340
General Madariaga	156.300							28.200	
Junín	183.950		2	2	7	11	17	18.200	28.180
La Plata	60.000					2	8	18.000	3.360
Lincoln	300.000					4	10	41.000	25.900
Pehuajó	336.651							74.063	
Pergamino	197.700				9	10	37	17.500	66.670
Pigüé	148.000							12	
Salliqueló	250.000							122.000	
Tandil	330.000								
Tres Arroyos	429.661					2	3	128.898	9.020
25 de Mayo	164.493						5	43.448	6.050
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.029.655 3.090.580	0 0	0 0	0 0	1 2	2 2	7 6	534.284	168.520
Laboulaye	427.616						10	14.967	41.260
Marcos Juárez	425.700		1	2	7	11	24	36.500	93.410
Río Cuarto	664.520					3	5		33.230
San Francisco	572.000					2	3	94.200	14.330
Villa María	427.000					2	9	110.000	28.530
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.516.836 3.188.920	0 0	0 0	0 0	1 2	3 2	9 3	255.667	210.760
Paraná	127.700	68	73	73	73	74	74	6.500	89.690
Rosario del Tala	305.000	50	52	56	62	72	81	10.860	238.250
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	432.700 568.200	55 0	58 10	61 22	65 29	72 32	79 37	17.360	327.940
General Pico	476.600								
Santa Rosa	250.000							98.000	
LA PAMPA 24/25 23/24	726.600 779.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	98.000	
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez	183.000	3	3	10	15	21	46	500	83.950
Casilda	139.400		5	5	20	40	60		83.640
Rafaela	293.300	19	45	45	50	62	71	112.200	128.580
Venado Tuerto	210.000		5	15	15	35	35	12.000	69.300
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	6 1	14 1	19 3	24 7	37 13	49 26	126.200	369.470
CATAMARCA	8.450							970	0
CORRIENTES	9.590	91	91	91	93	93	93	700	8.280
CHACO (Charata)	84.000							34.450	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950							42.150	0
FORMOSA	37.000								0
JUJUY	12.049							1.973	0
MISIONES	31.510						10		3.150
SALTA	359.281								0
SAN LUIS	385.300							37.930	0
STGO. ESTERO	124.100								0
STGO. ESTERO (Quimilí)	397.240								0
TUCUMÁN	62.930							7.190	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.237.291 11.103.250	3 0,2	4 0,6	5 1,4	6 3	9 4	13 7	1.156.874	1.088.120

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/03/2025 al 27/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	18	82	-	100	-	-	E/A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	7	87	6	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	82	18	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	2	98	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	57	43	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	49	1	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	45	55	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	8	92	-	81	19	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	40	51	9	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	3	97	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	80	20	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	33	67	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	10	90	15	85	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	7	93	-	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/03/2025 al 27/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	30	70	-	100	-	-	E/A
	BOLÍVAR	-	-	-	27	73	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	50	50	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	40	60	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	20	80	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	45	55	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	35	65	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	23	50	17	10	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	30	70	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	3	82	15	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	75	25	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	75	25	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	49	51	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	55	45	32	58	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	10	90	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	60	40	-	59	23	18	A
	SAN FRANCISCO	-	-	19	73	8	4	75	21	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	17	54	29	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	20	80	10	90	-	-	E/A/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	10	90	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	15	65	20	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	57	43	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	1	30	58	11	2	33	30	35	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	25	75	55	40	5	-	A
	CASILDA	-	-	-	17	83	38	56	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	24	76	21	50	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	50	30	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	6	-	94	-	78	22	-	A/R/PS/S
CHACO	CHARATA	-	19	64	17	-	-	1	25	74	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	22	51	27	-	-	31	38	31	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	15	40	35	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	-	7	50	43	-	-	89	11	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	25	75	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	30	40	30	-	-	52	32	16	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	15	77	8	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/03/2025 al 27/03/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	19	81	-	-	89	11	-	-	-	17	83	-	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	68	26	6	-	-	7	93	-	-	64	36	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	20	80	-	-	52	31	17	-	-	20	80	-	-	52	33	15	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	53	47	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

