

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

10 de abril de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 10 de abril de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 10/04/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados de los últimos 7 días se registraron en el sur de Corrientes (Monte Caseros 128mm), Entre Ríos (Gualeguaychú 105mm) y centro de Santa Fe (Sunchales 69mm). También se registraron más de 50mm en otras localidades pertenecientes a estas tres provincias. Fuera de ellas, los mayores acumulados corresponden a Posadas (36mm), Marcos Juárez (30mm), Junín (30mm) y Laboulaye (27mm). En la mayor parte del país las lluvias resultaron inferiores a 10mm o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 03/04/2025 al 08/04/2025

Conforme avance el sistema frontal en el país, se esperan lluvias con diversa intensidad en el norte de Río Negro, este de Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Formosa y algunos sectores del NOA, aunque los mayores acumulados se podrían dar en La Pampa, sur de Buenos Aires y norte de Río Negro. En Patagonia durante toda la semana podrían darse acumulados de precipitación con diversa intensidad.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media fue inferior a la normal en casi todo el territorio nacional. Se destacan los valores medios de 4°C a 6°C por debajo de lo normal en el centro y norte del país. El valor más bajo registrado fue de -9°C en Maquinchao (Río Negro). En La Pampa, Buenos Aires y Córdoba se registraron mínimas inferiores a 3°C, lo mismo que en Patagonia. Se destacan las mínimas de -0.4°C en Santa Rosa y -0.1°C en Tandil.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 03/04/2025 al 08/04/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a inferiores a lo normal, en la mayor parte de Argentina, excepto el sur de Patagonia, donde se esperan temperaturas medias normales a levemente por sobre lo normal. Entre jueves y domingo, con el avance de un sistema frontal, se prevén temperaturas bajas primero en Patagonia y posteriormente en el centro y norte del país. A partir del lunes y hasta el miércoles de la próxima semana se espera que las temperaturas vayan en aumento de forma paulatina, aunque en el norte podrían alcanzar los 30°C o más en este periodo.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En los últimos 7 días, en la mayor parte de la región pampeana, prevalecieron los desecamientos leves, con disminución de áreas con excesos hídricos y predominio de reservas adecuadas a óptimas. En la provincia de Entre Ríos los excedentes hídricos se han generalizado, como consecuencia del último aporte de lluvias sobre suelos que ya contaban con un contenido de humedad cerca de capacidad de campo. También se generalizaron los excedentes hídricos en la provincia de Santa Fe, ocupando la mayor parte del área sojera principal de la provincia, y en el este de Córdoba. En el norte del país los excesos hídricos muestran un leve retroceso, pero los perfiles siguen muy cargados, sobre todo al este de Salta (cuenca alta del Bermejo) y centro de Chaco.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, el avance de la cosecha es del 30%, con rendimientos promedio de 12 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapas de plena floración a apertura de capsulas.

Las precipitaciones generalizadas en la delegación Avellaneda han provocado una desaceleración en las labores de cosecha, aunque hasta el momento no se reportan inconvenientes logísticos.

En la delegación Santiago del Estero, los lotes se encuentran mayoritariamente en estado de floración avanzada, con formación de capullos, y la trilla registra un progreso del 24%. En la zona de la delegación Quimilí, el cultivo transita el final de las etapas reproductivas, las cuales se vieron condicionadas por estrés térmico y déficit hídrico. No obstante, las precipitaciones recientes favorecen el rebrote, lo que permitiría una recuperación parcial del potencial productivo.

En Salta, la mayoría de los lotes se encuentra en pleno capsulado, con los más adelantados próximos a la apertura de cápsulas. Algunos siguen en floración, beneficiados por las lluvias recientes. En términos generales, el estado sanitario y fenológico del cultivo es bueno.

ARROZ

La cosecha en Corrientes sigue con retrasos debido a las precipitaciones continuas. Los rindes obtenidos con el 77% del área recolectada son de 45 qq/ha para el largo ancho y el 75 qq/ha para el largo fino.

En Rosario del Tala, el avance de la cosecha alcanza el 85%, con una marcada anticipación respecto al calendario habitual. Los rendimientos son buenos, con promedios de 80 qq/ha en la variedad largo fino y 60 qq/ha en largo ancho.

Las precipitaciones irregulares ocurridas durante la semana provocaron una desaceleración en las labores de cosecha en la zona de Avellaneda. Aun así, se logró avanzar sobre el 90% del área implantada de la variedad largo fino, con un rendimiento medio de 65 qq/ha. En cuanto a la variedad largo ancho, el progreso alcanza el 35% del área, con rindes promedios cercanos a los 60 qq/ha. En Rafaela, la cosecha finalizó con buenos resultados productivos, registrándose rendimientos promedio de 63 qq/ha para arroz tipo largo ancho y 74 qq/ha para largo fino.



GIRASOL



Durante la semana se registraron precipitaciones cuyos valores no fueron abundantes, pero que en aquellas regiones donde ocurrieron las mayores precipitaciones, sobre todo la zona de los bajos, la falta de piso complica el paso de la maquinaria retrasando las labores de cosecha. Previo a la ocurrencia de estas precipitaciones la cosecha se encontraba generalizada, y a la fecha la superficie cosechada representa el 84% del total implantado. Sin embargo, dado el contexto climático, existe un retraso respecto a la campaña pasada ya que para similar fecha el avance de la cosecha a nivel provincial era de 96%.

En términos generales, puede considerarse una buena campaña, en donde los rendimientos se ubican dentro de los valores promedio llegando a superarlos en algunos casos. Se han reportado lotes con granos brotados a causa de la elevada humedad, sin llegar a ser una situación extendida y se estima que esta merma no resultaría significativa en el promedio general.



La cosecha se encuentra próxima a finalizar, siendo la zona de la delegación San Francisco, la más retrasada con poco más de 75% cosechado. A nivel provincial, el total trillado representa el 90%. Esta campaña tuvo como característica un importante crecimiento en superficie para esta oleaginosa, que tuvo un muy buen desempeño. Los rendimientos obtenidos fueron muy buenos, reportándose valores que por ejemplo en el área de influencia de la delegación Marcos Juárez el promedio se situó entre los 30 y 32 qq/ha, con picos de hasta 40 qq/ha.



Si bien se registraron algunas precipitaciones en la zona de la delegación General Pico, la cosecha ha avanzado a buen ritmo alcanzándose un 85% de la superficie trillada a nivel provincial.



Los rendimientos obtenidos son considerados buenos. Para la zona de la delegación Santa Rosa se han reportado valores que van desde los 20 qq/ha hasta los 32 qq/ha.



La ausencia de precipitaciones durante la semana informada ha permitido avanzar sin inconvenientes con la cosecha encontrándose muy próxima a finalizar.



Se han registrado precipitaciones de variada intensidad lo que demora el avance de las labores de cosecha y consecuentemente la finalización de la misma. En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte provincial, restan por cosecharse algunos lotes en el departamento Nueve de Julio, al este de la delegación. Los rindes obtenidos para estos últimos lotes se ubican entre los 5 y los 10 qq/ha a causa de la escasez hídrica ocurrida durante el ciclo del cultivo en esa región.



Se ha finalizado la cosecha en el oeste provincial que corresponde a la delegación Santiago del Estero. Los rendimientos obtenidos se ubicaron entre los 23 y 25 qq/ha.



MAÍZ



En la semana prácticamente no se registraron lluvias salvo en el ámbito de las delegaciones Pergamino y Junín, alcanzándose valores del orden de los 10 a 30 mm como máximo.

En la zona norte, en donde ya comenzó la cosecha del cultivo de soja, la del maíz temprano se realiza lentamente ya que se está dando prioridad a la oleaginosa. En el resto de la provincia, la trilla del cereal pudo avanzar considerablemente, debido a la ausencia de lluvias y a que, en muchos casos se lo prioriza por la debilidad de la caña que presentaron muchos lotes tempranos por la sequía que los afectó en diciembre y enero. Los rindes que se están obteniendo son muy heterogéneos y están dando valores por debajo de los normales en la zona norte, mientras que en el centro y sur son buenos a muy buenos. Continúa el picado del maíz con destino forrajero.

En general, los maíces sembrados tardíamente y los de segunda se encuentran entre la etapa de llenado de grano e inicio de madurez y su condición ha mejorado notablemente con las precipitaciones de febrero y marzo, por lo que se esperan muy buenos rendimientos.

Los partidos de Carlos Casares y Pehuajó siguen teniendo una situación muy crítica, sobre todo al sur de la ruta nacional 5, con campos anegados y caminos intransitables por agua. Los partidos de Carlos Tejedor y Rivadavia, con menores lluvias, mejoraron su situación notablemente al punto de no presentar casi anegamiento de lotes agrícolas y tampoco caminos cortados por agua, salvo algunas excepciones en zonas muy bajas. El partido de Trenque Lauquen tampoco tiene superficie agrícola anegada a excepción del sudeste en cercanía del partido de Daireaux y Pehuajó, donde los caminos están intransitables por agua. También el partido de Nueve de Julio, principalmente en la región sur y oeste, presenta, en la actualidad, excesos hídricos que dificultan el comienzo de las labores de cosecha de la gruesa.

El día viernes 4 se registraron las primeras heladas agronómicas aunque de baja intensidad en la zona de las delegaciones Pehuajó, Pigüé, Tandil y Tres Arroyos que no afectaron al maíz de segunda o tardío pero podrían acortar el ciclo del cultivo.





Los trabajos de cosecha del maíz temprano avanzan a medida que las condiciones climáticas lo permiten y se alcanza la humedad adecuada en el grano. Los rindes son muy dispares oscilando entre promedios de 64 (en la zona de la delegación Río Cuarto) a 98 qq/ha (en el departamento Marcos Juárez), siendo el valor provincial medio de unos 88 qq/ha. Continúa el picado de los lotes con destino a forraje. Los daños por granizo en la zona de Pascanas, Laborde, W. Escalante y Monte Maíz son importantes, estimándose unas 6.000 hectáreas perdidas.

En el ámbito de la delegación Laboulaye y al sur del departamento Río Cuarto, se registraron heladas agronómicas (tempranas para la zona) que podrían haber causado daños en los planteos más tardíos, aún no dimensionados.

Los maíces tardíos y de segunda están completando el llenado de granos, con muy buen estado general, especialmente los sembrados en enero, favorecidos por las lluvias de febrero y marzo.



Nuevamente se registraron lluvias y lloviznas en toda la provincia. De todas maneras, las pérdidas de plantas y rendimiento de los lotes más adelantados, provocadas por la sequía prolongada del verano, son irreversibles. En cambio, los cuadros más tardíos, que aún se encuentran en etapas de crecimiento vegetativo a grano lechoso, van a ser beneficiados.



El avance de cosecha se mantiene en un 82%, que es la totalidad del maíz de temprano o de primera sembrado. El 18% restante correspondiente a los maíces tardíos y de segunda que avanzan en muy buena condición hacia la etapa de madurez, beneficiado por las lluvias de las últimas semanas.





En la zona de la delegación General Pico, durante la semana se registraron algunas precipitaciones dispersas con máximos de 20mm. El día 04/04 se registró la primera helada del año. Si bien la temperatura mínima se ubicó en 0.4C° (Estación Meteorológica SMN General Pico), ha causado daños a los cultivos, sobre todo a los que se encontraban más atrasados. Los cultivos de primera más adelantados se encuentran en período de madurez. Avanzan las labores de picado de algunos lotes, destinados a reservas forrajeras.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa no se produjeron lluvias pero también se registró la primera helada del año el día 04/04. Los maíces de primera tempranos se encuentran en plena madurez (R6), siendo los cultivos de primera siembra tardía (que se encuentran en R5) los que mejor toleraron estas condiciones adversas y en la actualidad se encuentran en muy buen a excelente estado. Los maíces de segunda están en R4 y si bien se encontraban en buenas a muy buenas condiciones por las últimas lluvias de marzo, fueron los más afectados por esta helada temprana, evaluándose los daños.



La ausencia de lluvias permitió comenzar con la cosecha de los primeros lotes de maíz temprano. Se produjo la primera helada del año en diferentes sectores de la provincia, afectando a los maíces con fecha de siembra más retrasada, daños que se serán relevados en los próximos días. Se están picando varios lotes de maíz para forraje.



En el norte provincial, en el ámbito de la delegación Avellaneda, el maíz de segunda o tardío sigue avanzando en su etapa de llenado de granos.

Se da por concluida la cosecha del maíz temprano en la zona de la delegación Rafaela, obteniéndose buenos rindes, con promedios de 70 a 75 qq/ha en el sector norte y de 85 a 95 qq/ha en el centro-sur. Los maíces tardíos se encuentran en llenado de granos, beneficiados por las lluvias de esta semana que alcanzaron acumulados de 7 a 45mm en el norte y de 30 a 70mm en el centro-sur.



Se observan dos realidades distintas, una en el norte de la delegación con plantas de menor porte y menor cantidad de granos fijados con mermas de rendimiento, y otra, en el centro-sur, que muestran plantas con buena estructura, y llenado de granos en condiciones buenas a muy buenas.

En la delegación Cañada de Gómez las labores de cosecha del maíz temprano se encuentran detenidas, y la maquinaria abocada a la cosecha de soja. Los lotes de maíz tardío y de segunda se encuentran en excelente estado en pleno llenado de grano, beneficiados por las abundantes precipitaciones recibidas.

En la delegación Casilda la nueva irrupción de precipitaciones a partir del fin de semana impidió la finalización de la trilla. La mayor parte de los lotes recolectados estuvo dentro del promedio de 80 a 90 qq/ha, con excepción de un amplio sector del centro-sudoeste del departamento Caseros con producciones de 100 qq/ha. La diferencia obedece a la oportunidad de chaparrones durante la fase reproductiva del cultivo y a un alto nivel de inclusión tecnológica en esos campos. Los cuadros de maíz tardío y de segunda evolucionan hacia su madurez con humedad suficiente para completar adecuadamente la etapa de llenado de granos.

Se registró un avance de 20 puntos porcentuales en la delegación Venado Tuerto, alcanzando el 65% del área total. Los rendimientos son buenos a regulares.



Durante esta semana no se produjeron precipitaciones y se mantuvieron las temperaturas moderadas. Los contenidos de humedad de los suelos agrícolas se encuentran regulares a adecuados en el oeste provincial, en tanto que en el este la situación empeora, observándose situaciones de principio de sequía.

La mayor parte de los lotes se encuentra en grano lechoso excepto los sembrados a fines de enero que están finalizando la etapa de floración. Estos presentan algunos daños por las excesivas temperaturas de enero y febrero. Se observa la presencia de *Dalbulus maidis* pero sin daños de significancia.



El cultivo de maíz volvió a recibir lloviznas de variada intensidad en momentos definitorios de rendimiento para un amplio espectro de casos. La mayor parte de los lotes se encuentran en llenado de granos.



MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la delegación Lincoln, los lotes presentan buen estado general, avanzando desde el llenado de granos hacia las etapas previas al arrancado. En la delegación Pehuajó el cultivo presenta un buen desarrollo y cobertura total del entresurco, aunque algunas hojas nuevas han sido afectadas por heladas.

En Córdoba los lotes de maní progresan desde el llenado de granos hacia las etapas previas al arrancado, con condiciones favorables y expectativas de buen rendimiento. En Laboulaye, los lotes más tempranos presentan amarillamiento foliar, mientras que, en el departamento General Roca, algunos lotes se están secando para anticipar el arrancado. En Marcos Juárez, la cosecha comenzará cuando el clima lo permita, ya se han registrado pérdidas por granizo. Además, en Río Cuarto, las lluvias recientes y las condiciones climáticas adversas complican el llenado de granos y el inicio del arrancado. Las heladas en el sur del departamento agravan aún más la situación.

En La Pampa, los lotes se encuentran en etapa de llenado de granos, sin embargo, algunos han sufrido daños debido a la primera helada del año ocurrida la semana anterior.

El cultivo en Jujuy avanza lentamente hacia la madurez. Mientras tanto, en Salta, gran parte de los lotes se encuentran en etapa de llenado de cajas, con algunos aún en floración, aprovechando las lluvias recientes para mejorar su rendimiento potencial. En ambas provincias, la condición del cultivo sigue siendo generalmente buena.

POROTO

En Salta y Jujuy los lotes se encuentran en plena floración, atravesando esta etapa crítica con una adecuada disponibilidad hídrica en el perfil del suelo. El estado general es óptimo.

En Santiago del Estero, la mayor parte del cultivo continúa en crecimiento activo. Algunos lotes que fueron sembrados, se han visto favorecidos por las precipitaciones recientes. En Quimilí, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado de granos, afectados por las altas temperaturas y la falta de lluvias.

En Tucumán, el cultivo se encuentra en etapa de floración, y existe preocupación por el riesgo de heladas tempranas.



SOJA



Prosigue con prioridad la cosecha de soja de primera en la zona de Pergamino. Estos lotes se encuentran en madurez comercial, y presentan un contenido de humedad apto para ser trillado. Los rendimientos y la calidad del grano son buenos en general y dentro de lo esperado. Hacia el oeste, en la zona de la delegación Lincoln, también se han cosechado los primeros lotes, pero estos presentan elevado contenido de humedad y presencia de grano verde, en este caso los rendimientos promediaron los 26 qq/ha.

En las áreas restantes, en términos generales, las sojas de primera se encuentran ingresando a la etapa de madurez, presentando el característico color y la pérdida de follaje.

Hacia el centro y sur de la provincia, la caída en las temperaturas ha provocado la ocurrencia de heladas sin reporte de daños, sin embargo se prevé que esta situación provoque el acortamiento del ciclo.

Respecto a los planteos de soja de segunda, es notoria la recuperación posteriormente a la ocurrencia de lluvias. Los lotes presentan gran cantidad de entrenudos con abundante follaje. El cultivo se encuentra en pleno llenado y dada la adecuada disponibilidad hídrica se estiman buenos rendimientos. Se ha reportado presencia de chinches y se realizan los controles correspondientes.



Se han iniciado las labores de cosecha de sojas de primera en zonas correspondientes a las delegaciones Marcos Juárez, Río Cuarto y Villa María, mientras que en la zona de Laboulaye el cultivo transita etapas entre pleno llenado e inicios de madurez.

En la zona de Marcos Juárez, los rendimientos se ubican dentro de los promedios regionales con valores entre los 36 y 38 qq/ha. Se estima que a raíz del fuerte temporal ocurrido junto con caída de granizo en la zona de Pascanas, Laborde, W. Escalante y Monte Maíz, podrían haberse visto afectadas alrededor de 8000 hectáreas de soja de primera y aproximadamente 5000 hectáreas de soja de segunda ocupación.



En Río Cuarto, las precipitaciones ocurridas han detenido el avance de la cosecha. Los rendimientos obtenidos no son los esperados y a la fecha el material recolectado tampoco presenta buena calidad.

En la zona de San Francisco prosigue la trilla y han comenzado a tomar impulso las labores, los rendimientos obtenidos se encuentran en un rango de entre 30 y 40 qq/ha. Respecto de las sojas de segunda, prácticamente la totalidad de los planteos se encuentran en la etapa de pleno llenado, en muy buen estado ya que han sido favorecidas por las lluvias ocurridas durante los meses de febrero y marzo. Las perspectivas de rendimiento son muy buenas.



Nuevamente se han registrado precipitaciones de variada intensidad en gran parte del territorio provincial. La mejora en la disponibilidad hídrica permitirá la recuperación del cultivo, sobre todo en aquellos de siembra tardía. En general, el cultivo transita etapas que van desde plena floración hasta formación de grano.



Se han registrado precipitaciones en el inicio de la semana en prácticamente todo el territorio provincial, lo que ha detenido las labores de cosecha de lotes de soja de primera que incipientemente se habían iniciado.

En la zona de la delegación Paraná, se estima que los rendimientos de los planteos ubicados en el centro oeste sean mejores respecto de los de la zona norte, ya que en los primeros, las precipitaciones ocurrieron antes permitiendo que el cultivo tenga una mejor performance.

En Rosario del Tala, los primeros lotes trillados corresponden a aquellos de siembra temprana y de ciclos cortos.

Las sojas de segunda se desarrollan en etapas que van desde plena fructificación hasta pleno llenado, con adecuadas condiciones hídricas en los suelos y presentando muy buen estado general.





Solamente se registraron precipitaciones en forma de llovizna en la zona norte de la provincia que comprende a la delegación General Pico. En esta región se registró la primera helada agronómica el día 04/04 provocando daños en los lotes de segunda y de siembra tardía.

Así mismo, hacia el sur, en el ámbito de la delegación Santa Rosa, la helada provocó daños en lotes de soja de segunda que se encuentran atravesando etapas vegetativas y que presentan una gran disparidad en su estado general. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran ingresando a la etapa de madurez y no presentan daños.



Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes. La ocurrencia de la primera helada ha provocado daños en los lotes más retrasados.



En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte de la provincia, el cultivo se encuentra en la etapa de llenado, con los lotes más adelantados ya ingresando a la madurez. Se estima que la cosecha de estos últimos lotes inicie luego de la segunda quincena de abril y que dada la gran disparidad en el estado de los planteos, los rendimientos presenten una amplitud de valores.

En Rafaela, se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes de soja de primera ubicados al sur de la delegación. Si bien existe una gran variabilidad en los rindes en todos los casos son muy buenos y se reportan valores de entre 34 y 38 qq/ha, mientras que en las mejores zonas los rendimientos oscilan entre 48 y 55 qq/ha. Actualmente las labores se encuentran interrumpidas a causa de las precipitaciones registradas y se estima continuar en cuanto mejoren las condiciones.



Se han realizado aplicaciones para el control de enfermedades de fin de ciclo en aquellos lotes más atrasados. Respecto de la soja de segunda, fenológicamente se encuentra atravesando etapas entre R4 y R7, diferenciándose el estado de los lotes según su ubicación geográfica, ya que aquellos planteos ubicados al norte de la delegación se desarrollaron en condiciones adversas presentado lotes con un estado general entre regular y malo, mientras que hacia el sur, ante la mejora en las condiciones climáticas se reportan lotes recuperados en muy buenas condiciones.

En la zona centro-sur, toda la maquinaria se encuentra abocada a la cosecha de las sojas de primera, que se ha iniciado con buen impulso. Actualmente la cosecha se encuentra detenida temporalmente debido a las precipitaciones ocurridas en los últimos días y se espera retomar en cuanto mejoren las condiciones de transitabilidad. Se reportan rendimientos entre los 35 y 40 qq/ha.

Respecto de las sojas de segunda se encuentran atravesando etapas que van desde R5 hasta R8. La elevada humedad provocada por las últimas lluvias obstaculiza el ingreso al estado de madurez.



No se registraron precipitaciones durante la semana informada. No obstante, las últimas precipitaciones han permitido la mejora en la humedad de los perfiles que en la mayoría de los casos se encuentra en niveles adecuados.

En el oeste provincial, que comprende a la delegación homónima, se ha iniciado la cosecha de los lotes de siembra temprana. Los rendimientos obtenidos son heterogéneos y en promedio alcanzan los 28 qq/ha, estimándose que estos valores se establezcan en cuanto la trilla se generalice.

En el este, en la zona de la delegación Quimilí, la mejora en las condiciones hídricas ha permitido la recuperación de lotes, aunque se informa una importante cantidad de lotes perdidos ante las adversas condiciones previas. La mayoría de los lotes se encuentran en la fase de llenado, si bien limitados en su crecimiento y con una escasa estructura vegetativa se espera que las adecuadas condiciones de humedad permitan un buen llenado incrementando el peso final del grano. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia, la situación es muy diferente con lotes en buen estado.





Se han registrado algunas lloviznas para la región durante la semana informada, pero la baja intensidad de las mismas no ha interferido en la cosecha que prosigue en la provincia de Tucumán y se ha iniciado en la provincia de Salta. El cultivo en general presenta buenas condiciones, los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes cosechados es aceptable con valores que oscilan entre los 20 y 24 qq/ha.

SORGO GRANÍFERO



El cultivo se encuentra, entre las etapas de llenado de granos y madurez, bajo condiciones muy buenas de humedad, presentando, en general, un buen aspecto. En la delegación Pergamino, la cosecha prosiguió, alcanzando el 30% de la superficie implantada y rindes que promedian los 58 qq/ha. Se informa el inicio de la trilla en el ámbito de la delegación La Plata, siendo los rindes, con un 10% de avance, de unos 65 qq/ha, en promedio.



En general, el cultivo se encuentra completando la etapa de llenado de granos, con los lotes más tempranos avanzando hacia la madurez fisiológica. Los lotes presentan un buen estado favorecidos por las precipitaciones ocurridas durante este último período. Prosiguieron los trabajos de recolección en los departamentos San Justo y Río Primero, en el norte provincial, obteniéndose rindes que promedian los 55 qq/ha. A su vez, comenzaron en los departamentos Colón, Río Segundo, Santa María y Tercero Arriba, siendo los primeros valores de rendimiento del orden de los 48 a 55 qq/ha en promedio. Los lotes con destino forraje fueron picados con buenas productividades.





Las lluvias impidieron proseguir con la cosecha, la cual se mantiene en un 88% de avance. Los rindes obtenidos promedian los 35 qq/ha.



Las nuevas lluvias registradas contribuyen a disminuir el deterioro sufrido por el cultivo por la situación de sequía que lo venía afectando, esperándose una mejora en la condición del mismo. Comenzó la cosecha de los lotes más avanzados en los departamentos de General Belgrano y Mayor Luis Fontana, con rindes del orden de los 16 a 18 qq/ha, en promedio.



Se estima un avance de cosecha del 59% a nivel provincial, con rindes muy variables que promedian los 32 a 58 qq/ha según la zona.



El cultivo se encuentra en etapa de llenado de granos. Su condición es buena en el 65% del área implantada y regular en el 35% restante.



Continuó la cosecha principalmente donde no se generalizó la de soja, con rindes variables que van desde 22 qq/ha en la región norte a 60-70 qq/ha en la zona sur, dependiendo de las limitantes edáficas. El cultivo se encuentra transitando, en su mayoría, las etapas de grano duro y madurez. Actualmente la recolección está detenida a causa de las recientes lluvias.






En la semana no se registraron precipitaciones, de todos modos la humedad en los suelos es buena, beneficiando al cultivo que se encuentra entre floración avanzada y llenado de granos.



Nuevas lloviznas continúan apuntalando el cultivo. Los lotes más atrasados que se encuentran en llenado de granos todavía pueden aprovechar estos aportes, mientras que los más adelantados, ya alcanzaron el estado de grano pastoso o madurez. Por lo general, el estado del cultivo es bueno a muy bueno. Se cosecharon los primeros lotes en el departamento Anta en la provincia de Salta, obteniéndose rindes del orden de los 25 qq/ha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	06/03	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	45	51	57	69	70	74		11.010
	LF	95.800	50	62	69	77	79	82		75.481
T. CORRIENTES		110.600	49	60	67	76	78	81	0	86.491
R. S. Peña	LA	0								0
	LF	3.500	30	50	70	85	85	100		3.500
T. CHACO		3.500	30	50	70	85	85	100	0	3.500
PARANA	LA	2.200	85	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	46	69	81	89	94	97		23.694
T. PARANÁ		27.920	49	72	83	90	94	97	0	25.894
R. DEL TALA	LA	6.000	7	10	40	50	75	85		5.100
	LF	39.000	8	10	40	50	75	85		33.150
T. R.DEL TALA		45.000	8	10	40	50	75	85		38.250
T. ENTRE RÍOS		72.920	23	33	56	65	82	89	0	64.144
FORMOSA	LA	0								0
	LF	14.400	42	57	60	66	76	87		12.528
T. FORMOSA		14.400	42	57	60	66	76	87	0	12.528
AVELLANEDA	LA	1.500								525
	LF	12.100	35	55	70	78	85	90		10.890
T. AVELLANEDA		13.600	31	49	62	70	78	84	0	11.415
RAFAELA	LA	400	10	30	50	80	100	100		400
	LF	15.500	35	50	70	85	95	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	34	49	69	85	95	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	33	49	66	78	87	93	0	27.315
TOTAL PAÍS	LA	24.900	36	42	53	64	72	77		19.235
	LF	206.020	39	51	64	73	81	87		174.742
TOTAL PAÍS	24/25	230.920	38	50	63	72	80	86	0	193.977
	23/24	202.450	9	24	42	54	61	68		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600				8	18	50		2.800
Bolívar	84.800	9	9	15	23	60	83	1.645	69.160
Bragado	8.270				50	100	100		8.270
General Madariaga	62.750			1	19	61	80		50.282
Junín	4.130			5	20	40	80		3.304
La Plata	12.500		2	50	80	95	98		12.250
Lincoln	47.000		3	34	82	99	99		46.657
Pehuajó	90.522	10	10	61	88	90	100		90.522
Pergamino	3.200		19	29	100	100	100		3.200
Pigüé	90.000			3	20	48	70		62.613
Salliqueló	160.000		1	7	29	41	65		103.200
Tandil	175.000			13	32	67	87		151.498
Tres Arroyos	258.296		2	8	25	68	89		230.193
25 de Mayo	61.000			26	67	94	100	1.747	59.253
BUENOS AIRES 24/25 23/24	1.063.068 1.050.314	2 8	2 24	16 46	37 69	66 89	84 96	3.392	893.201
Laboulaye	70.337		10	30	70	85	95		66.820
Marcos Juárez	33.100	21	41	61	86	86	89		29.502
Río Cuarto	12.500		10	20	67	87	100		12.500
San Francisco	50.600	21	21	39	47	57	76		38.294
Villa María	18.800			50	86	100	100		18.800
CÓRDOBA 24/25 23/24	185.337 130.430	10 23	19 47	39 52	68 82	79 92	90 100	0	165.916
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.400	100	100	100	100	100	100		15.400
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	27.720 9.850	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0	27.720
General Pico	138.900			30	60	70	85		118.065
Santa Rosa	120.000		2	32	70	74	86		102.912
LA PAMPA 24/25 23/24	258.900 226.500	0 30	1 50	31 65	65 85	72 95	85 99	0	220.977
Avellaneda	139.700	89	94	97	98	99	99	50	138.868
Cañada de Gómez	20.000	71	81	91	100	100	100		20.000
Casilda	8.000			17	54	54	86		6.028
Rafaela	78.050	99	99	100	100	100	100		78.050
Venado Tuerto	1.500	90	90	100	100	100	100		1.500
SANTA FE 24/25 23/24	247.250 210.300	89 95	93 98	95 98	98 100	98 100	99 100	50	244.446
CATAMARCA	100						100		100
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100	600	61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600	100	100	100	100	100	100		2.600
SALTA	980								
SAN LUIS	89.000	1	19	51	67	73	95		84.648
STGO. ESTERO	2.850						100	40	2.810
STGO. ESTERO (Quimili)	22.440	7	8	100	100	100	100		22.440
TUCUMÁN	250						80		200
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	2.049.465 1.857.963	21 29	24 43	39 58	58 78	75 92	89 97	4.612	1.813.899

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500					12	22	7.498	0
Bolívar	246.000					15	18	24.685	48.690
Bragado	206.400				15			10.780	35.210
General Madariaga	156.300					1	1	28.200	1.280
Junín	183.950	2	7	11	17	23	40	18.200	66.300
La Plata	60.000			2	8	15	20	18.000	8.400
Lincoln	300.000			4	10	29	36	41.000	93.240
Pehuajó	336.651					11	21	74.063	55.140
Pergamino	197.700		9	10	37	52	53	17.500	95.510
Pigüé	148.000							10.000	0
Salliqueló	250.000						5	122.000	6.400
Tandil	330.000							60.000	0
Tres Arroyos	429.661			2	3	3	3	128.898	9.020
25 de Mayo	164.493				5	25	35	43.448	42.370
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.029.655 3.090.580	0 0	1 2	2 2	7 6	14 13	19 23	604.272	461.560
Laboulaye	427.616				10	15	16	14.967	66.020
Marcos Juárez	425.700	2	7	11	24	30	57	45.600	216.660
Río Cuarto	664.520			3	5	5	5	30.000	31.730
San Francisco	572.000			2	3	6	10	94.200	47.780
Villa María	427.000			2	9	13	20	110.000	63.400
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.516.836 3.188.920	0 0	1 2	3 2	9 3	13 13	19 17	294.767	425.590
Paraná	127.700	73	73	74	74	76	76	6.500	92.110
Rosario del Tala	305.000	56	62	72	81	85	85	10.860	250.020
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	432.700 568.200	61 22	65 29	72 32	79 37	82 41	82 48	17.360	342.130
General Pico	476.600							50.000	0
Santa Rosa	250.000							98.000	0
LA PAMPA 24/25 23/24	726.600 779.100	0 0	0 0	0 0	0 3	0 7	0 11	148.000	0
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez	183.000	10	15	21	46	60	60	40.000	85.800
Casilda	139.400	5	20	40	60	60	79	0	110.130
Rafaela	293.300	45	50	62	71	73	76	112.200	137.640
Venado Tuerto	210.000	15	15	35	35	45	65	12.000	128.700
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	19 3	24 7	37 13	49 26	55 45	66 52	165.700	466.270
CATAMARCA	8.450							970	0
CORRIENTES	9.590	91	93	93	93	93	93	700	8.280
CHACO (Charata)	84.000							34.450	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950							42.150	0
FORMOSA	37.000							15.000	0
JUJUY	12.049							1.973	0
MISIONES	31.510				10	10	20	3.000	5.700
SALTA	359.281							5.000	0
SAN LUIS	385.300						4	37.930	13.890
STGO. ESTERO	124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimili)	397.240							4.000	0
TUCUMÁN	62.930							7.190	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.237.291 11.103.250	5 1,4	6 3	9 4	13 7	17 15	22 20	1.387.462	1.723.420

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	9.500							9.500	0
Bolívar	3.350							0	0
Bragado	850							0	0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900							0	0
La Plata	15.000						10	8.000	700
Lincoln	28.700							9.100	0
Pehuajó	3.790							0	0
Pergamino	18.000			4	20	20	30	0	5.400
Pigüé	9.000							0	0
Salliqueló	19.000							10.000	0
Tandil	0							0	0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252							2.937	0
BUENOS AIRES 24/25 23/24	129.467 109.293	0 0	0 0	1 0	4 2	4 4	7 13	46.662	6.100
Laboulaye	14.670							4.209	0
Marcos Juárez	23.150							4.550	0
Río Cuarto	17.950							0	0
San Francisco	65.000					4	8	9.210	4.463
Villa María	27.200						3	0	816
CÓRDOBA 24/25 23/24	147.970 116.303	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	4 3	17.969	5.279
Paraná	39.300			18	19	34	67	0	26.331
Rosario del Tala	78.300	6	9	21	31	45	55	7.500	38.940
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	4 0	6 0	20 4	27 14	41 25	59 46	7.500	65.271
General Pico	8.300							500	0
Santa Rosa	18.000							10.400	0
LA PAMPA 24/25 23/24	26.300 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900	0
Avellaneda	48.800	6	10	29	29	29	29	26.700	6.409
Cañada de Gómez	30.000				25	46	48	2.000	13.440
Casilda	45.000						26	0	11.700
Rafaela	100.050				8	26	51	47.700	26.699
Venado Tuerto	8.000					7	15	300	1.155
SANTA FE 24/25 23/24	231.850 182.448	1 2	1 4	4 8	11 17	22 32	38 42	76.700	59.403
CATAMARCA	2.480							430	0
CORRIENTES	6.000	3	54	77	87	88	88	3.200	2.464
CHACO (Charata)	55.000						3	19.500	1.065
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650							13.820	0
FORMOSA	32.000							12.000	0
JUJUY	3.010							280	0
MISIONES	0								
SALTA	39.397						1	2.000	374
SAN LUIS	22.350							9.410	0
STGO. ESTERO	63.800							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimili)	100.260							15.000	0
TUCUMÁN	19.900							3.600	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.050.034 827.086	1 0,4	1 1	4 2	7 5	11 10	17 15	248.971	139.956

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/04/2025 al 10/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	84	6	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	82	18	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	49	1	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	5	95	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	81	19	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	1	99	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	13	87	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	2	98	15	85	-	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	100	-	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/04/2025 al 10/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	15	85	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	27	73	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	77	23	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	34	66	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	10	90	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	40	60	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	17	83	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	21	79	23	50	17	10	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	30	70	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	80	20	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	52	48	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	61	39	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	75	25	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	15	85	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	45	55	32	58	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	3	97	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	60	40	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	4	79	17	4	75	21	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	53	47	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	19	81	10	90	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	10	90	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	70	30	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	55	45	-	73	27	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	4	85	11	2	33	30	35	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	22	78	55	40	5	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	17	83	38	56	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	24	76	21	50	21	8	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	51	49	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	2	4	94	-	78	22	-	A
CHACO	CHARATA	-	14	58	28	-	-	2	24	74	A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	22	51	27	-	-	31	38	31	A
JUJUY	JUJUY	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	15	40	45	-	90	10	-	A
SALTA	SALTA	-	-	4	90	6	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	88	12	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	83	17	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	16	31	53	-	-	31	46	23	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	89	11	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/04/2025 al 10/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	-	88	12	-	91	9	-	-	-	-	86	14	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	83	17	-	68	26	6	-	-	-	100	-	-	64	36	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	61	39	-	100	-	-	-	-	-	54	46	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	90	10	-	45	38	17	-	-	-	89	11	-	49	36	15	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	40	60	-	100	-	-	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

