

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

12 de febrero de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 12 de febrero de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 12/02/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Se destaca la precipitación acumulada en los últimos 7 días en Metán (Salta), con 208.8mm de los cuales 200mm corresponden a algunas horas del día miércoles 5. Otros dos máximos locales, de menor magnitud, se pueden apreciar en el mapa: 83mm en Santa Rosa de Conlara (San Luis) y 80mm en Santa María del Río Seco (Córdoba). En Pergamino se acumularon 52mm en el periodo considerado (fuente: BCR).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 04/02/2026 al 10/02/2026

En el NOA, durante los próximos 7 días se espera la recurrencia de eventos de lluvia con diversa intensidad. El avance del sistema frontal desde Patagonia, ocasionará precipitaciones entre jueves y sábado en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y el NEA. Durante el sábado y martes se esperan lluvias de forma aislada en localidades de Río Negro y de Santa Cruz.

TEMPERATURAS

La temperatura media resultó superior a la normal en el norte y NEA. Las máximas más altas reportadas fueron: 42°C en Rivadavia (Salta), 41.9°C en Las Lomitas (Formosa) y 40°C en Formosa capital. La mínima más baja corresponde a Bariloche, con 1.4°C. En el sudeste bonaerense se registraron mínimas entre 5°C y 8°C, aunque las máximas superaron ampliamente los 30°C en esa zona.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 04/02/2026 al 10/02/2026

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal en el centro-sur y sur de Argentina, mientras que se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en el norte y centro-norte del país. Entre jueves y sábado, con el avance de un sistema frontal desde el sur se espera un leve descenso de las máximas en el centro y norte del país. A partir del domingo se prevé que vayan en aumento y varias localidades del NOA y NEA, podrían registrar máximas sobre 35°C. En el sur el descenso de las temperaturas se producirá entre jueves y domingo, debido al frente frío, y posteriormente se prevé que las temperaturas aumenten de forma sostenida, más marcadamente al norte de Patagonia, donde algunas localidades de Río Negro alcanzarían registros de 30°C o más entre lunes y martes.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Dadas las escasas precipitaciones de la semana en gran parte de La Pampa y Buenos Aires, las reservas estimadas para lotes de soja continúan siendo escasas o deficitarias. Los mismos niveles de reserva se estimaron en Entre Ríos, sur de Santa Fe y sur de Córdoba.

En el NOA, mantienen las mismas categorías de la semana pasada, con suelos en condiciones de humedad óptima y otros con reservas excesivas o directamente excesos hídricos.

La mayor parte del NEA presenta niveles de reserva regular a adecuada, aunque al este las precipitaciones fueron menores y los almacenajes se clasificaron como deficitarios, en especial en Corrientes.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En Avellaneda, el cultivo se encuentra entre floración y llenado de cápsulas, en estado de bueno a regular, afectado por estrés hídrico y térmico que provocó pérdida de carga y baja turgencia, aunque aún podría recuperarse con nuevas lluvias. Se intensifican los monitoreos por picudo y presencia de pulgones; la cosecha comenzaría en marzo y preocupa el bajo precio de la fibra.

Los lotes en Roque Sáenz Peña transitan el tramo final de las fases reproductivas en muy buenas condiciones generales. La delegación Santiago del Estero presenta el cultivo totalmente implantado y en crecimiento activo, con algunos cuadros en floración y evolución normal. En Salta el desarrollo continúa en etapa vegetativa, mientras que en Quimilí la superficie sembrada se redujo respecto de la campaña anterior, tanto por decisiones comerciales como por excesos hídricos que demoraron la implantación.

ARROZ

En Entre Ríos, tanto en Rosario del Tala como en Paraná, los lotes transitan etapas de floración a panojamiento y llenado de grano, con evolución favorable tras un inicio dificultoso por cuestiones climáticas que fue compensado con riego y condiciones de altas temperaturas.

En Avellaneda los cuadros más avanzados se encuentran en madurez fisiológica y comenzó de manera incipiente la cosecha en el sur de San Javier, aunque las lluvias podrían demorar las tareas; se proyectan rindes normales, levemente inferiores a la campaña pasada. En Rafaela, los lotes atraviesan fin de floración y llenado en muy buenas condiciones sanitarias. En Corrientes, la cosecha avanza lentamente.



GIRASOL



La semana informada mantuvo similares registros climáticos a la previa, con elevadas temperaturas, presencia de vientos y precipitaciones puntuales y de escaso volumen. Dada las características propias del cultivo, el estado general no se vio alterado y mantiene buenas condiciones. La mayoría de los planteos se encuentra transitando las etapas entre floración y llenado, sin reporte de presencia o daños por plagas o enfermedades.



Prosigue la cosecha con las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco, encabezando el inicio de la trilla. Los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes rondan entre los 25 y 35 qq/ha, los planteos restantes se encuentran en la etapa de llenado.



Finalizó la cosecha en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, con rendimientos que promediaron los 23,7qq/ha. La campaña fue excelente para la región, y solamente en la zona oeste de la delegación, se registraron rindes menores como consecuencia de precipitaciones escasas durante la primavera y área perdida a causa de anegamiento o severos ataques de pájaros.



Continúa avanzando la cosecha a buen ritmo con una superficie trillada a nivel provincial que supera el 70%, Los rendimientos son considerados muy buenos informándose valores promedio que rondan alrededor de los 21 qq/ha.



La mayoría de los planteos en el ámbito provincial, transitan la etapa de llenado. Si bien las precipitaciones fueron pocas y mínimas, provocando que la humedad en las primeras capas del suelo sea insuficiente, en profundidad la humedad es adecuada y dada la morfología del cultivo se transita este período sin inconvenientes manteniendo buenas condiciones generales.



En la zona de la delegación Avellaneda, ha finalizado la cosecha. Los rendimientos obtenidos fueron muy variables y dependientes del área de influencia, con regiones que deprimieron este valor por encontrarse afectadas por la escasez hídrica y los intensos ataques de pájaros. El rinde promedio se sitúa alrededor de los 16 qq/ha, con muy buenos contenidos de materia grasa.

En el área de la delegación Rafaela la cosecha se encuentra cercana a finalizar. Los rendimientos obtenidos oscilan entre los 20 y 30 qq/ha, con valores máximos puntuales de hasta 40 qq/ha, superando los valores históricos.

En Cañada de Gómez, la mayoría de los planteos se encuentran en madurez con la cosecha avanzando a medida que se alcanza la humedad de cosecha. El avance en las labores es cercano al 50%, informándose rindes que promedian los 24 qq/ha.



En la zona de la delegación Quimilí, finalizó la cosecha. La superficie implantada en esta campaña tuvo un aumento considerable dadas las buenas condiciones al momento de la siembra. Los rendimientos obtenidos presentan una gran variabilidad de acuerdo a las precipitaciones ocurridas durante las etapas críticas del cultivo obteniéndose valores que oscilan entre los 18 y 22 qq/ha, considerados muy buenos para la región.

MAÍZ



En el norte bonaerense, el cultivo presenta un panorama variable según la delegación que se trate. En Junín y Pergamino, los tempranos transitan el tramo final del ciclo, en general con buena sanidad y rindes aceptables, aunque condicionados por el estrés hídrico de enero; las lluvias recientes en Pergamino resultaron oportunas, los maíces tempranos entraron en etapa final de ciclo y los tardíos están próximos a florecer. En Bragado, los planteos de primera se encuentran entre floración y llenado, con estado de bueno a regular y rindes estimados por debajo del promedio ante la falta de precipitaciones, mientras que los tardíos y de segunda, en etapas vegetativas, podrían recuperarse si se concretan nuevas lluvias. En Lincoln, en tanto, el cultivo se mantiene en buen estado, con adecuada humedad y sin problemas sanitarios de relevancia.

En el centro-oeste, las lluvias recientes fueron dispares e insuficientes frente a la elevada demanda atmosférica, manteniéndose un escenario de déficit hídrico variable, más marcado hacia el este. En este contexto, el maíz temprano es el más afectado, especialmente en Bolívar, donde atraviesa el período crítico bajo estrés, mientras que en Pehuajó evoluciona en general en condiciones aceptables, con limitaciones puntuales en sectores con menores reservas. Los planteos tardíos muestran un comportamiento dispar, más comprometidos donde faltó humedad previa, aunque con posibilidades de sostener su desarrollo si se consolidan nuevas precipitaciones.

Al centro-sur y este, el cultivo atraviesa una campaña condicionada por la escasez de lluvias y la elevada demanda atmosférica. En Tandil, los planteos de primera transitaron el período crítico bajo condiciones de alta exigencia ambiental; si bien lograron sostener un estado aceptable gracias a las reservas iniciales, la falta de precipitaciones en enero redujo significativamente la humedad en el perfil. En La Plata, las lluvias recientes resultaron insuficientes para revertir la delicada situación, afectando especialmente a los maíces tempranos, que subsisten, pero evidencian el impacto del estrés hídrico y las altas temperaturas.

Hacia el sudoeste, el maíz temprano presenta en general un buen estado, especialmente en Salliqueló, donde muestra una condición más favorable que los lotes tardíos. Estos últimos se encuentran más afectados por la falta de agua y las elevadas temperaturas registradas durante enero, evidenciando un estado entre regular y bueno según fecha de siembra y disponibilidad hídrica. En la zona de Pigüé, el cultivo atraviesa un marcado estrés hídrico que para los planteos tardíos muestran un mejor comportamiento relativo que los sembrados en fecha. No se reportan problemas sanitarios de relevancia.





En San Francisco, el maíz temprano se encuentra mayormente en grano lechoso y en excelentes condiciones, mientras que los tardíos transitan las primeras etapas vegetativas con buen desarrollo, impulsados por las condiciones favorables; se realizan fertilizaciones y monitoreos frecuentes por presencia de chicharrita.

En el centro-sur provincial, el panorama es más heterogéneo. En Laboulaye, los tempranos avanzan en llenado e inician madurez, y los tardíos y de segunda evolucionan en buen estado gracias a las últimas lluvias. En Río Cuarto, los tempranos están mayormente maduros, con rindes bajos salvo en lotes con riego o napa, mientras que los tardíos, en plena floración, aún dependen de nuevas precipitaciones para sostener su potencial. En Marcos Juárez comenzó la cosecha en los primeros lotes y se estiman mermas de entre 10 y 20 % por el estrés hídrico y térmico durante el llenado.



En la provincia, continúa la ola de calor y, hasta el momento, las precipitaciones han sido prácticamente nulas, con algunos registros aislados en el sur provincial hacia el final de la semana. Persiste la alerta por peligro de incendios, a la espera de lluvias pronosticadas para los próximos días. En este contexto, la cosecha del cultivo avanza de manera leve.



En Roque Sáenz Peña, la siembra continúa en el 40 % del área prevista, dado que en la última semana las labores se vieron frenadas por la falta de humedad en la cama de siembra, consecuencia de la elevada insolación y la ausencia de lluvias. En Charata, en cambio, la siembra retomó un muy buen ritmo aprovechando las ventanas en que la humedad superficial lo permitió, registrándose un progreso significativo con condiciones de implantación de adecuadas a regulares, siempre supeditadas a la disponibilidad de agua en los primeros centímetros del suelo.



ENTRE RÍOS

La cosecha de maíz de primera avanza de manera sostenida en las delegaciones Paraná y Rosario del Tala. En Paraná, los rindes promedian valores cercanos a 80 qq/ha, considerados satisfactorios. En Rosario del Tala, la trilla se desarrolla con adecuados tenores de humedad y resultados variables según las precipitaciones previas. Se estima que un 25% de los planteos tardíos o de segunda tienen destino forrajero en todas sus variables.

Respecto al maíz de segunda, en Paraná se acentúa el déficit hídrico, con lotes que evidencian estrés térmico e hídrico por la persistencia de altas temperaturas y la falta de lluvias. En Rosario del Tala, estos planteos se encuentran entre V6 y R1, en estado general regular y bajo monitoreo sanitario ante la presencia de *Dalbulus maidis*, a la espera de precipitaciones que permitan mejorar su condición.



LA PAMPA

En General Pico, los maíces de primera se encuentran entre floración y llenado, mientras que los planteos tardíos transitan pleno crecimiento y presentan mejores condiciones generales.



SANTA FE

En la zona de la delegación Avellaneda, el maíz de primera presenta un estado muy bueno en el este y más ajustado hacia el oeste, donde las condiciones van de regulares a malas. La cosecha avanza en el sector este, mientras otros lotes esperan perder humedad. El maíz de segunda finalizó su siembra y se encuentra en etapas vegetativas, con presencia de *Dalbulus maidis* que requiere monitoreos y aplicaciones de control.

En la zona centro-sur, en Rafaela, los maíces tempranos muestran excelentes rindes (entre 90 y 110 qq/ha e incluso superiores en lotes puntuales) y muy buena condición general; los tardíos mantienen buen desarrollo, aunque con síntomas de estrés térmico y seguimiento por chicharrita. En Casilda, las siembras tempranas sostienen mejores expectativas (cercanas a 100 qq/ha), mientras que las de octubre registran mermas aproximadas del 20 % por déficit hídrico. En Cañada de Gómez predominan lotes en madurez comercial a la espera de cosecha, y en Venado Tuerto el cultivo transita llenado de granos con

inicio de picado para uso forrajero. El maíz de segunda en el centro-sur enfrenta un escenario más ajustado por la sequía, especialmente en Casilda, quedando condicionado a nuevas lluvias.



En la zona de Quimilí, las condiciones iniciales fueron favorables, aunque comienzan a observarse cuadros afectados por estrés hídrico y altas temperaturas, con algunos casos puntuales de resiembra por planchado tras lluvias intensas.

En la delegación Santiago del Estero, las precipitaciones registradas durante la semana mejoraron la humedad de los suelos y permiten que la totalidad de los lotes transite etapas de crecimiento activo en buenas condiciones.



En el NOA, el cultivo transita etapas iniciales de crecimiento. En Jujuy y Salta, los lotes avanzan desde emergencia hasta 2–4 hojas, con buen desarrollo general y la ventaja de que las siembras tardías aún no atraviesan períodos críticos. En Tucumán, además del crecimiento de los planteos tempranos en zonas como La Cocha y Los Altos, se observa preocupación por el aumento poblacional de la chicharrita en áreas semilleras y de producción de choclo, registrándose también algunos casos de daño por Spiroplasma.

MANÍ

El cultivo presenta en general buenas condiciones en las principales regiones productoras. En Lincoln transita en floración con adecuada humedad y sin problemas sanitarios relevantes. En Córdoba, tanto en Laboulaye como en Marcos Juárez, muestra buen estado general y desarrollo normal, finalizando floración o en etapas de clavo y formación de caja, aunque en sectores de loma se registran pérdidas puntuales por falta de humedad. En General Pico el cultivo mantiene buenas condiciones.

En Jujuy predomina la etapa vegetativa, con un 10 % iniciando floración y a la espera de lluvias más regulares para sostener el potencial de rendimiento; y Salta avanza en crecimiento sin mayores contratiempos, con una evolución acorde a lo esperado para la etapa.



POROTO

En Jujuy, las labores progresaron poco durante la semana debido a la falta de condiciones adecuadas de piso, concentrándose los mayores avances en poroto mung en los distintos departamentos productivos. En Salta, en tanto, comenzó la implantación con el mung y se espera que en las próximas semanas se extienda a los demás tipos, principalmente en las zonas de Rosario y Metán.

SOJA



La situación climática para la semana informada repite patrones similares a la semana previa, con escasas y puntuales precipitaciones, acompañadas de elevadas temperaturas con presencia de vientos en varias regiones.

Las sojas de primera, presentan un estado general entre bueno y regular, dependiendo de la zona y precipitaciones recibidas. Estas sojas se encuentran en etapas entre floración y llenado de granos, con focos puntuales de arañuela.

En el caso de la soja de segunda, la escasez hídrica durante la implantación y posteriormente durante el crecimiento, ha afectado el desarrollo de los planteos, reportándose lotes de escaso porte y en algunos casos con dificultades en la emergencia. También se indica la presencia de arañuela.



Se registraron precipitaciones de variada intensidad en prácticamente todo el ámbito provincial. Estas lluvias atenúan la condición de escasez hídrica que se acentúa con las altas temperaturas que marcaron este período. La soja de primera en general mantiene un estado aceptable con cierta retracción de los síntomas de estrés que manifestaban luego de precipitaciones, aunque se estiman necesarias precipitaciones de relevancia para no ver afectado de forma sustancial el rendimiento potencial. Se informa presencia de arañuela, trips, e isocas, para los que se realizan aplicaciones para su control. Las sojas de segunda se encuentran en una situación crítica, con lotes en las zonas de influencia de las delegaciones Marcos Juárez y Río Cuarto, muy afectados en donde ya se y contabilizan sectores perdidos. Se estima que la ocurrencia de precipitaciones sustanciales en el corto plazo, podrían menguar el deterioro compensando de algún modo las pérdidas.



Durante la semana informada se registraron temperaturas extremas, provocando que el avance de la siembra se restrinja a zonas con adecuadas reservas, resultando un avance en la siembra a nivel provincial cercano al 90%.

Las adversas condiciones climáticas han repercutido en el establecimiento de los últimos lotes sembrados afectando la densidad de plantas. En los planteos emergidos y en crecimiento vegetativo, en general el estado es bueno.



Se acentúa el déficit hídrico en gran en gran parte de ambas delegaciones. Para el caso de la soja de primera, esto ha producido detención del crecimiento, y daño en la formación de flores y vainas, ya que las más adelantadas se encuentran entre R1 y R2. En la soja de segunda también se verifica detención del crecimiento de las plantas, con lotes de porte bajo y menor stand de plantas logradas. Se espera para la presente semana ocurrencia de lluvias que reviertan la situación de déficit. Las condiciones climáticas son propicias para la aparición de trips y arañuelas por lo que se intensifican las tareas de monitoreo y control.



Se registraron algunas precipitaciones en la zona de la delegación General Pico, con volúmenes que no superaron los 30mm. No obstante, estas lluvias resultaron beneficiosas para el cultivo, sobre todo para los planteos de segunda ocupación que ya manifestaban marcados signos de estrés hídrico. Las sojas de primera a la fecha mantienen buenas condiciones generales.



En la zona de la delegación Avellaneda, finalizó la siembra con la implantación de los últimos lotes. El estado general de los planteos está entre bueno y regular, ya que los primeros lotes sembrados han sido afectados por la

escasez hídrica, mientras que en los últimos, las abundantes precipitaciones y los encharcamientos temporales provocaron muerte de plántulas, y por ende menor densidad de plantas obtenidas.

En la zona de Rafaela, ocurrieron precipitaciones con valores de entre 15 y 60mm. Estos nuevos aportes hídricos lograron revertir los síntomas de estrés térmico a los que estaban sometidos los planteos. Las sojas de primera transitan etapas entre R2 y R5, mientras que las de segunda se encuentran entre crecimiento vegetativo y floración. Se realizaron aplicaciones para control de arañuela y trips.

También se registraron precipitaciones en la zona de la delegación Cañada de Gómez, resultando muy beneficiosas para el cultivo. Las sojas de primera se encuentran en etapas entre R3 y R5,5, con lo que con estos nuevos aportes se asegura la continuidad en el llenado de granos. En estos planteos se realizan aplicaciones con insecticidas y para control de enfermedades de fin de ciclo. Las sojas de segunda se encuentran entre R1 y R3.

En la zona de Casilda y Venado Tuerto, la escasez hídrica y las elevadas temperaturas, han impactado durante la etapa de floración, menguando el número de vainas, así como granos de bajo peso y tamaño. Se estima que los mejores lotes podrían alcanzar rendimientos máximos de 35 qq/ha, y los restantes se encuentran supeditados a la probabilidad de ocurrencia de lluvias. En cuanto a las sojas de segunda, su estado es crítico, con pérdidas irreversibles de rendimiento, inclusive pérdidas totales de lotes, con presencia importante de arañuela y trips.



Durante la semana han ocurrido algunas precipitaciones con una distribución que disminuye hacia el este provincial. Sin embargo y a pesar de las altas temperaturas, el estado de humedad se encuentra entre adecuado y regular, permitiendo que el cultivo mantenga buenas condiciones generales. La mayoría de los planteos se encuentran todavía en estados vegetativos, con los lotes más adelantados en la etapa de floración.




Nuevamente se registraron precipitaciones en toda la región. El cultivo implantado transita etapas entre pleno crecimiento y floración en buen estado general.

SORGO GRANÍFERO

En Pergamino los sorgos tempranos transitan la etapa final del ciclo y los tardíos están próximos a florecer con muy buen aspecto; en Bragado podría registrarse merma de rendimientos por el contexto climático, aunque su superficie es baja, y en La Plata los lotes evidencian estrés hídrico y altas temperaturas. En Córdoba, tanto en Laboulaye como en San Francisco, el estado general es aceptable a bueno, con materiales de primera entre floración, grano lechoso e inicio de llenado y tardíos en etapas vegetativas sin problemas sanitarios relevantes. Hacia el NOA y NEA, en Jujuy finalizó la siembra y el cultivo va desde emergencia hasta 2–4 hojas, en Salta predominan etapas de crecimiento y en Santiago del Estero avanzan con buena humedad. Avellaneda presenta sorgos de primera entre regulares y buenos, en llenado y con parte destinada a forraje, pero con rindes bajos, mientras comienza la siembra de segunda con menor superficie estimada; en Cañada de Gómez los lotes están en llenado sin inconvenientes y en Rafaela evolucionan entre floración y llenado en muy buenas condiciones, favorecidos por lluvias frecuentes que permiten proyectar buenos resultados.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	08/01 %	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %
Bahía Blanca	22.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	148.750	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	154.000	100	100	100	100	100	100
Junín	189.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	63.700	100	100	100	100	100	100
Lincoln	320.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	352.992	98	100	100	100	100	100
Pergamino	160.418	100	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	395.715	97	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	414.514	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	167.871	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	3.152.060	99	100	100	100	100	100
24/25	3.130.724	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	532.590	98	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	459.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	561.000	99	99	100	100	100	100
Villa María	440.000	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	2.892.990	99	100	100	100	100	100
24/25	2.563.297	99	99	100	100	100	100
Paraná	114.150	97	99	100	100	100	100
Rosario del Tala	424.000	97	98	98	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	538.150	97	98	98	100	100	100
24/25	359.700	99	99	100	100	100	100
General Pico	525.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	100	100	100	100	100	100
24/25	706.000	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	140.400	40	42	61	78	87	96
Cañada de Gómez	290.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	159.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	362.400	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	235.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.187.300	93	93	95	97	98	100
24/25	781.643	95	97	99	99,6	99,6	100
CATAMARCA	14.100	52	66	80	88	95	95
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	110.000	26	27	41	52	71	75
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.690	18	26	28	31	41	41
FORMOSA	36.000	25	30	35	40	45	45
JUJUY	7.598	8	15	50	80	100	100
MISSIONES	33.000	90	95	100	100	100	100
SALTA	285.191	30	41	55	76	89	100
SAN LUIS	469.200	96	98	100	100	100	100
STGO. ESTERO	155.125	29	59	85	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	46	65	86	90	100	100
TUCUMÁN	74.230	23	59	80	85	95	96
TOTAL PAÍS 25/26	10.461.054	90	92	95	97	98	98,6
24/25	9.234.043	91	93	94	96	98	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/01 %	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %
Bolívar	1ª	228.500	100	100	100	100	100	100
	2ª	122.600	80	95	100	100	100	100
Bragado	1ª	279.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	216.960	82	100	100	100	100	100
General Madariaga	1ª	36.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	41.100	97	100	100	100	100	100
Junín	1ª	339.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	181.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	1ª	57.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	28.850	80	95	100	100	100	100
Lincoln	1ª	480.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	207.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	1ª	400.850	98	100	100	100	100	100
	2ª	187.957	100	100	100	100	100	100
Pergamino	1ª	430.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	302.000	100	100	100	100	100	100
Pigüé	1ª	99.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	76.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	1ª	170.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	58.000	71	74	100	100	100	100
Tandil	1ª	264.269	100	100	100	100	100	100
	2ª	404.188	83	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	1ª	160.410	100	100	100	100	100	100
	2ª	295.287	97	97	98	100	100	100
25 de Mayo	1ª	299.494	100	100	100	100	100	100
	2ª	144.284	90	95	100	100	100	100
BUENOS AIRES		5.509.549	97	99	99,9	100	100	100
24/25		5.487.037	97	99	99,9	99,96	100	100
Laboulaye	1ª	478.986	100	100	100	100	100	100
	2ª	105.143	95	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	1ª	631.700	100	100	100	100	100	100
	2ª	299.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	1ª	886.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	70.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	1ª	885.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	218.000	89	99,5	100	100	100	100
Villa María	1ª	582.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	231.200	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		4.388.529	99	99,98	100	100	100	100
24/25		4.614.734	99	99,81	99,99	100	100	100
Paraná	1ª	168.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	215.050	97	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	1ª	333.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	450.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS		1.166.050	99,5	99,9	100	100	100	100
24/25		1.251.450	100	100	100	100	100	100

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	330.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	39.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	6.700	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	449.000	100	100	100	100	100	100
	24/25	406.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	185.700	20,0	60,1	79,3	89,4	99	100
	2ª	77.400	25	39	76	87	99	100
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	466.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	369.700	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	3.154.700	93	96	98	99	99,9	100
	24/25	3.389.223	98	99	100	100	100	100
CATAMARCA	1ª	20.600	83	100	100	100	100	100
	2ª	19.200	80	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200	82	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	1ª	190.000	17	34	56	74	91	94
	2ª	105.000	29	47	71	97	99	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	199.200	54	57	62	67	81	81
	2ª	98.100	54	56	61	66	81	81
FORMOSA	1ª	18.000	45	55	60	70	90	95
	2ª	4.000	52	57	62	77	95	100
JUJUY	1ª	3.053	15	30	70	100	100	100
	2ª	4.205	15	30	64	100	100	100
MISIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120	45	55	67	91	100	100
	2ª	26.068	48	60	75	100	100	100
SAN LUIS	1ª	212.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	2.300	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870	86	93	100	100	100	100
	2ª	131.820	77	92	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800	71	71	100	100	100	100
	2ª	268.500	65	65	89	90	100	100
TUCUMÁN	1ª	103.400	79	100	100	100	100	100
	2ª	78.300	74	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	17.414.164	92	95	98	99	99,5	99,6
	24/25	17.994.965	96	98	99	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	08/01 %	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %
Bahía Blanca		14.700	100	100	100	100	100	100
Bolívar		3.350	99	100	100	100	100	100
Bragado		1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		900	100	100	100	100	100	100
Junín		7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata		14.500	100	100	100	100	100	100
Lincoln		25.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino		10.500	100	100	100	100	100	100
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló		8.100	96	98	100	100	100	100
Tandil		4.300	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		5.325	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo		7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	115.049	99,7	99,9	100	100	100	100
	24/25	116.248	100	100	100	100	100	100
Laboulaye		10.478	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		24.800	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco		85.000	100	100	100	100	100	100
Villa María		34.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	171.678	100	100	100	100	100	100
	24/25	191.632	99	100	100	100	100	100
Paraná		35.500	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		43.000	99	99	99	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	99	99	99	100	100	100
	24/25	108.500	99	100	100	100	100	100
General Pico		12.900	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.500	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	27.400	100	100	100	100	100	100
	24/25	26.390	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		52.000	37	37	37	65	67	83
Cañada de Gómez		12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	152.300	78	78	78	88	89	94
	24/25	222.702	90	92	97	98	99	100
CATAMARCA		1.500	71	100	100	100	100	100
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		45.000	28	33	46	54	76	77
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		46.300	34	47	47	52	65	65
FORMOSA		32.000	25	45	50	57	68	68
JUJUY		2.252		5	40	60	80	100
SALTA		35.465	11	31	45	71	89	100
SAN LUIS		23.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		73.300	31	53	81	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		83.560	31	31	73	90	100	100
TUCUMÁN		14.200	40	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	908.324	70	75	83	90	94	95
	24/25	1.005.799	81	85	88	93	96	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/01 %	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		5.900								
Bolívar		85.648								
Bragado		9.920								
General Madariaga		89.100								
Junín		6.350								
La Plata		18.000								
Lincoln		70.500								
Pehuajó		102.259								
Pergamino		6.000								
Pigüé		90.000								
Saliqueló		171.000								
Tandil		213.321								
Tres Arroyos		304.339								
25 de Mayo		61.455								
BUENOS AIRES	25/26	1.233.792	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25	1.173.852	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye		106.390								
Marcos Juárez		49.300					3	20	900	9.680
Río Cuarto		19.000								
San Francisco		90.000						27		24.669
Villa María		28.350								
CÓRDOBA	25/26	293.040	0	0	0	0	1	11,8	900	34.349
	24/25	277.203	0	0	0	0	0	4		
Paraná		13.020			6	17	40	67		8.725
Rosario del Tala		18.000			10	30	60	75	960	12.771
ENTRE RÍOS	25/26	31.020	0	0	8	24	51	72	960	21.496
	24/25	27.320	0	9	28	42	58	64		
General Pico		190.000								
Santa Rosa		120.000								
LA PAMPA	25/26	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25	290.900	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		254.200	20	58	63	83	82	100	4.260	249.940
Cañada de Gómez		17.000					22	47		7.920
Casilda		8.000								
Rafaela		192.600		4	13	42	81	97		186.244
Venado Tuerto		2.800								
SANTA FE	25/26	474.600	10	29	39	61	77	94	4.260	444.104
	24/25	341.647	17	29	36	46	58	75		
CATAMARCA		100								
CORRIENTES		1.650					30	69		1.145
CHACO (Charata)		225.000	28	44	83	97	100	100	1.900	223.100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		191.550	62	72	76	86	94	100		191.550
FORMOSA		2.900		50	65	90	100	100		2.900
SALTA		530								
SAN LUIS		119.150								
STGO. ESTERO		5.200								
STGO. ESTERO (Quimili)		118.004	7	25	45	70	91	99		116.376
TUCUMÁN		250								
TOTAL PAÍS	25/26	3.006.786	8	15	19	25	30	35	8.020	1.035.020
	24/25	2.413.081	6	9	11	13	15	18		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/02/2026 al 12/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	4	96	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	25	75	-	50	40	10	-	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	47	53	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	24	76	-	-	100	-	-	A
	PEHUJÓ	-	-	-	100	-	73	27	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	49	51	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	R
	SALLIQUELÓ	-	-	20	80	-	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	35	65	-	2	83	15	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	92	8	-	-	48	52	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	40	60	-	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	90	10	20	65	13	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	65	35	2	94	4	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	73	27	-	R
	SAN FRANCISCO	-	-	-	51	49	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	40	55	5	-	R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	91	9	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	-	86	14	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	-	50	50	-	A/R
	CASILDA	-	-	-	2	98	72	28	-	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	-	-	-	100	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	19	81	-	92	8	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	46	38	14	2	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	58	42	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	53	47	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	82	18	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/02/2026 al 12/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	16	54	30	-	-	89	11	-	A/PS/S
	BOLÍVAR	-	7	45	48	-	21	45	26	9	R/PS/S
	BRAGADO	-	14	56	30	-	-	100	10	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A/R
	JUNÍN	-	10	30	60	-	17	83	-	-	A/R
	LA PLATA	-	40	60	-	-	18	82	-	-	A/R
	LINCOLN	-	13	23	64	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	10	10	80	-	39	45	16	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	37	-	25	37	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	50	50	-	25	50	25	-	S
	SALLIQUELÓ	-	-	30	70	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	8	62	30	-	1	76	23	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	59	41	-	-	-	45	55	-	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	10	50	40	-	40	60	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	20	50	30	-	25	60	12	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	2	87	11	1	85	13	-	A/R/PS
	RÍO CUARTO	-	27	37	17	20	-	42	30	28	A/R
	SAN FRANCISCO	-	36	25	36	2	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	11	57	31	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	11	-	1	87	-	100	-	-	A/R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	8	-	-	92	8	75	17	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	40	20	40	-	-	80	20	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	36	17	46	-	-	100	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	8	64	-	2	26	14	35	25	26	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	10	-	22	68	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	18	5	-	77	4	49	29	18	A/R/PS
	RAFAELA	-	16	-	28	56	66	34	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	95	5	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	1	1	25	73	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	23	47	5	13	12	-	90	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	7	93	-	-	-	-	100	-	-	A/E/R
JUJUY	JUJUY	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	20	50	20	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	58	22	21	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	2	98	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/02/2026 al 12/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	6	80	14	-	29	57	13	1	-	93	7	-	-	15	50	30	5	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	90	10	-	-	80	20	-	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	82	8	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	JUNÍN	-	-	70	30	-	12	88	1	-	-	50	50	-	-	2	89	9	-	A/R
	LA PLATA	-	10	80	10	-	-	95	5	-	-	100	-	-	-	-	99	1	-	A/R
	LINCOLN	-	-	70	30	-	-	100	-	-	-	32	68	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	31	69	-	42	46	12	-	-	-	83	17	-	-	90	10	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	46	54	-	-	100	-	-	-	68	32	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	50	50	-	25	50	25	-	-	-	50	50	-	-	80	20	-	PS
	SALLIQUELÓ	-	26	68	6	-	-	93	7	-	-	34	57	9	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	17	71	12	-	-	72	28	-	-	100	-	-	-	-	42	58	-	A/R/PS/S
	TRES ARROYOS	-	17	82	1	-	-	63	37	-	-	100	-	-	-	-	5	95	-	PS
25 DE MAYO	-	5	75	20	-	-	95	5	-	-	100	-	-	-	-	85	15	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	30	60	10	-	25	63	10	2	-	100	-	-	-	20	60	15	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	-	90	10	-	-	-	100	-	-	-	74	11	15	R/PS/S
	RÍO CUARTO	-	-	50	50	-	-	45	39	16	-	50	50	-	-	-	40	31	28	A/R
	SAN FRANCISCO	-	31	35	35	-	-	73	27	-	-	74	26	-	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	12	58	30	-	-	100	-	-	-	47	53	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	3	79	18	-	-	81	19	-	-	100	0	-	-	-	68	29	3	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	70	30	-	-	70	30	-	-	60	40	-	-	-	60	40	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	75	25	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	28	47	25	-	10	40	38	12	-	30	36	34	-	-	33	40	27	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	32	68	-	80	20	-	-	A/R
	CASILDA	-	-	-	100	-	-	46	38	16	-	65	35	-	-	-	-	66	34	R/PS/S
	RAFAELA	-	-	8	92	-	64	36	-	-	-	38	50	12	-	40	60	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	-	-	99	1	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	47	53	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	33	67	-	-	-	83	17	-	-	8	92	-	-	-	74	26	-	-	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	15	85	-	-	-	-	100	-	-	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	90	10	-	-	-	100	-	-	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/02/2026 al 12/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	30	70	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	45	55	-	-	-	100	-	-	-	42	58	-	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	98	2	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	50	50	-	-	-	100	-	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

