

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

19 de febrero de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 19 de febrero de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 19/02/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados del periodo (09/02 al 17/02) se registraron en el centro de Santa Fe, sur de Corrientes y norte de Entre Ríos. Algunos registros de esta zona son: 165mm en Monte Caseros (Corrientes), 156mm en Sunchales (Santa Fe) y 126mm en Colón (Entre Ríos). En el sur de Buenos Aires se reportaron más de 20mm, con un máximo de 55mm en Pigüé. También se registraron 34mm en Coronel Suárez, Benito Juárez y Mar del Plata.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 12/02/2026 al 19/02/2026

En el norte y centro del país se espera alta inestabilidad durante la semana, lo que iría posibilitando la ocurrencia de lluvias en dicha zona. En el NOA, entre jueves y lunes de la próxima semana se esperan acumulados de diversa intensidad. Durante el jueves, el sábado y el lunes podrían darse lluvias de diversa intensidad en la zona central, principalmente en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el NEA se prevén precipitaciones, también de diversa intensidad, durante el jueves y entre domingo y lunes de la próxima semana. Entre jueves y viernes podrían darse precipitaciones en localidades de Santa Cruz.



TEMPERATURAS

La temperatura media del periodo analizado (09/02 al 17/02) resultó superior a la normal en el norte del país e inferior en la cordillera patagónica central. En Chaco, Formosa y este de Salta las máximas superaron los 40°C, con un máximo de 43°C en Rivadavia (Salta). Hubo registros inferiores a 3°C en la cordillera patagónica y Tierra del Fuego, con un mínimo de -2°C en Río Grande.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 12/02/2026 al 19/02/2026

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por encima de lo normal a normal en todo el país. El ingreso de un sistema frontal durante el jueves hará que disminuyan las temperaturas levemente durante el viernes, principalmente en la zona central. El resto de los días se mantendrán temperaturas cálidas en todo el país. Durante el jueves varias localidades del NOA y NEA podrían tener máximas sobre 35°C e incluso algunas sobre 40°C. Entre sábado y martes de la próxima semana también varias localidades de NOA y NEA tendrían registros de máximas sobre 35°C. En Patagonia durante el sábado y lunes próximo podrían registrarse máximas sobre 35°C en Neuquén y Río Negro, mientras que desde Chubut hasta el norte de Patagonia se podrían dar máximas sobre 30°C.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En Buenos Aires y La Pampa se mantienen las condiciones hídricas deficitarias, a pesar de las lluvias recibidas. Al área clasificada con déficit hídrico se agrega el noreste de La Pampa.

En el centro de Santa Fe, sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, zona favorecida con mayores lluvias, se observan importantes recargas. No se estiman excesos dado el bajo nivel de los almacenajes precedentes.

En el NOA las precipitaciones fueron menores que en semanas anteriores, por lo cual el modelo estimó una disminución en el área afectada por excesos hídricos. Actualmente predominan las reservas adecuadas a óptimas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En el norte de Santa Fe, los lotes se encuentran entre floración y llenado de cápsulas, con estado general de bueno a regular, evidenciando baja turgencia, caída de hojas y pérdida parcial de carga; las precipitaciones recientes fueron dispares y permitirán cierta recuperación en algunos sectores, estimándose el inicio de cosecha hacia mediados de marzo. En Roque Sáenz Peña, el cultivo transita fases reproductivas bajo un contexto de sequía y altas temperaturas que impacta en su condición. En el ámbito de la delegación Santiago del Estero, los lotes están totalmente implantados y en crecimiento activo, con algunos cuadros en floración y evolución normal, aunque en el área de Quimilí se registró una reducción de superficie respecto a la campaña anterior por factores comerciales y demoras en la siembra. Por su parte, en Salta el cultivo continúa su desarrollo sin mayores inconvenientes.

ARROZ

En Avellaneda, los lotes más avanzados se encuentran en madurez fisiológica y el resto en llenado de granos, con cosecha en marcha del tipo largo fino, aunque las precipitaciones recientes generan interrupciones. Se proyectan rendimientos normales, aunque inferiores a los de la campaña pasada debido a la menor insolación. En Rafaela, los cuadros transitan llenado y comienzo de madurez en muy buenas condiciones sanitarias, sin presencia relevante de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



El cultivo muestra en general una evolución favorable, con la mayoría de los lotes entre fin de floración, llenado de grano e incluso inicio de madurez en las siembras más tempranas, algunas ya próximas a cosecha. El estado general se ubica entre bueno y muy bueno, con adecuada sanidad y sin problemas relevantes de plagas, enfermedades o malezas. Si bien en ciertos sectores se observan síntomas de estrés hídrico y rendimientos que podrían ubicarse levemente por debajo de lo normal, el cultivo ha demostrado buena



estabilidad frente a las condiciones climáticas adversas del verano. En varios casos se esperan rindes acordes a los promedios históricos, e incluso superiores en algunas zonas.



El cultivo transita etapas finales del ciclo, con la mayor parte del área finalizando el llenado y los lotes más adelantados en madurez fisiológica, o ya cosechados. La recolección avanza con resultados iniciales satisfactorios, registrando rindes mayormente entre 25 y 30 qq/ha, con picos superiores en algunos sectores y manteniendo una buena condición general.



En Santa Rosa, las lluvias acumuladas desde la primavera favorecieron la recarga del perfil y sostienen una adecuada disponibilidad de humedad. Los lotes se encuentran entre R6 y R7, en buen estado general y sin presencia de isocas defoliadoras.



En Cañada de Gómez las precipitaciones frenaron las tareas de cosecha, mientras que en Rafaela queda un bajo porcentaje por trillar en una campaña que se caracteriza por muy buenos rendimientos, con promedios de 20 a 30 qq/ha y picos de hasta 40 qq/ha, superando los valores históricos de la zona.



En la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra totalmente implantado, en crecimiento activo y con algunos lotes en floración, manteniendo un desarrollo normal. En Quimilí, la cosecha finalizó, aunque en algunos casos se vio demorada por lluvias recurrentes. Se registró un incremento significativo del área sembrada respecto de campañas anteriores, especialmente en los departamentos Moreno, Alberdi y norte de Juan F. Ibarra,

mientras que en el sur de la delegación la superficie también resultó levemente superior. Los rindes fueron variables según las precipitaciones recibidas en etapas críticas, con promedios estimados entre 18 y 22 qq/ha, considerados muy buenos para la región.

MAÍZ



En el norte bonaerense, el maíz temprano transita el llenado de grano con una condición que va de buena a regular, mostrando en algunos sectores una merma en el potencial de rendimiento asociada a la falta de precipitaciones durante floración y llenado, lo que podría profundizarse de no concretarse lluvias en el corto plazo. Los planteos tardíos y de segunda se encuentran mayormente en estadios vegetativos a inicio de floración, con situaciones contrastantes. Mientras en áreas como Lincoln y Pergamino disponen de adecuada humedad y buen estado general, en el ámbito de Bragado evidencian mayor dependencia de nuevas precipitaciones, aunque mantienen posibilidades de recuperación. No se reportan problemas sanitarios de relevancia y se destaca un incremento del área de maíces tardíos y de segunda respecto de la campaña previa.

En el centro oeste, el cultivo continúa condicionado por la disponibilidad hídrica. En Pehuajó no se registraron precipitaciones y las reservas se mantienen entre adecuadas y regulares, con sectores que comienzan a demandar lluvias en el corto plazo, aunque los lotes más afectados por el déficit de enero aún podrían recomponerse si se concretan aportes antes del período crítico; en Bolívar, en tanto, las precipitaciones resultaron insuficientes frente al escenario de sequía, observándose maíces tempranos entre regulares y buenos, con algunos cuadros muy buenos que han llegado a napa, mientras que los tardíos presentan mayor heterogeneidad y afectación según ambiente y disponibilidad de agua.

Al centro sur y este, el cereal transita estadios de floración y llenado bajo un escenario de elevada demanda atmosférica y retroceso de las reservas hídricas. En Tandil, los planteos tempranos atravesaron el período crítico con reservas iniciales aceptables, aunque la falta de lluvias en enero y febrero podría traducirse en mermas de rendimiento. En La Plata, las precipitaciones recientes aportaron alivio, pero no alcanzan a revertir el déficit acumulado; allí, los maíces tempranos se ubican entre floración y llenado, mientras que los tardíos, en floración, muestran mejor condición relativa. En Gral. Madariaga, la baja humedad edáfica condiciona el estado general, con lotes tempranos heterogéneos tras transitar el período crítico con escasa agua y tardíos entre fin de vegetativo e inicio de floración.

Hacia el sudeste, en el área de Saliqueló, los lotes se ubican entre



adecuados y regulares, con afectación por las altas temperaturas y la falta de lluvias de enero, aunque con posibilidades de recuperación si se concretan nuevas precipitaciones. En Pigüé, el cultivo transita el llenado sin mayores inconvenientes, favorecidos por lluvias intermitentes. En Bahía Blanca, en cambio, las precipitaciones resultaron insuficientes para recomponer los perfiles, manteniéndose el estrés hídrico en seco; el estado varía de bueno bajo riego a regular en seco, con estadios entre fin de floración y llenado. No se manifiestan problemas sanitarios de relevancia.



En el norte de la provincia, los planteos tempranos se ubican mayormente entre grano lechoso y pastoso, en excelentes condiciones, mientras que los tardíos avanzan en estadios vegetativos con buen desarrollo, realizándose fertilizaciones y monitoreos frecuentes ante la presencia de D. maidis.

En el centro-sur, los lotes tempranos de Laboulaye, se encuentran entre inicio de madurez y madurez fisiológica, con expectativas de mermas respecto de los rindes inicialmente estimados y con el picado para silaje finalizado, en tanto los tardíos y de segunda, salvo los sembrados hacia fines de enero, transitan floración y grano lechoso, mostrando mejor condición relativa que los tempranos. En Río Cuarto, los maíces tempranos se encuentran muy afectados y se estiman rindes bajos, mientras que los tardíos, desperejados, atraviesan floración e inicio de llenado, dependiendo de nuevas precipitaciones para sostener su potencial. En Marcos Juárez comenzó la cosecha de los lotes adelantados por estrés hídrico y térmico, con rindes en torno a los 85 qq/ha.



El cultivo transita mayormente estadios vegetativos con una evolución general aceptable en el área de Charata, aunque el calor extremo y la limitada humedad superficial comienzan a condicionar los cuadros más recientes, cuyo desempeño dependerá de las reservas hídricas del perfil. En la delegación Roque Sáenz Peña, la siembra avanza sobre el 40 % de la intención y, enfrenta un escenario de sequía y altas temperaturas que afecta de manera significativa la condición de los lotes.



ENTRE RÍOS

En la delegación Paraná, las lluvias registradas permitieron recomponer los perfiles hídricos, favoreciendo el avance de la cosecha de maíz de primera, que alcanza el 80 %. El maíz de segunda transita estadios vegetativos y R1, con presencia generalizada de chicharrita en la provincia.



SAN LUIS

La siembra se encuentra finalizada a nivel provincial y continúan las aplicaciones para el control de malezas. Las precipitaciones registradas brindaron alivio al cultivo, que requería lluvias urgentes, aunque en algunas zonas se reportaron episodios de granizo cuyos daños deberán evaluarse. Persisten sectores con humedad edáfica comprometida que afectan la condición del cultivo.



LA PAMPA

En la delegación Santa Rosa, los maíces tempranos se encuentran mayormente en R4/R5 y en buen estado, favorecidos por temperaturas moderadas y precipitaciones recientes, con humedad del suelo entre regular y adecuada. Los tardíos de primera transitan R1/R2 también en buena condición, mientras que los de segunda sobre rastrojo de fina se ubican entre V6/V8 con estado regular.



SANTA FE

En la delegación Avellaneda los maíces de primera presentan muy buen estado en el sector este y más ajustados hacia el oeste, con cuadros regulares a malos; la cosecha avanza en los lotes con humedad adecuada, mientras otros aguardan el secado del grano. El maíz de segunda, con la siembra finalizada, se encuentra condicionado por el estrés hídrico-térmico.

En el centro-sur provincial, el escenario es heterogéneo. Rafaela muestra los mejores resultados, con rindes de 85 a 110 qq/ha e incluso picos de 125

qq/ha en maíces tempranos, aunque las lluvias interrumpieron transitoriamente la cosecha; los tardíos y de segunda evidencian buena respuesta a las precipitaciones y continúan bajo monitoreo por *Dalbulus maidis*. En Casilda comenzaron las labores de trilla con rindes de 90–100 qq/ha en los mejores ambientes y valores cercanos a 60 qq/ha en zonas más afectadas por la sequía, mientras que el maíz de segunda recibió lluvias favorables, aunque registra pérdidas irreversibles y daños aislados por cogollero y barrenador. Cañada de Gómez cuenta con lotes en madurez comercial a la espera de condiciones para cosecha, estimándose su finalización hacia fin de mes, en tanto que en Venado Tuerto avanzan los picados para forraje y los planteos tempranos destinados a grano sostienen un llenado aceptable pese a la restricción hídrica.



En el área de Quimilí, la siembra se encuentra finalizada y los lotes presentan buen desarrollo general, con nacimientos adecuados y crecimiento activo favorecido por la buena humedad de los suelos. Luego de un período de estrés hídrico y altas temperaturas, la condición del cultivo mejoró en las últimas semanas, registrándose únicamente casos puntuales de resiembra por planchado tras lluvias intensas. En la delegación Santiago del Estero, los suelos se encuentran con buena humedad, están en crecimiento activo el 100 % de los lotes.



En el NOA, el cereal evoluciona en general bajo condiciones favorables. En Jujuy, la mayoría de los lotes continúa en crecimiento con adecuada disponibilidad de humedad, lo que permite proyectar rindes de buenos a muy buenos si el escenario climático se mantiene estable. Con la siembra concluida en Salta, el cultivo avanza en pleno desarrollo vegetativo. En Tucumán, los planteos tempranos presentan poblaciones estables de chicharrita, aunque se detectan algunos daños por *Spiroplasma* en ciertos lotes.

MANÍ

En Buenos y Córdoba el cultivo transita etapas reproductivas, desde floración hasta clavo y comienzo de llenado, con buen desarrollo y adecuada sanidad, aunque en sectores de loma se observan pérdidas puntuales por falta de humedad y se proyectan mermas respecto a la campaña anterior. En el



norte del país, las lluvias recientes en Jujuy resultaron oportunas al acompañar el inicio de la floración, mientras que en Salta el cultivo avanza sin mayores inconvenientes. En términos generales, no se reportan problemas sanitarios de relevancia.

POROTO

En Jujuy, se esperan nuevas lluvias que permitirán acelerar la siembra de las distintas variedades. En Salta, la implantación comenzó, inicialmente con mung, y se prevé que en las próximas semanas se incorporen otros, principalmente en las zonas de Rosario y Metán. En Tucumán, las labores de siembra han finalizado, mientras que en Santiago del Estero el proceso se encuentra completo, con los lotes en pleno crecimiento y con evolución favorable.

SOJA



La soja de primera se encuentra mayormente entre etapas reproductivas y llenado, con condición entre buena y regular, según zona y disponibilidad hídrica. En el norte se observan buenos desarrollos, aunque el déficit de lluvias y las altas temperaturas podrían afectar el potencial, mientras que en el oeste y sudeste la situación es más heterogénea y dependiente de nuevas precipitaciones.

La soja de segunda presenta un escenario más ajustado, con muchos lotes que atraviesan estadios vegetativos con escaso desarrollo y fuerte dependencia de lluvias para sostener su evolución, aunque en sectores puntuales del norte se registra una recuperación reciente y mejor condición en floración.



En Laboulaye, los lotes de primera muestran buen desarrollo foliar y adecuada densidad, con más de la mitad del área en pleno llenado de granos, mientras que los planteos de segunda evolucionan entre floración e inicio de formación de vainas, favorecidos por las lluvias recientes. La situación es más ajustada en Río Cuarto, donde se observan manchones y pérdidas de flores y chauchas que condicionan el rendimiento, especialmente en sojas de segunda, que además registraron pérdida de plantas y dependen de nuevas

precipitaciones para mejorar su estado. En San Francisco, los cuadros de primera avanzan entre R5 y R6 con surco cerrado y los de segunda transitan la floración, aunque con presencia de yuyo colorado resistente y bajo monitoreo por isocas defoliadoras.



En el ámbito de Roque Sáenz Peña, el cultivo alcanza un 90 % de la superficie prevista, pero atraviesa una situación muy comprometida debido a la sequía extrema, las altas temperaturas y la intensa insolación de las últimas semanas. Estas condiciones están afectando seriamente a los lotes, con daños que en algunos casos ya se consideran irreversibles.



En Paraná, la soja de primera y segunda presenta buen estado general, el cultivo logró atravesar el período crítico con el aporte oportuno de lluvias, que resultaron beneficiosas para su evolución.



En el área de Santa Rosa, la soja de primera transita entre R2 y R4 según el grado de avance, mientras que la de segunda se encuentra en estadios vegetativos avanzados (V8–V10). Las lluvias de enero y febrero favorecieron el desarrollo del cultivo, que presenta buen estado general y humedad del suelo entre regular y adecuada, con controles efectivos de arañuela e isocas defoliadoras.



La soja de primera se encuentra mayormente en etapas de llenado (R3 a R6), con situaciones contrastantes según zona. En el centro-sur, las recientes lluvias resultaron favorables para sostener el llenado y transitar el período crítico, aunque en áreas como Casilda y Venado Tuerto el déficit hídrico previo provocó recortes importantes en el rendimiento potencial. En Rafaela, pese al estrés térmico, la buena disponibilidad de agua permite proyectar rindes

aceptables. En el norte provincial, el cultivo muestra mayor irregularidad, con lotes afectados por falta de agua y estrés térmico, y una recuperación aún incierta por la distribución dispar de las lluvias.

La soja de segunda atraviesa en su mayoría estadios entre floración y formación de vainas, con algunos lotes aún vegetativos. Las precipitaciones recientes fueron claves para frenar pérdidas y mejorar el estado general, aunque en amplias zonas los daños por sequía y la irregularidad en las lluvias condicionan el potencial. Se registran tratamientos sanitarios de fin de ciclo y, en algunos sectores, problemas puntuales de malezas, variación de altura de plantas y manchoneos.



En la delegación Santiago del Estero, los primeros lotes implantados avanzan en floración, mientras que el resto transita etapas vegetativas con buena humedad en el perfil. En el área de Quimilí, la siembra se vio demorada por falta de piso debido a las lluvias, pero los lotes presentan buen estado general, con la mayoría en crecimiento vegetativo y los más adelantados iniciando floración.



Las recientes precipitaciones en Jujuy recargaron el perfil justo al inicio de la floración, manteniendo el cultivo en buena condición. En Salta, tras concluir la siembra, las lluvias generalizadas, especialmente en el departamento Anta, sostienen una adecuada humedad y favorecen el crecimiento. Mientras tanto, en Tucumán los lotes muestran muy buen desarrollo, con cuadros en floración avanzada y comienzo de llenado de granos.

SORGO GRANÍFERO


En Buenos Aires, los lotes tempranos están prácticamente listos para cosecha, con rindes dentro de lo esperado, mientras que los tardíos inician floración con buena humedad. En Córdoba, el cultivo presenta estado aceptable a bueno, con cuadros tempranos entre grano lechoso y pastoso y una proporción significativa en llenado, sin plagas de consideración. Santa Fe muestra un panorama heterogéneo, en Avellaneda, los lotes de primera varían entre regulares y buenos, muchos destinados a picado con rindes bajos; en



Cañada de Gómez avanzan en llenado sin inconvenientes sanitarios; y en Rafaela evolucionan entre floración y llenado en condiciones muy buenas a excelentes, favorecidos por las precipitaciones. En Jujuy, Salta y Santiago del Estero crece con buena humedad y evolución favorable, aunque algo más retrasado respecto al maíz; Chaco no reporta novedades relevantes, mientras que en Entre Ríos la cosecha aún no comenzó y algunos lotes se destinaron a picado para consumo animal.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %
Bahía Blanca	22.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	179.750	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	154.000	100	100	100	100	100	100
Junín	189.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	63.700	100	100	100	100	100	100
Lincoln	320.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	352.992	100	100	100	100	100	100
Pergamino	160.418	100	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	326.354	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	414.514	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	167.871	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	3.113.699	100	100	100	100	100	100
24/25	3.130.724	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	546.856	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	460.500	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	561.000	99	100	100	100	100	100
Villa María	440.000	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	2.908.356	100	100	100	100	100	100
24/25	2.563.297	99	100	100	100	100	100
Paraná	114.150	99	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	425.000	98	98	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	539.150	98	98	100	100	100	100
24/25	359.700	99	100	100	100	100	100
General Pico	525.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	100	100	100	100	100	100
24/25	706.000	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	144.280	42	61	78	87	96	100
Cañada de Gómez	290.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	159.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	362.400	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	235.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.191.180	93	95	97	98	100	100
24/25	781.643	97	99	99,6	99,6	100	100
CATAMARCA	14.100	66	80	88	95	95	100
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	111.000	27	41	52	71	84	93
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.690	26	28	31	41	41	41
FORMOSA	36.000	30	35	40	45	45	52
JUJUY	7.598	15	50	80	100	100	100
MISIONES	33.000	95	100	100	100	100	100
SALTA	285.191	41	55	76	89	100	100
SAN LUIS	469.200	98	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	155.125	59	85	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	65	86	90	100	100	100
TUCUMÁN	74.230	59	80	85	95	96	100
TOTAL PAÍS 25/26	10.443.939	92	95	97	98	98,7	98,9
24/25	9.234.043	93	94	96	98	99	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %
General Pico	1ª	330.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	39.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	6.700	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA		449.000	100	100	100	100	100	100
	25/26							
	24/25	406.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	177.100	60,1	79,3	89,4	99	100	100
	2ª	66.900	39	76	87	99	100	100
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	466.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	369.700	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		3.135.600	96	98	99	99,9	100	100
	25/26							
	24/25	3.389.223	99	100	100	100	100	100
CATAMARCA	1ª	20.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	19.200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	1ª	195.000	34	56	74	91	95	100
	2ª	105.000	47	71	97	99	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	170.000	57	62	67	81	81	94
	2ª	98.100	56	61	66	81	81	81
FORMOSA	1ª	18.000	55	60	70	90	95	100
	2ª	4.000	57	62	77	95	100	100
JUJUY	1ª	3.053	30	70	100	100	100	100
	2ª	4.205	30	64	100	100	100	100
MISIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120	55	67	91	100	100	100
	2ª	26.068	60	75	100	100	100	100
SAN LUIS	1ª	212.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	2.300	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870	93	100	100	100	100	100
	2ª	131.820	92	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	807.550	71	100	100	100	100	100
	2ª	268.500	65	89	90	100	100	100
TUCUMÁN	1ª	103.400	100	100	100	100	100	100
	2ª	78.300	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS		17.333.626	95	98	99	99,5	99,6	99,8
	25/26							
	24/25	17.994.965	98	99	100	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %
Bahía Blanca		14.700	100	100	100	100	100	100
Bolívar		3.350	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		900	100	100	100	100	100	100
Junín		7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata		14.500	100	100	100	100	100	100
Lincoln		25.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino		10.500	100	100	100	100	100	100
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló		8.100	98	100	100	100	100	100
Tandil		4.300	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		5.325	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo		7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	115.049	99,9	100	100	100	100	100
	24/25	116.248	100	100	100	100	100	100
Laboulaye		10.478	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		24.800	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco		85.000	100	100	100	100	100	100
Villa María		34.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	171.678	100	100	100	100	100	100
	24/25	191.632	100	100	100	100	100	100
Paraná		35.500	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		43.000	99	99	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	99	99	100	100	100	100
	24/25	108.500	100	100	100	100	100	100
General Pico		12.900	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.500	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	27.400	100	100	100	100	100	100
	24/25	26.390	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		52.000	37	37	65	67	83	100
Cañada de Gómez		12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	152.300	78	78	88	89	94	100
	24/25	222.702	92	97	98	99	100	100
CATAMARCA		1.500	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		45.000	33	46	54	76	77	94
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		46.300	47	47	52	65	65	65
FORMOSA		32.000	45	50	57	68	68	75
JUJUY		2.252	5	40	60	80	100	100
SALTA		35.465	31	45	71	89	100	100
SAN LUIS		23.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		73.300	53	81	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		83.560	31	73	90	100	100	100
TUCUMÁN		14.200	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	908.324	75	83	90	94	95	97
	24/25	1.005.799	85	88	93	96	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	11.000			8	8	14	21		2.314
	LF	77.800			10	10	15	22		16.976
T. CORRIENTES		88.800	0	0	10	10	15	22	0	19.290
R. S. Peña		6.500								
T. CHACO		6.500	0	0	0	0	0	0	0	
PARANA	LA	2.900								
	LF	22.650								
T. PARANÁ		25.550	0	0	0	0	0	0		
R. DEL TALA	LA	5.000								
	LF	25.000								
T. R.DEL TALA		30.000	0	0	0	0	0	0		
T. ENTRE RÍOS		55.550							0	
FORMOSA		14.400								
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	0	0	0	
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	15.000					1	10		1.500
T. AVELLANEDA		16.500					1	9		1.500
RAFAELA	LA	350								
	LF	14.300								
T. RAFAELA		14.650	0	0	0	0	0	0		
T. SANTA FE		31.150	0	0	0	0	0	5	0	1.500
TOTAL PAÍS	LA	20.750								2.314
	LF	175.650								18.476
TOTAL PAÍS		196.400							0	20.790
		25/26		0	4	4	7	11		
		24/25		8	13	16	21	25		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/01 %	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		5.900								
Bolívar		85.648								
Bragado		9.920								
General Madariaga		89.100								
Junín		6.350								
La Plata		18.000								
Lincoln		70.500								
Pehuajó		102.259								
Pergamino		6.000								
Pigüé		90.000								
Salliqueló		171.000								
Tandil		186.555								
Tres Arroyos		341.031								
25 de Mayo		61.455								
BUENOS AIRES	25/26 24/25	1.243.718 1.173.852	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Laboulaye		103.615								
Marcos Juárez		47.500				3	20	26	900	11.902
Río Cuarto		19.000								0
San Francisco		58.450					27	38		22.047
Villa María		28.350								
CÓRDOBA	25/26 24/25	256.915 277.203	0 0	0 0	0 0	1 0	10 4	13 7	900	33.949
Paraná		13.400		6	17	40	67	75		10.050
Rosario del Tala		18.000		10	30	60	75	82		14.760
ENTRE RÍOS	25/26 24/25	31.400 27.320	0 5	8 17	24 21	51 26	72 52	79 85	0	24.810
General Pico		190.000								
Santa Rosa		120.000								
LA PAMPA	25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Avellaneda		285.200	58	63	83	82	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez		17.000				22	47	64		10.870
Casilda		8.000								0
Rafaela		192.600	4	13	42	81	97	98		187.920
Venado Tuerto		2.800								0
SANTA FE	25/26 24/25	505.600 341.647	34 29	40 51	63 48	78 60	95 76	96 79	5.060	478.930
CATAMARCA		100								
CORRIENTES		1.650				30	69	83		1.370
CHACO (Charata)		268.600	58	83	97	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		229.500	72	76	86	94	100	100		229.500
FORMOSA		2.900	50	65	90	100	100	100		2.900
SALTA		710								
SAN LUIS		119.150								
STGO. ESTERO		5.200								
STGO. ESTERO (Quimili)		118.004	25	45	70	91	99	100		118.004
TUCUMÁN		250								
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	3.093.697 2.413.081	15 9	19 11	25 13	30 15	35 18	38 19	9.960	1.154.063


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/02/2026 al 19/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	5	95	-	50	40	10	-	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	34	66	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	1	92	7	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	73	27	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	S
	SALLIQUELÓ	-	-	10	90	-	-	95	5	-	A/PS
	TANDIL	-	1	15	83	-	3	85	12	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	6	94	-	-	48	52	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	15	85	-	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	80	20	20	65	13	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	60	40	2	94	4	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	73	27	-	R
	SAN FRANCISCO	-	-	-	42	58	-	85	15	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	28	72	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	40	55	5	-	R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	91	9	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	-	39	61	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	73	28	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	100	64	36	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	7	9303	-	92	8	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	27	30	43	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	23	77	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/02/2026 al 19/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	20	80	-	-	89	11	-	A/PS/S
	BOLÍVAR	-	5	45	50	-	21	45	25	9	R/PS/S
	BRAGADO	-	17	23	60	-	-	80	20	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	12	57	31	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	5	35	60	-	17	83	-	-	A/R
	LA PLATA	-	40	60	-	-	17	83	-	-	A/R
	LINCOLN	-	7	19	74	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	10	80	-	39	45	16	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	37	-	25	37	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	50	50	-	25	50	25	-	S
	SALLIQUELÓ	-	-	20	80	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	7	44	48	-	1	77	22	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	59	41	-	-	-	45	55	-	PS
	25 DE MAYO	-	5	45	50	-	40	60	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	10	60	25	5	25	60	12	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	2	87	11	1	85	13	-	R/PS
	RÍO CUARTO	-	10	50	20	20	-	42	30	28	A/R
	SAN FRANCISCO	-	30	25	43	2	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	58	42	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	11	-	1	87	-	100	-	-	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	8	-	-	92	8	75	17	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	40	20	40	-	-	80	20	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	27	21	52	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	8	64	-	2	26	14	35	25	26	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	10	-	22	68	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	8	15	-	77	4	49	29	18	A/R
	RAFAELA	-	16	-	28	56	66	34	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	95	5	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	15	85	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	23	47	5	13	12	-	90	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	7	93	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	10	90	-	-	-	5	90	5	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	20	40	30	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	58	22	21	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/02/2026 al 19/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	69	31	-	29	57	13	1	-	63	37	-	-	15	50	30	5	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	69	31	-	-	80	20	-	-	50	50	-	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	6	81	13	-	-	100	-	-	-	97	3	-	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	-	26	74	-	12	88	1	-	-	20	80	-	-	2	89	9	-	A/R
	LA PLATA	-	4	77	19	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	91	9	-	A/R
	LINCOLN	-	-	4	96	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	30	70	-	42	46	12	-	-	-	60	40	-	44	46	10	-	A/PS
	PERGAMINO	-	-	9	91	-	-	100	-	-	-	37	63	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	80	20	-	PS
	SALLIQUELÓ	-	10	78	12	-	-	93	7	-	-	16	72	12	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	7	64	29	-	-	76	24	-	-	100	-	-	-	1	60	39	-	A/R/PS/S
	TRES ARROYOS	-	-	72	28	-	-	53	47	-	-	92	8	-	-	-	3	97	-	PS
25 DE MAYO	-	-	65	35	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	45	55	-	25	63	10	2	-	50	50	-	-	20	60	15	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	-	88	10	2	-	-	90	10	-	-	70	13	17	R/PS/S
	RÍO CUARTO	-	-	29	71	-	-	45	39	16	-	-	100	-	-	-	40	31	28	A/R
	SAN FRANCISCO	-	17	32	51	-	-	73	27	-	-	50	50	-	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	60	40	-	-	100	-	-	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	3	79	18	-	-	81	19	-	-	100	0	-	-	-	68	29	3	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	70	30	-	-	70	30	-	-	60	40	-	-	-	60	40	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	-	51	49	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	9	49	42	-	10	40	38	12	-	10	47	43	-	-	33	40	27	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	100	-	80	20	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	100	-	-	46	38	16	-	65	35	-	-	-	-	66	34	A/R
	RAFAELA	-	-	-	100	-	64	36	-	-	-	15	54	31	-	40	60	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	30	41	29	-	-	99	1	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	47	53	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	23	77	-	-	-	83	17	-	-	1	99	-	-	-	67	28	5	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	85	15	-	-	-	50	50	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	85	15	-	-	-	100	-	-	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/02/2026 al 19/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	30	70	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	31	69	-	-	-	100	-	-	-	31	69	-	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	79	21	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	28	48	24	-	-	100	-	-	-	30	46	24	-	-	100	-	-	A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

