

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

26 de febrero de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 26 de febrero de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 26/02/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En el período analizado se acumularon más de 100mm en localidades de Salta, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Los máximos reportados fueron: 170mm en Metán, 153mm en Monte Caseros, 134mm en Rosario del Tala y 129mm en Salta capital. En la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones registradas fueron en general leves o nulas, con un máximo reportado de 40mm en CABA, seguido por Cnel. Suárez con 33mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 18/02/2026 al 24/02/2026.

El avance de un sistema frontal hace prever precipitaciones en Tierra del Fuego y oeste de Patagonia entre viernes y sábado. Además, durante el domingo se esperan lluvias de diversa intensidad en el este de Neuquén y norte de Río Negro. En la zona central de Argentina se prevén acumulados de lluvia de diversa intensidad entre jueves y sábado, principalmente en San Luis, Córdoba, este de La Pampa y algunos sectores del oeste y sur de Buenos Aires. Para el NOA, se esperan eventos de precipitaciones aisladas durante toda la semana.

TEMPERATURAS

La temperatura media del periodo resultó levemente superior a la normal en la mayor parte del país, sobre todo en el NEA y Patagonia, como estaba previsto. Las máximas superaron los 40°C en Formosa, Chaco, este de Salta, oeste de Corrientes y noreste de Santa Fe, con un máximo registrado de 44.5°C en Rivadavia (Salta). En Viedma la máxima llegó a 36.5°C y en Comodoro Rivadavia a 36°C.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 18/02/2026 al 24/02/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente sobre lo normal en todo el país. Entre jueves y viernes, todavía con los efectos del pasaje de un frente frío, se esperan temperaturas más frescas en la zona centro y sur, mientras que en el norte se mantendrán temperaturas más altas, con posibilidad de máximas sobre 35° en algunas localidades de este de Salta, Formosa y norte de Chaco.

A partir del sábado y hasta el martes de la próxima semana se espera un aumento paulatino en las temperaturas desde el norte de Patagonia hasta el norte del país, con posibilidad de máximas superiores a los 35°C entre lunes y martes en varias localidades del norte de Buenos Aires, este de Córdoba, Santa Fe, oeste de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y este de Salta.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Las lluvias registradas en la franja agrícola del NOA, determinaron el retorno de los excesos hídricos en la región. Lo mismo se observa en zonas de Entre Ríos y del sudeste de Corrientes, donde las precipitaciones provocaron excedentes temporarios.

Algunas unidades de suelo de la zona núcleo pampeana, salieron de la categoría sequía y el modelo de balance hídrico les ha adjudicado la clasificación de reservas escasas a regulares. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires, sigue mostrando condiciones de sequía estimados para lotes de soja de primera, aunque al momento de la redacción de este informe se están reportando lluvias.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte de Santa Fe, el cultivo de siembra temprana presenta un estado regular ya que ha sido afectado por las elevadas temperaturas ocurridas en este último período y se encuentra en etapas entre floración y capsulado. Si bien actualmente las temperaturas han iniciado un leve descenso, es importante que ocurran precipitaciones y mejore la humedad edáfica para permitir la recuperación de aquellos planteos de siembra intermedia y tardía. Se estima que durante los próximos días se inicien aplicaciones de defoliantes para dar comienzo a la cosecha en el mes de marzo. Se reporta presencia de picudo, en baja intensidad y por debajo de los umbrales de daño.

En la provincia de Chaco, el déficit hídrico junto con las elevadas temperaturas provocó un deterioro en el estado del cultivo que en su mayoría se encuentra regular, transitando etapas entre floración y capsulado. En la zona de la delegación Charata, se ha iniciado la cosecha a modo de prueba de lotes puntuales.

En el oeste de la provincia de Santiago del Estero, y en la provincia de Salta, los perfiles edáficos mantienen niveles adecuados de humedad, sosteniendo el buen estado general del cultivo que se encuentra en etapas entre crecimiento y floración, dependiendo de la fecha de siembra.

ARROZ

Prosigue lentamente la cosecha en la provincia de Corrientes, con interrupciones parciales causadas por el mal tiempo.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de la delegación Avellaneda, el cultivo transcurre entre llenado y madurez, con lotes de la variedad largo fino, que ya alcanzaron la madurez comercial y que están siendo cosechados. Las labores aún no se han generalizado por cuestiones climáticas, pero se estima que los rendimientos se ubicarían por debajo de los de la campaña previa a causa de la baja insolación durante la etapa vegetativa.

Algo más al sur, en el ámbito de la delegación Rafaela, se inició la cosecha en lotes puntuales de la variedad largo fino, interrumpida a causa de las últimas precipitaciones. El estado del cultivo es bueno, sin presencia de plagas o enfermedades.



GIRASOL



Continúa la evolución normal del cultivo, que transita etapas entre floración y llenado, con los primeros lotes sembrados en la zona centro y norte provincial, ya en la etapa de madurez, a la espera de descenso de humedad para iniciar la cosecha de los primeros lotes. El llenado de granos es satisfactorio teniendo en cuenta las características propias del cultivo que le permiten sortear los inconvenientes ante la escasez hídrica en las primeras capas del suelo. Se prevé que en algunos lotes en zonas determinadas se podrían obtener rendimientos inferiores a los promedios zonales, pero en general, las expectativas se ubican dentro de los promedios e inclusive por encima. En cuanto al aspecto sanitario no se destacan inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades de relevancia.



La mayoría de los planteos se encuentra en etapas entre llenado y madurez. En estos últimos, se han cosechado algunos lotes de siembra temprana en la zona de la delegación Marcos Juárez, donde se obtuvieron rendimientos que promediaron los 28 qq/ha. En la zona de Laboulaye, se postergó la cosecha a causa de las condiciones climáticas y se estima que en los próximos días las labores se implementen en gran parte de las zonas productivas.



Se ha finalizado la cosecha en la zona de la delegación Paraná mientras que todavía quedan lotes en Rosario del Tala y que se estiman trillar en los próximos días.



Se registraron precipitaciones generalizadas en la provincia, resultando muy beneficiosas para el cultivo que se encuentra en la etapa de llenado. El estado del cultivo es bueno, y no se informan presencia de plagas o enfermedades. Se estima que las labores de cosecha comiencen en los primeros días de marzo.



Luego de las precipitaciones ocurridas durante este último período que interrumpieron parcialmente la cosecha en la zona centro norte de la provincia, se retomaron las labores avanzando con buen ritmo y se encuentran próximas a finalizar. Los rendimientos obtenidos son muy buenos. En la zona de Rafaela estos superan la media histórica de 25 qq/ha registrándose valores de entre 30 y 40 qq/ha.



El cultivo implantado en el oeste provincial, que contempla la delegación homónima, mantiene muy buenas condiciones evolucionando normalmente con la mayoría de los planteos en floración.

MAÍZ



Durante la semana informada ocurrieron algunas precipitaciones en el norte y centro oeste de la provincia, abarcando parte de las delegaciones Pergamino, La Plata, Lincoln, Bolívar, Pehuajó, Pigüé y Saliqueló, mientras que en las restantes zonas ante el incremento en la demanda ambiental se intensifica la situación de sequía.

Estos nuevos aportes si bien no recomponen la totalidad de la humedad



edáfica, favorece a los planteos de siembra tardía que se encuentran en la etapa de llenado, permitiendo cierto grado de recuperación, teniendo en cuenta que se encuentran afectados en diferente medida por las condiciones de sequía ocurrida durante los primeros meses del año. El nivel de esta afectación, se encuentra ligado a las condiciones previas de los lotes y el manejo de los mismos. Los lotes de siembra temprana presentan un estado entre bueno y regular, con gran parte de los mismos en madurez, a la espera de alcanzar los niveles de humedad adecuada para ser cosechados.

En la región del sudeste, las precipitaciones ocurridas fueron escasas y puntuales, y se sostiene la situación de déficit hídrico en prácticamente toda la región. Los planteos de siembra temprana han transitado su período crítico (floración y llenado de granos) bajo condiciones de alta demanda atmosférica. Si bien mantuvieron un estado aceptable gracias a las reservas iniciales, la falta de lluvias en enero y febrero han generado un retroceso en las reservas hídricas del perfil lo que podría provocar mermas en el rendimiento final. En el caso de los de siembra tardía, todavía se mantiene una superficie en etapas vegetativas y floración incipiente, aumentando la posibilidad de recuperación ante la perspectiva de mejoras climáticas. En el aspecto sanitario no se reportan incidentes por presencia relevante de plagas o enfermedades.



El estado de los cultivos se encuentra sumamente relacionado con la distribución de las precipitaciones ocurridas durante el desarrollo del cultivo. En la zona norte que contempla a la delegación San Francisco, las mismas fueron muy oportunas, y el cultivo muestra excelentes condiciones generales, con planteos de siembra temprana en las últimas etapas de llenado y los tardíos en etapas vegetativas. En este contexto y estado del cultivo se realizan fertilizaciones y monitoreos constantes para evaluar la población de *Dalbulus maidis*.

Hacia el centro y sur, en las delegaciones de Villa María, Río Cuarto y Laboulaye, los maíces de siembra temprana han sufrido condiciones de sequía durante la etapa de floración, y se estiman rendimientos inferiores a los promedios zonales. Estos planteos se encuentran iniciando la etapa de madurez, y se prevé que en los próximos días se inicie la cosecha de los primeros lotes. En contraposición, el cultivo de siembra tardía, ha recibido precipitaciones que resultaron muy oportunas, revirtiendo gran parte de los síntomas que se evidenciaban a causa del estrés hídrico y presentan un estado general bueno.

En el oeste provincial, en ámbitos de la delegación Marcos Juárez, se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes con rindes de entre 80 y 85 qq/ha. Se estima que en los próximos días la cosecha se generalice y consecuentemente mejoren los rendimientos promedio. Los rindes, si bien bajos, son considerados



mejores a los esperados en función de las adversas condiciones toleradas por el cultivo durante las etapas críticas. Si bien no se reportan incidentes por presencia de plagas o enfermedades, se reportan importantes pérdidas de superficie causadas por caída de granizo en la zona de la localidad Cruz Alta.



En la zona norte de la provincia, en ámbitos de la delegación Roque Sáenz Peña, la superficie implantada se mantiene en un 40% de la estimación prevista, a la espera de nuevos aportes hídricos, pronosticados para los próximos días para continuar con las labores de la siembra y alcanzar la definición final del área destinada al cultivo.

En el sur, en la zona de la delegación Charata, el cultivo se encuentra en etapas entre vegetativas e inicios de floración, con un estado entre bueno y regular, con lotes manifestando síntomas de estrés hídrico, reversibles de concretarse las previsiones de precipitaciones para los próximos días. Se intensifican los monitoreos ante la presencia e incremento de la población de chicharrita (*D. maidis*).



Se prosigue con la cosecha de lotes tempranos en todo el ámbito provincial. La superficie cosechada representa cerca del 70% del total implantado.



Durante la semana han ocurrido precipitaciones que proporcionan alivio a la situación de escasez hídrica, aunque la humedad edáfica se mantiene en niveles entre adecuados y regulares.

En la zona de la delegación Santa Rosa, en el sur provincial, el cultivo de siembra temprana y tardía mantiene buen estado general, mientras que los planteos de segunda, más afectados por la falta de humedad, presentan un estado regular, transitando etapas vegetativas entre V8 y V10.



En Avellaneda, en la zona norte de la provincia, los maíces tempranos presentan un estado general bueno en el este de la delegación y regular a malo en el oeste. Estos planteos ya se encuentran en madurez y se ha iniciado la cosecha, destinándose a grano los mejores lotes, en donde se obtuvieron rendimientos aceptables. Los maíces de siembra tardía, ya han iniciado la etapa de floración, y presentan severos síntomas de estrés hídrico - térmico, con un estado general regular.

En Rafaela, ocurrieron precipitaciones con milimetrajes que oscilaron entre los 20 y 110mm, provocando la interrupción temporaria de las labores de cosecha de lotes de maíz temprano. Estos maíces presentan excelentes condiciones y los rindes de los primeros fluctuaron entre los 85 y 110 qq/ha. Los maíces de segunda presentan buen desarrollo vegetativo y buena reacción luego de las abundantes precipitaciones ocurridas y se encuentran ingresando a la etapa de floración con óptima disponibilidad hídrica. Se continúa monitoreando el incremento de la población de *Dalbulus maidis*, modificándose las estrategias de control en función del estado fenológico. En la zona centro y sur, los maíces tempranos ya se encuentran en madurez fisiológica, y la cosecha avanza lentamente, estimándose que de no mediar inconvenientes climáticos, la misma se generalizaría en los próximos días. Los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes, cosechados con una humedad levemente por encima de la de recibo, se encuentran entre los 70 y 100 qq/ha. Los maíces de siembra tardía, muestran una importante recuperación luego de las últimas lluvias mientras que los lotes de segunda ocupación, con antecesor legumbre, han transcurrido la floración durante la etapa de sequía extrema, impactando directamente en la producción final.



En prácticamente todo el ámbito provincial, han ocurrido precipitaciones con cierta asiduidad, permitiendo que el desarrollo del cultivo transcurra en términos generales sin limitaciones hídricas. El cultivo presenta buen estado, transitando etapas entre vegetativas y prefloración, y a pesar de la presencia del vector no se reportan daños por achaparramiento.



En el NOA, se registraron precipitaciones en prácticamente toda la región. El cultivo se encuentra en pleno crecimiento en etapas vegetativas, con muy buen estado general, auspiciándose rendimientos dentro de los promedios. En la provincia de Tucumán se han informado daños por Spiroplasma en muy baja proporción en lotes tempranos de maíz.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente presenta un estado general entre muy bueno y bueno, y se encuentra en la etapa de floración.

En Córdoba, el cultivo se encuentra algo más avanzado, en etapas entre formación de caja y llenado de granos. La escasez hídrica ocurrida durante los primeros meses del año, han provocado una importante pérdida de flores, generando baja carga de granos, previéndose una merma en el rendimiento final.

En la zona del NOA, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, en etapas vegetativas, en buenas condiciones.

POROTO

Avanza la siembra de las distintas variedades, fundamentalmente en la provincia de Salta, en donde se encuentra la mayor superficie dedicada a este cultivo. Las adecuadas condiciones de humedad en las provincias productoras favorecen el adecuado establecimiento del cultivo, que presenta muy buenas condiciones, con la mayoría de los planteos en etapas entre emergencia y crecimiento.

SOJA



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones en algunas zonas del norte y centro oeste de la provincia, con milimetrajés variados. Estos



nuevos aportes hídricos le permiten al cultivo avanzar en su desarrollo durante un período, sin limitaciones, no obstante, ante la elevada demanda ambiental, se hace imperante la continuidad en la ocurrencia de lluvias para evitar mayores deterioros. Las sojas de primera, en general presentan buenas condiciones, aunque durante el déficit se produjo una importante abscisión floral, se espera que dada la indeterminación en la floración, se compense lo perdido. El cultivo transita etapas entre floración y llenado en mayor proporción.

Las sojas de segunda, se encuentran en etapas que van desde vegetativas, floración y llenado en menor medida. Estos planteos han soportado el déficit hídrico prácticamente desde la siembra, y presentan un grado de afectación que se encuentra ligado a la localización del lote y los milimetrajes recibidos. Si bien se reportan mejoras a partir de la ocurrencia de las últimas lluvias, la característica típica en la mayoría de los casos es el menor desarrollo, aunque en buen estado. Se ha informado presencia de arañuela y chinches, en zonas puntuales, que están siendo controladas.



Durante la semana ocurrieron precipitaciones prácticamente generalizadas en todo el ámbito provincial con milimetrajes variados alcanzando hasta los 130mm en la zona de General Roca. También se destaca la caída de granizo que afectó una cuantiosa superficie dentro de la zona de la delegación Marcos Juárez.

Con excepción de la zona norte de la provincia, donde las precipitaciones ocurrieron con cierta frecuencia, las restantes áreas productivas muestran un variado grado de afectación tanto para las sojas de primera como para las de segunda, pero sobre todo en estas últimas donde los planteos se presentan con escaso desarrollo y baja densidad de plantas. A partir de la mejora en la situación hídrica se han revertido y detenido las condiciones de deterioro del cultivo, pero ya se estiman mermas en el rendimiento potencial. En cuanto al estado fenológico, las sojas de primera se encuentran entre R5-R6, mientras que las de segunda en R3, ambos planteos con un alto grado de incidencia de plagas como arañuela, chinche verde y orugas defoliadoras.



En el ámbito de Roque Sáenz Peña, en el norte provincial, la superficie implantada se mantiene en 90%. Las extremas condiciones de sequía y elevadas temperaturas de las últimas semanas están afectando

considerablemente al cultivo en situaciones que podrían ser irreversibles.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Charata, el cultivo se encuentra en etapas entre floración y formación de vainas en los lotes más adelantados. Si bien manifiestan síntomas de estrés hídrico, a la fecha la situación general del cultivo es buena, a la espera de las mejoras en las condiciones climáticas pronosticadas para los próximos días.



En el área de la delegación Santa Rosa, las soja de primera se encuentran entre R3/4 y R5 en los lotes más adelantados, mientras que las de segunda transitan R1. Las últimas precipitaciones ocurridas durante los últimos dos meses, han favorecido al cultivo permitiendo mantener un buen estado general. Las aplicaciones para control de araña y e isocas defoliadoras resultaron eficientes para mantener los niveles en la población de insectos.



En el norte provincial, en la zona de Avellaneda, se registran pérdidas de lotes por excesos hídricos en la localidad de San Javier, al este de la delegación. En términos generales, el estado de los planteos está entre bueno y regular, ya que los lotes de siembra temprana se han visto afectados por la sequía, mientras que los tardíos presentan menor desarrollo.

En Rafaela, el estado hídrico de los suelos es adecuado en la mayoría, con excesos puntuales en algunas zonas, por lo que el cultivo evoluciona sin restricciones de humedad. Las soja de primera se encuentran entre R4 y R6, en muy buenas condiciones. Para el caso de las soja de segunda, se reporta una muy buena respuesta del cultivo luego de las últimas lluvias, y sostienen un buen estado general. Estos planteos se encuentran en etapas que van desde floración hasta llenado.

En la zona de Casilda, las soja de primera se encuentran ingresando a la etapa de llenado. Los rendimientos estimados son sumamente variables en función del impacto del déficit hídrico, pero se prevén mermas en el rinde potencial que podrían encontrarse en un rango de entre un 30/40%. En el caso de la soja de segunda la situación es más grave respecto al nivel de daño a causa de la sequía. Se ha detectado presencia de araña, que está siendo controlada en aquellos lotes en donde se justifica la inversión.

Al sur de la provincia, en la zona de Venado Tuerto, las soja de primera se han visto afectadas a causa del déficit hídrico, pero se estima que el impacto pudo compensarse, manteniéndose el potencial de rendimiento



relativamente estable. Para las sojas de segunda, se observa una recuperación en el estado de los lotes luego de las últimas precipitaciones, que ocurrieron en la etapa entre inicio y pleno desarrollo de vainas, determinando que las proyecciones de rendimiento resulten entre regulares y buenas, dependiendo de la continuidad de las precipitaciones durante las siguientes etapas.



Durante la semana informada prácticamente no se registraron precipitaciones, pero los niveles de humedad se encuentran estables. El cultivo implantado en ambas delegaciones, dada la continuidad en la ocurrencia de lluvias, mantiene muy buen estado general, transitando etapas entre vegetativas y floración, y una escasa superficie más adelantada en llenado.



Continúan registrándose precipitaciones en la región, manteniendo el cultivo en muy buenas condiciones generales. Los estados fenológicos son variables y dependientes de la fecha de siembra. Los lotes más adelantados se encuentran en la etapa de llenado y no se reportan incidentes por presencia de plagas o enfermedades.

SORGO GRANÍFERO

El cultivo de siembra temprana de la provincia de Buenos Aires, presenta en general buenas condiciones, dependiendo de la zona y la distribución de precipitaciones. Estos planteos se encuentran en madurez, perdiendo humedad hasta alcanzar la apta para cosecha. Los lotes de siembra tardía, transitan la etapa de floración, sin reportes de incidentes sanitarios y en buen estado general.

En Córdoba, el cultivo se encuentra en etapas que van desde vegetativas hasta llenado de grano, dependiendo de la fecha de siembra, en general en buenas condiciones.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de Avellaneda, el cultivo presenta un estado regular. Los lotes cuyo destino fue la alimentación animal, ya fueron picados, mientras que se avanza con la trilla de aquellos con destino grano que han alcanzado el grado de humedad de cosecha. Los rendimientos obtenidos son aceptables.




En Rafaela, las últimas precipitaciones han beneficiado al cultivo por lo que presentan muy buen estado general. Dependiendo de la fecha de implantación los planteos transcurren en etapas entre finales de floración hasta llenado de grano.

En la zona de Cañada de Gómez, la totalidad del cultivo se encuentra en llenado, en buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades.

En la provincia de Santiago del Estero y la región del NOA, los últimos aportes hídricos, mantienen muy buenas condiciones para el desarrollo del cultivo que se encuentra en etapas vegetativas.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %
Bahía Blanca	22.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	179.750	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	154.000	100	100	100	100	100	100
Junín	189.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	63.700	100	100	100	100	100	100
Lincoln	320.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	352.992	100	100	100	100	100	100
Pergamino	160.418	100	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	326.354	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	414.514	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	167.871	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	3.113.699	100	100	100	100	100	100
24/25	3.130.724	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	546.856	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	460.500	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	561.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	440.000	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	2.908.356	100	100	100	100	100	100
24/25	2.563.297	100	100	100	100	100	100
Paraná	114.150	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	425.000	98	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	539.150	98	100	100	100	100	100
24/25	359.700	100	100	100	100	100	100
General Pico	525.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	100	100	100	100	100	100
24/25	706.000	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	144.280	61	78	87	96	100	100
Cañada de Gómez	290.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	159.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	362.400	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	235.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.191.180	95	97	98	100	100	100
24/25	781.643	99	100	99,6	100	100	100
CATAMARCA	14.100	80	88	95	95	100	100
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	111.000	41	52	71	84	93	97
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.690	28	31	41	41	41	41
FORMOSA	36.000	35	40	45	45	52	65
JUJUY	7.598	50	80	100	100	100	100
MISSIONES	33.000	100	100	100	100	100	100
SALTA	285.191	55	76	89	100	100	100
SAN LUIS	469.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	155.125	85	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	86	90	100	100	100	100
TUCUMÁN	74.230	80	85	95	96	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	10.443.939	95	97	98	99	98,9	99
24/25	9.234.043	94	96	98	99	99	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %
General Pico	1ª	330.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	39.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	6.700	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA		449.000	100	100	100	100	100	100
	25/26							
	24/25	406.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	177.100	79,3	89,4	98,9	100	100	100
	2ª	66.900	76	87	99	100	100	100
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	466.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	369.700	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		3.135.600	98	99	100	100	100	100
	25/26							
	24/25	3.389.223	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	1ª	20.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	19.200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	1ª	195.000	56	74	91	95	100	100
	2ª	105.000	71	97	99	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	170.000	62	67	81	81	94	94
	2ª	98.100	61	66	81	81	81	81
FORMOSA	1ª	18.000	60	70	90	95	100	100
	2ª	4.000	62	77	95	100	100	100
JUJUY	1ª	3.053	70	100	100	100	100	100
	2ª	4.205	64	100	100	100	100	100
MISIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120	67	91	100	100	100	100
	2ª	26.068	75	100	100	100	100	100
SAN LUIS	1ª	212.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	2.300	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870	100	100	100	100	100	100
	2ª	131.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	807.550	100	100	100	100	100	100
	2ª	268.500	89	90	100	100	100	100
TUCUMÁN	1ª	103.400	100	100	100	100	100	100
	2ª	78.300	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS		17.333.626	98	99	99,5	99,6	99,8	99,8
	25/26							
	24/25	17.994.965	99	100	100	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %
Bahía Blanca		14.700	100	100	100	100	100	100
Bolívar		3.350	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		900	100	100	100	100	100	100
Junín		7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata		14.500	100	100	100	100	100	100
Lincoln		25.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino		10.500	100	100	100	100	100	100
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló		8.100	100	100	100	100	100	100
Tandil		4.300	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		5.325	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo		7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	115.049	100	100	100	100	100	100
	24/25	116.248	100	100	100	100	100	100
Laboulaye		10.478	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		24.800	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco		85.000	100	100	100	100	100	100
Villa María		34.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	171.678	100	100	100	100	100	100
	24/25	191.632	100	100	100	100	100	100
Paraná		35.500	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		43.000	99	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	99	100	100	100	100	100
	24/25	108.500	100	100	100	100	100	100
General Pico		12.900	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.500	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	27.400	100	100	100	100	100	100
	24/25	26.390	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		52.000	37	65	67	83	100	100
Cañada de Gómez		12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	152.300	78	88	89	94	100	100
	24/25	222.702	97	98	99	100	100	100
CATAMARCA		1.500	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		45.000	46	54	76	77	94	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		46.300	47	52	65	65	65	65
FORMOSA		32.000	50	57	68	68	75	85
JUJUY		2.252	40	60	80	100	100	100
SALTA		35.465	45	71	89	100	100	100
SAN LUIS		23.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		73.300	81	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		83.560	73	90	100	100	100	100
TUCUMÁN		14.200	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	908.324	83	90	94	95	97	98
	24/25	1.005.799	85	88	93	96	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	22/01 %	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900								
Bolívar	85.648								
Bragado	9.920								
General Madariaga	89.100								
Junín	6.350								
La Plata	18.000								
Lincoln	70.500								
Pehuajó	102.259								
Pergamino	6.000								
Pigüé	90.000								
Salliqueló	171.000								
Tandil	186.555								
Tres Arroyos	341.031								
25 de Mayo	61.455								
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.243.718 1.173.852	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0	0
Laboulaye	103.615								
Marcos Juárez	47.500			3	20	26	34	900	16.044
Río Cuarto	19.000								
San Francisco	58.450				27	38	54		31.423
Villa María	28.350								
CÓRDOBA 25/26 24/25	256.915 277.203	0 0	0 0	1 0	10 4	13 7	19 9	900	47.467
Paraná	13.400	6	17	40	67	75	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	10	30	60	75	82	87		15.660
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	8 17	24 21	51 26	72 52	79 85	93 100	0	29.060
General Pico	190.000								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Avellaneda	285.200	63	83	82	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000			22	47	64	84		14.270
Casilda	8.000								0
Rafaela	192.600	13	42	81	97	98	99		189.827
Venado Tuerto	2.800						5		140
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	40 51	63 48	78 60	95 76	96 79	97 87	5.060	484.376
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650			30	69	83	91		1.495
CHACO (Charata)	268.600	83	97	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	76	86	94	100	100	100		229.500
FORMOSA	2.900	65	90	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150								
STGO. ESTERO	5.200								
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	45	70	91	99	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.093.697 2.413.081	15 9	19 11	25 13	30 15	35 18	38 20	9.960	1.177.403


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/02/2026 al 26/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	78	22	50	40	10	-	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	6	94	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	71	29	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	50	50	73	27	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	R/PS
	SALLIQUELÓ	-	-	-	95	5	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	15	85	-	3	83	14	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	48	52	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	5	90	5	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	40	60	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	36	64	3	93	4	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	50	50	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	24	76	-	85	15	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	40	55	5	-	R
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	91	9	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	73	27	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	100	64	36	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	92	8	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	67	33	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	2	30	69	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	10	90	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/02/2026 al 26/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	2	98	-	-	89	11	-	A/PS/S
	BOLÍVAR	-	-	11	84	5	21	45	25	9	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	30	57	13	-	80	20	-	R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	6	50	44	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	-	40	60	-	17	83	-	-	A/R
	LA PLATA	-	-	30	70	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	16	84	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	39	45	16	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	8	30	-	63	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	R/PS
	SALLIQUELÓ	-	-	2	98	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	7	43	49	-	1	74	25	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	1	54	44	-	-	49	51	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	45	55	-	40	60	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	5	40	40	15	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	1	45	54	-	80	20	-	R/PS/S
	RÍO CUARTO	-	-	55	15	30	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	20	27	51	2	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	48	42	10	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	12	-	-	88	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	6	-	-	94	8	75	17	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	20	30	50	-	-	80	20	-	A/R
	SANTA ROSA	-	16	24	60	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	56	15	-	29	8	35	25	32	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	8	2	-	90	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	-	23	-	77	4	49	29	18	A/R
	RAFAELA	-	12	3	1	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	57	43	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	9	91	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	5	59	8	9	19	31	50	19	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	95	5	-	-	-	80	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	20	30	40	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	18	31	51	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	99	1	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	70	30	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 20/02/2026 al 26/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General			Humedad		
E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	29	71	-	29	57	13	1	-	10	80	10	-	15	50	30	5	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	50	50	-	-	80	20	-	-	50	50	-	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	70	30	-	-	100	-	-	-	85	15	-	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	11	88	1	-	-	-	100	-	-	2	89	9	-	A/R
	LA PLATA	-	-	60	40	-	-	100	-	-	-	85	15	-	-	-	90	10	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	10	90	-	42	46	12	-	-	-	60	40	-	44	46	10	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	90	10	-	R/PS
	SALLIQUELÓ	-	-	63	37	-	-	93	7	-	-	2	80	18	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	7	63	30	-	-	75	25	-	-	100	-	-	-	1	59	40	-	A/R/PS/S
	TRES ARROYOS	-	-	53	47	-	-	53	47	-	-	89	11	-	-	-	3	97	-	PS
25 DE MAYO	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	30	70	-	15	60	20	5	-	15	85	-	-	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	-	88	10	2	-	-	17	83	-	-	70	13	17	R/PS/S
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	45	39	16	-	-	50	50	-	-	40	32	28	A
	SAN FRANCISCO	-	3	30	67	-	-	73	27	-	-	36	51	13	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	52	48	-	-	100	-	-	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	40	60	-	-	81	19	-	-	54	31	15	-	-	68	29	3	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	50	50	-	-	70	30	-	-	50	40	10	-	-	60	40	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	25	75	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	9	49	42	-	7	38	38	17	-	10	47	43	-	-	40	35	25	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	100	-	80	20	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	86	14	-	46	38	16	-	-	-	100	-	-	10	58	32	A/R
	RAFAELA	-	-	-	100	-	64	36	-	-	-	1	42	57	-	40	60	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	8	51	41	-	-	99	1	-	-	10	60	30	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	31	55	14	-	50	50	-	-	25	50	25	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	62	37	-	1	56	44	-	-	-	53	47	0	-	30	60	10	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	80	20	-	-	-	97	3	-	-	80	20	-	-	-	90	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	43	57	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/02/2026 al 26/02/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General				
E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M				
SALTA	SALTA	-	76	24	-	-	-	100	-	-	-	74	26	-	-	-	100	-	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	31	69	-	-	-	100	-	-	-	31	69	-	-	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	59	41	-	-	-	100	-	-	-	71	29	-	-	-	100	-	-	A/R	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	7	58	35	-	-	100	-	-	-	8	56	36	-	-	100	-	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

