

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

12 de marzo de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 12 de marzo de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 12/03/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

En el periodo analizado los mayores acumulados se concentraron en el NOA. Se reportaron más de 150mm en estaciones de la región: 245mm en Metán, 203mm en Termas de Río Hondo, 199mm en Santiago del Estero y 167mm en Tucumán capital. Fuera del NOA, los mayores acumulados son: 91mm en Santa Rosa de Conlara (San Luis) y 57mm en Villa Dolores (Córdoba). En el NEA se destacan los 47mm registrados en la estación Corrientes.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 04/03/2026 al 10/03/2026.

Durante la semana se espera que ocurran avances de sistemas frontales en Patagonia, que van a ocasionar inestabilidad en dicha zona y podrían generar precipitaciones de forma aislada en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Entre jueves y sábado, podrían darse lluvias y tormentas en el NOA, de forma aislada y con diversa intensidad. Durante el jueves podrían darse precipitaciones aisladas en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Entre viernes y lunes se esperan lluvias en Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y centro y sur de Buenos Aires, de forma aislada y con diversa intensidad.

TEMPERATURAS

La temperatura media del periodo analizado resultó inferior a la normal en la mayor parte del país, especialmente en el centro-sur de Salta, oeste de Santiago del Estero, sudeste de La Rioja, este de Catamarca, sudeste de San Juan, norte de San Luis y noroeste de Córdoba. Las máximas no alcanzaron los 40°C en ninguna estación de la red oficial, con un máximo reportado de 38.5°C en Formosa capital. En cuanto a las mínimas, se registraron heladas en Maquinchao, Río Grande, Esquel y Bariloche.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 04/03/2026 al 10/03/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en todo el país, principalmente en el este de Argentina. Entre jueves y martes de la próxima semana, se espera que vayan en aumento de forma paulatina en el centro y norte de Argentina, exceptuando algunos sectores del centro-oeste. Durante el sábado se espera que localidades del este de Formosa y Chaco registren máximas sobre 35°C y además, entre lunes y martes de la próxima semana, se prevén máximas sobre 35°C en localidades de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

No se observan grandes cambios en las reservas hídricas, ya que en general las lluvias de los últimos 7 días se registraron en áreas donde ya había alto contenido de humedad. Los mayores cambios se estiman en Córdoba, donde se habrían producido las mayores recargas y prácticamente habrían desaparecido las áreas clasificadas como deficitarias.

En la franja agrícola del NOA, el modelo estimó una continuidad de los excesos hídricos. También se mantienen unidades de suelo con excesos hídricos en el centro de Santa Fe y en menor medida en el norte de Entre Ríos. En la zona núcleo pampeana se ve disminuida el área clasificada con sequía, predominando actualmente las reservas regulares a adecuadas.

Las áreas con déficit hídrico en lotes de soja se concentran mayormente en Formosa, Chaco, sudoeste de La Pampa y también Buenos Aires, con excepción del noroeste provincial.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Santa Fe se inició la cosecha de los lotes tempranos en el norte de los departamentos Nueve de Julio y Vera, con buenos rendimientos (promedio de 18 qq/ha) y calidad de fibra, teniendo en cuenta las adversidades climáticas que se dieron a lo largo del ciclo del cultivo. Se está dando una situación confluyente en donde la fibra tiene un precio muy bajo y el costo de la cosecha alcanza casi la mitad de lo levantado, motivo por el cual muchos lotes se están abandonando cuando el rendimiento esperado es bajo. Asimismo, se observan lotes tardíos afectados por picudo en los cuales no se están haciendo las aplicaciones correspondientes si el análisis de costos no es positivo.

En la provincia de Chaco, continúa la cosecha en la zona de la delegación Charata en tanto que comenzó en la zona norte perteneciente a la delegación Roque Sáenz Peña, siendo el avance a nivel provincial del 13% del área implantada. En ambas regiones los rindes promedio, hasta el momento, oscilan entre 18 y 22 qq/ha.

En Salta y el oeste de la provincia de Santiago del Estero, los perfiles edáficos mantienen niveles adecuados de humedad, sosteniendo el buen estado general del cultivo que se encuentra, en su mayoría, en etapa de floración. En la región este de Santiago del Estero (delegación Quimilí), se registraron lluvias que favorecieron al cultivo el que se encuentra mayormente en floración y llenado de cápsulas.

ARROZ

Continúa lentamente la cosecha en la provincia de Corrientes, obteniéndose buenos rindes del orden de los 49 qq/ha en el caso del arroz largo ancho y 75 qq/ha para el largo fino. Las calidades son muy buenas.

En el departamento San Javier, en el noreste de Santa Fe, la cosecha del largo fino está detenida por las lluvias. Los rindes son buenos, promediando los 60 qq/ha. Se estima que el largo ancho se empezará a cosechar en abril. En el departamento Garay continúa lentamente la cosecha de la variedad largo fino. Se lograron rinde levemente inferiores a la campaña pasada del orden de los 70 qq/ha. El estado de los cultivos es bueno a muy bueno, y se presentan en llenado de granos y madurez. Sin presencia de plagas ni enfermedades.



En la provincia de Entre Ríos comenzó lentamente la recolección de los primeros lotes de las variedades largo fino y ancho en el área de la delegación Paraná, lográndose rindes aceptables que promedian los 75 y 62 qq/ha, respectivamente. Asimismo, prosiguió la trilla en la delegación Rosario del Tala, manteniéndose los rindes iniciales, los que promedian los 72 qq/ha para el largo fino y 52 qq/ha para el largo ancho.

GIRASOL



Se va generalizando la cosecha en toda la provincia, cubriéndose el 5% del área total implantada. Los primeros rindes oscilan entre promedios de 10 qq/ha en la zona de Tres Arroyos a 36 qq/ha en la región de Pehuajó, siendo el valor a nivel provincial, hasta el momento, de 26 qq/ha.



Prosiguió la cosecha en el área de las delegaciones Marcos Juárez, Villa María y San Francisco, en tanto que se inició en la delegación Laboulaye, alcanzando un avance del 28% a nivel provincial. Los rindes promedio varían entre 20 qq/ha en la zona de Villa María a 29 qq/ha en la de Marcos Juárez.



Con la recolección de los últimos lotes en la delegación Rosario del Tala, se da por finalizada la misma en toda la provincia, estimándose un rinde promedio de unos 22 qq/ha.



Se iniciaron las labores de trilla en el área de la delegación General Pico, con rindes que varían entre 14 y 22 qq/ha según las zonas.

Continúa lentamente la cosecha en la delegación Santa Rosa, por días muy húmedos y/o lluviosos, con primeros datos de rendimiento entre 20 qq/ha a 40 qq/ha.



Prosiguió la cosecha en el sur de la provincia (delegaciones Casilda y Venado Tuerto), siendo los rindes promedio alcanzados del orden de los 24 a 30 qq/ha.



El cultivo implantado en el oeste provincial, que contempla la delegación homónima, mantiene muy buenas condiciones evolucionando normalmente con la mayoría de los planteos en floración.

MAÍZ



Continúa la cosecha de los maíces tempranos en las delegaciones Pergamino y Bragado, mejorando los valores de rinde obtenidos, siendo, en promedio, de unos 96 y 80 qq/ha, respectivamente. En la zona de Junín se inició lentamente la trilla por la elevada humedad que aún presentan los granos. En el resto de la provincia se encuentran en el estado ontogénico de llenado de grano a madurez fisiológica anticipada por el estrés del cultivo, siendo su estado bueno a regular según las lluvias recibidas.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran, entre etapas de floración a llenado de granos. Las últimas lluvias registradas en gran parte de la provincia, aunque principalmente en la región centro-oeste, permitirían mejorar su performance.

En la región del sudeste, las precipitaciones ocurridas fueron escasas y puntuales, y se sostiene la situación de déficit hídrico en prácticamente toda la región. Los planteos de siembra temprana han transitado su período crítico (floración y llenado de granos) bajo condiciones de alta demanda atmosférica. Si bien mantuvieron un estado aceptable gracias a las reservas

iniciales, la falta de lluvias en enero y febrero han generado un retroceso en las reservas hídricas del perfil lo que podría provocar mermas en el rendimiento final. En el caso de los de siembra tardía, todavía se mantiene una superficie en etapas vegetativas y floración incipiente, aumentando la posibilidad de recuperación ante la perspectiva de mejoras climáticas. En el aspecto sanitario no se reportan incidentes por presencia relevante de plagas o enfermedades.



Continuó lentamente la trilla en la delegación Marcos Juárez, alcanzándose a cubrir el 16% del área total. Los rindes, hasta el momento, son superiores a lo estimado, alcanzando los 120-135 qq/ha en campos de buena calidad agrícola a 80 qq/ha en lotes de menor aptitud agrícola. El granizo caído en las zonas de Isla Verde, Camilo Aldao, Los Surgentes, Cruz Alta y el sur de General Roca, provocó pérdidas importantes que alcanzan las 12.000 ha.

Se comenzaron a cosechar algunos lotes de maíz temprano en la zona de la delegación Río Cuarto. Si bien aún están húmedos se adelanta la trilla por el riesgo de la caída de plantas por tener caña débil y los vientos fuertes. Los primeros rindes son bajos, oscilando entre los 35 y 70 qq/ha. Se registraron lluvias que favorecen el llenado de granos de los maíces tardíos.

También se inició la recolección del maíz de primera en las delegaciones Villa María y San Francisco. Con respecto al maíz tardío, se encuentra en etapa de grano lechoso, con algunos más demorados en floración en el área de San Francisco. En general su estado es bueno, favorecido por las últimas precipitaciones registradas durante el período crítico del cultivo, sumado a que las temperaturas no han sido tan elevadas. Se están monitoreando lotes con frecuencia por presencia de *Dalbulus maidis*.



Las precipitaciones registradas en la semana se presentan en un momento oportuno del ciclo del cultivo, coincidiendo con el fin del período vegetativo e inicio de la fase crítica de floración. Esta mejora en las condiciones de humedad genera buenas expectativas para el cereal, favoreciendo su desarrollo y el potencial productivo en la zona.



Restan levantar escasos lotes de primera para dar por concluida su cosecha. Los rendimientos son dispares y alcanzan un promedio cercano a los 63 qq/ha. Para el caso de los planteos de segunda y tardíos, las plantas han recuperado su buen estado luego de las lluvias, mostrando un mejor aspecto. La mayoría atraviesa estados entre panojamiento y grano lechoso.



En la zona de la delegación General Pico, en el norte provincial, se registraron precipitaciones del orden de los 30-40 mm en promedio, llegando a 80-90 mm en algunas localidades. Los maíces de primera se encuentran finalizando el llenado de granos. Los lotes tardíos, entre floración y comienzo de llenado, son los más beneficiados por las lluvias ocurridas en esta semana.

En la delegación Santa Rosa, las lluvias fueron inferiores, promediando los 8,4 mm. La humedad del suelo es regular a adecuada. Los maíces de primera tempranos se encuentran en R5 (grano dentado), en buen estado, al igual que los de primera tardíos en etapa R3/R4 (grano lechoso a pastoso). Los de segunda sobre rastrojo de fina están entre V12/V14, en estado regular.



Finalizó la cosecha del maíz temprano en el ámbito de la delegación Avellaneda en el norte provincial, obteniéndose rindes promedio del orden de los 32 qq/ha en el departamento Nueve de Julio a 60 qq/ha en el de San Javier, manifestándose así el efecto de las lluvias que fueron escasas a nulas hacia el oeste y adecuadas hacia la región este de la delegación. Los maíces de siembra tardía, se encuentran entre estado vegetativo a floración los más adelantados, recuperándose con las últimas lluvias pero son necesarias más para su recuperación plena. Se observa presencia de oruga del cogollero.

En el área de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, fue escasa la actividad de cosecha del maíz temprano debido a las precipitaciones. Los rindes son muy buenos, del orden de los 85 a 110 qq/ha, con lotes puntuales de 125 qq/ha. Los maíces de segunda y tardíos fueron muy favorecidos por las abundantes precipitaciones, se observan buenas estructuras de plantas, buen crecimiento vegetativo e ingreso al período

crítico de floración y fijación de granos en óptimas condiciones agroclimáticas. Sanitariamente continúan los monitoreos correspondiente a *Dalbulus* observándose un aumento de población lo que trae aparejado aplicaciones según las estrategias de control debido al estado fenológico de los cultivos.

Se registró un fuerte avance en la recolección del maíz en la delegación Casilda, en función de los días de buen tiempo. Se está cosechando prácticamente la totalidad con granos secos y unos pocos lotes refieren tenores hídricos que superan el 15%. Se pudo progresar en cuadros problemáticos que presentaban plantas caídas por efecto de los fuertes vientos por lo que no se da cuenta de superficie perdida en la presente campaña.

En la delegación Venado Tuerto la cosecha avanza a buen ritmo, con valores de humedad de grano aún elevados en varios lotes. Los rendimientos registrados hasta el momento se ubican en niveles buenos, en línea con las expectativas productivas de la campaña.



Durante la semana continuaron produciéndose lluvias que favorecen al cultivo, el cual se encuentra en etapas entre vegetativas y floración, con buen aspecto.



En el NOA, nuevamente ocurrieron abundantes precipitaciones, localizándose los mayores registros en la provincia de Tucumán. El cultivo se encuentra en iniciando la floración, con muy buen estado general, auspiciándose rendimientos dentro de los promedios. En la provincia de Tucumán se observan algunos daños por *Spiroplasma* en lotes tempranos de maíz, y si bien no son de gravedad, se están realizando monitoreos permanentes.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente presenta un estado general entre muy bueno a bueno, y se encuentra en la etapa de floración, con lotes más avanzados iniciando el llenado de granos.



En Córdoba, se observa un normal desarrollo del cultivo y buena sanidad, avanzando en el llenado de granos en la mayoría de los lotes, con algunos más tempranos iniciando la fase de madurez.

En la zona del NOA, el cultivo se encuentra iniciando la etapa de floración, en buenas condiciones.

POROTO

Avanza la siembra de las distintas variedades, fundamentalmente en la provincia de Salta, en donde se encuentra la mayor superficie dedicada a este cultivo. Las excelentes condiciones de humedad en las provincias productoras favorecen el adecuado establecimiento del cultivo, que presenta muy buenas aspecto, con la mayoría de los planteos en etapas entre emergencia y crecimiento, a excepción de los lotes de poroto mung que están en estadios más avanzados con algunos próximos a madurez.

SOJA



Durante la presente semana se registraron precipitaciones principalmente en la zona oeste provincial favoreciendo tanto a las sojas de primera que se encuentran, principalmente, en llenado de granos, como a las de segunda que se encuentran en floración y las más adelantadas iniciando el llenado de granos. En general, el estado sanitario es muy bueno.



Nuevamente se registraron lluvias en toda la provincia beneficiando a las sojas de primera que se encuentran en etapa de llenado de granos (R5-R6) y a las de segunda que están entre etapas de floración (R2), formación de vainas (R3) e inicio de llenado de granos (R4). La caída de granizo provocó un importante daño en una zona donde había lotes en muy buenas condiciones, estimándose pérdidas de aproximadamente unas 20.000 ha en zonas de Inrville, Camilo Aldao, General Roca y Cruz Alta.



Durante la semana se registraron precipitaciones del orden de los 20 a 40 mm en gran parte de la zona de influencia de la delegación Charata, las cuales contribuyen a mejorar el estado general del cultivo, que en su mayoría se encuentra transitando etapas críticas. Los cuadros que presentaban mayores niveles de estrés hídrico comenzarían a mostrar una recuperación, mientras que aquellos que mantenían condiciones buenas podrían sostener buenas expectativas de rendimiento. Los cuadros de segunda y en la zona centro, departamento O'Higgins, poseen los cuadros más afectados por la escasez de agua en el perfil.

El cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se desarrolla en etapas vegetativas a floración y el descenso de las temperaturas extremas con algunas lluvias registradas de forma dispar han traído algo de alivio en la última semana.



Las sojas de primera atraviesan estados fenológicos de llenado de grano. Hacia el norte de la provincia presentan un mejor estado general, mostrándose entre muy buenas a buenas, siendo mayor el porcentaje de lotes regulares hacia la región sur. Las de segunda, en etapa de floración, también sufrieron el periodo de seca en sus primeras etapas pero al estar en estadios menos avanzados pudo reponerse mucho mejor.



En la delegación General Pico, las sojas de primera presentan buenas condiciones en general y se encuentran en inicio de formación de granos. Las de segunda se encuentran entre floración y comienzo de formación de vainas. Las últimas lluvias ocurridas han sido de suma importancia para el cultivo.

En el área de la delegación Santa Rosa, las sojas de primera más adelantadas se encuentran en inicio de formación de semillas (R5) y las más atrasadas en vainas completamente formadas (R4). Las de segunda están en floración a inicio de formación de vainas. Las precipitaciones registradas durante lo que va del año favorecieron el desarrollo del cultivo el cual presenta buen estado.





En el norte provincial, en la zona de Avellaneda, el estado del cultivo es regular debido a la sequía que lo afectó al inicio de su ciclo. Las últimas lluvias favorecen su recuperación pero no a su pleno potencial dado que quedaron con baja altura por estrés hídrico y térmico.

En el ámbito de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez los lotes de soja de primera transitan las etapas de llenado de granos (R4) a semilla totalmente desarrollada (R6). Las sojas de segunda, se encuentran en floración, formación de vainas y llenado de granos. Las reservas hídricas son adecuadas o con excesos puntuales en el perfil lo que permitiría estimar muy buenos rendimientos. No se registran problemas de plagas ni enfermedades.

En la delegación Casilda las sojas de primera transitan las últimas etapas previas a la madurez comercial, con cuadros terminando de llenar los granos y una amplia superficie en proceso de madurez fisiológica. En lotes de siembra temprana y variedades de ciclo corto las lluvias llegaron tarde, por lo que se estiman rendimientos de entre 25 a 28 qq/ha, mientras que en los cuadros de implantación tardía, se logró un mejor tamaño y peso de granos que permiten proyectar valores en torno a los 35 qq/ha. Los lotes de segunda con antecesor trigo pudieron recuperarse mejor de la sequía, aún más que los de antecesor legumbre, ya que estos últimos estaban más avanzados y sufrieron el déficit hídrico en toda su etapa reproductiva. Se observan lotes con un desarrollo aceptable, formando los últimos granos en contraste con otros planteos de baja altura y exiguo número de vainas por planta.

En la zona de Venado Tuerto, la soja de primera se encuentra transitando las etapas finales del ciclo bajo buenas condiciones generales. De mantenerse el escenario climático actual, se proyectan rendimientos buenos a muy buenos, con variabilidad según zona y manejo de los lotes. Las sojas de segunda continúan mostrando una evolución favorable, impulsada por una mayor frecuencia de precipitaciones en las últimas semanas. Las condiciones actuales resultan adecuadas para el proceso de llenado de granos, lo que permite sostener expectativas productivas positivas.



El cultivo implantado mantiene un muy buen estado general, transitando etapas entre floración y comienzo de llenado de granos, con muy buenas condiciones hídricas.





Continúan registrándose precipitaciones en la región, manteniendo al cultivo en muy buenas condiciones generales. Los estados fenológicos son variables dependiendo de la fecha de siembra. Los lotes más adelantados se encuentran en la etapa de llenado.

SORGO GRANÍFERO

En la provincia de Buenos Aires el cultivo de siembra temprana presenta, en general, buenas condiciones, en etapa de llenado de granos, a excepción de los lotes implantados en la región sudeste en donde se estima una merma en el rinde potencial debido a la baja disponibilidad hídrica. Los lotes de siembra tardía, transitan la etapa de floración, sin reportes de incidentes sanitarios y en buen estado general, salvo en la mencionada zona.

En Córdoba, el cultivo se encuentra en su mayoría en etapa de llenado de grano, en buenas condiciones.


Comenzó la cosecha en el ámbito de la delegación Paraná en la provincia de Entre Ríos, siendo el avance, a la fecha, del 13% y el rinde promedio de 58 qq/ha. En la delegación Rosario del Tala, el avance de cosecha alcanzó el 18% con rindes entre 30 y 40 qq/ha.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de Avellaneda, la mayor parte del sorgo de primera época se destinó a forraje, lo poco que se cosechó presentó rindes muy dispares del orden de los 8 a 80 qq/ha, con variaciones zonales; los de segunda época están en estado vegetativo con algunos en floración y su estado es regular a bueno. En Rafaela y Cañada de Gómez, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado de granos, sin problemas de plagas ni enfermedades y favorecidos por las lluvias, estimándose muy buenos rindes. También se realizó el picado para confección de silos destinados a consumo animal.

En la provincia de Santiago del Estero y la región del NOA, los últimos aportes hídricos, mantienen muy buenas condiciones para el desarrollo del cultivo que se encuentra, en su mayoría, en etapas vegetativas, con algunos lotes más avanzados iniciando la floración.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	12/03	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	11.000	8	14	21	30	44	51		5.610
	LF	77.800	10	15	22	29	42	51		39.678
T. CORRIENTES		88.800	10	15	22	29	42	51	0	45.288
R. S. Peña		6.500								
T. CHACO		6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.900						5		145
	LF	22.650						6		1.359
T. PARANÁ		25.550	0	0	0	0	0	6	0	1.504
R. DEL TALA	LA	5.000					10	23		1.150
	LF	25.000					10	22		5.500
T. R.DEL TALA		30.000	0	0	0	0	10	22	0	6.650
T. ENTRE RÍOS		55.550					5	15	0	8.154
FORMOSA		14.400						5		720
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	0	5	0	720
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	15.000		1	10	30	50	50		7.500
T. AVELLANEDA		16.500		1	9	27	45	45	0	7.500
RAFAELA	LA	350								
	LF	14.300				2	10	35		5.005
T. RAFAELA		14.650	0	0	0	2	10	34	0	5.005
T. SANTA FE		31.150	0	0	5	15	29	40	0	12.505
TOTAL PAÍS	LA	20.750	4	7	11	16	26	33		6.905
	LF	175.650	4	7	11	16	25	34		59.762
TOTAL PAÍS		196.400	4	7	11	16	25	34	0	66.667
TOTAL PAÍS		232.125	16	21	25	29	38	50		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	05/03 %	12/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900						10		590
Bolívar	85.648					1	22		18.843
Bragado	9.920					10	15		1.488
General Madariaga	89.100								
Junín	6.350					5	27		1.715
La Plata	18.000					1	8		1.440
Lincoln	70.500						4		2.820
Pehuajó	102.259					3	17		17.384
Pergamino	6.000					14	36		2.160
Pigüé	90.000								
Saliqueló	171.000						1		1.710
Tandil	186.555						3		5.597
Tres Arroyos	341.031						1		3.410
25 de Mayo	61.455						3	3.074	1.751
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.243.718 1.173.852	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	5 2	3.074	58.907
Laboulaye	103.615						5		5.181
Marcos Juárez	47.500	3	20	26	34	49	58	1.300	26.796
Río Cuarto	19.000								
San Francisco	58.450		27	38	54	55	55		32.148
Villa María	28.350					10	24		6.804
CÓRDOBA 25/26 24/25	256.915 277.203	0 0	10 4	13 7	19 9	23 10	28 18	1.300	70.928
Paraná	13.400	40	67	75	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	60	75	82	87	95	100	960	17.040
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	51 58	71 64	79 89	93 100	97 100	100 100	960	30.440
General Pico	190.000						10	3.800	18.620
Santa Rosa	120.000					2	5		6.000
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	8 1	3.800	24.620
Avellaneda	285.200	82	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	22	47	64	84	100	100		17.000
Casilda	8.000				21	31	50		4.000
Rafaela	192.600	81	97	98	99	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800				5	40	60		1.680
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	78 60	95 76	96 79	97 87	99 89	99 92	5.060	495.420
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	30	69	83	91	100	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	94	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150					3	9		10.724
STGO. ESTERO	5.200							150	
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	91	99	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.093.697 2.413.081	32 15	37 18	37 19	38 20	39 21	42 23	19.874	1.306.163

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	05/03 %	12/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	22.600								
Bolívar	256.500								
Bragado	179.750					5	8	10.245	13.560
General Madariaga	154.000								
Junín	189.000						1		1.890
La Plata	63.700								
Lincoln	320.000								
Pehuajó	352.992								
Pergamino	160.418					3	16	17.500	22.867
Pigüé	205.000								
Saliqueló	301.000								
Tandil	326.354								
Tres Arroyos	414.514								
25 de Mayo	167.871								
BUENOS AIRES 25/26	3.113.699	0	0	0	0	0	1	27.745	38.317
24/25	3.130.724	0	0	0	0	0	1		
Laboulaye	546.856								
Marcos Juárez	460.500				3	13	16	55.700	64.768
Río Cuarto	900.000						1		9.000
San Francisco	561.000						7		39.270
Villa María	440.000						4		17.600
CÓRDOBA 25/26	2.908.356	0	0	0	0	2	5	55.700	130.638
24/25	2.563.297	0	0	0	0	0	1		
Paraná	114.150	4	21	72	78	83	86	1.900	96.535
Rosario del Tala	425.000	10	20	45	65	80	90	63.650	325.215
ENTRE RÍOS 25/26	539.150	9	20	51	68	81	89	65.550	421.750
24/25	359.700	25	40	54	56	60	64		
General Pico	525.000								
Santa Rosa	250.000								
LA PAMPA 25/26	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	706.000	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	144.280	4	8	16	20	21	21	8.350	28.545
Cañada de Gómez	290.000				2	13	19		55.100
Casilda	159.000			3	7	20	61		96.990
Rafaela	362.400		6	9	9	37	47	126.100	111.061
Venado Tuerto	235.500					2	5	12.000	11.175
SANTA FE 25/26	1.191.180	1	3	5	6	18	29	146.450	302.871
24/25	781.643	1	2	4	9	14	19		
CATAMARCA	14.100								0
CORRIENTES	10.220	37	56	71	79	94	97	1.240	8.711
CHACO (Charata)	111.000	4	8	11	16	18	20	5	22.199
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.690								0
FORMOSA	36.000								0
JUJUY	7.598								0
MISIONES	33.000								0
SALTA	285.191								0
SAN LUIS	469.200								0
STGO. ESTERO	155.125								0
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200								0
TUCUMÁN	74.230								0
TOTAL PAÍS 25/26	10.443.939	1	1	3	4	7	9	296.690	924.486
24/25	9.234.043	1	2	3	4	4	5		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/03/2026 al 12/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	52	48	50	40	10	-	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	-	42	58	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	93	7	10	74	16	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	10	90	6	94	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	14	86	-	100	-	-	A
	PEHUJÓ	-	-	-	8	92	73	27	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	50	50	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	50	50	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	70	30	10	77	13	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	-	89	11	-	40	60	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	-	70	30	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	15	85	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	4	96	8	88	4	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	12	88	-	85	15	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	28	54	18	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	52	48	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	89	11	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/03/2026 al 12/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	89	11	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	84	16	21	45	25	9	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	6	67	27	-	97	3	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	14	84	2	2	61	37	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	12	60	28	17	83	-	-	A/R
	LA PLATA	-	-	7	80	13	-	70	30	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	69	31	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	60	40	39	45	16	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	13	24	63	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	95	5	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	4	84	12	4	71	25	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	6	89	5	-	49	51	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	20	75	5	40	60	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	25	40	35	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	11	89	6	82	12	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	50	15	35	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	6	26	63	5	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	29	46	25	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	4	8	-	88	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	40	60	-	-	80	20	-	A/R
	SANTA ROSA	-	7	24	69	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	43	27	-	29	8	35	25	32	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	8	2	-	90	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	A/R
	RAFAELA	-	6	9	0	85	66	34	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	19	78	3	-	-	100	-	-	E/A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CHACO	CHARATA	-	29	39	9	23	5	46	41	8	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	10	30	50	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	70	29	1	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	10	30	60	-	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	88	12	-	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	36	55	9	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	21	78	1	-	-	100	-	-	E/A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/03/2026 al 12/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	15	85	-	29	57	13	1	-	-	80	20	-	15	50	30	5	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	30	70	-	-	94	6	-	-	30	60	10	-	-	88	12	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	-	60	40	-	-	-	75	25	-	-	14	68	18	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	11	88	1	-	-	-	60	40	-	2	89	9	-	A/R
	LA PLATA	-	-	10	90	-	-	57	43	-	-	7	92	1	-	-	62	38	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	98	2	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	42	46	12	-	-	-	38	62	-	44	46	10	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	43	57	-	100	-	-	-	-	26	74	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	90	10	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	30	70	-	-	93	7	-	-	-	54	46	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	74	26	-	-	-	100	-	-	1	59	40	-	A/R/PS/S
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	43	52	5	-	-	100	-	-	-	-	21	79	PS
25 DE MAYO	-	-	20	80	-	9	91	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	90	10	15	60	20	5	-	-	55	45	-	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	6	89	5	-	-	-	-	100	-	-	66	15	19	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	45	39	16	-	-	9	91	-	-	40	32	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	8	90	2	-	73	27	-	-	9	53	38	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	27	65	8	-	100	-	-	-	-	62	38	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	3	97	-	-	81	19	-	-	4	53	43	-	-	68	29	3	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	12	88	-	10	60	30	-	-	1	90	9	-	19	51	30	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	40	60	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	48	52	-	2	30	38	30	-	3	44	53	-	-	29	40	31	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	100	-	80	20	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	43	57	-	46	38	16	-	-	-	100	-	-	28	52	20	A/R
	RAFAELA	-	-	-	100	-	62	36	2	-	-	-	25	75	-	50	45	5	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	97	3	-	100	-	-	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	28	72	-	-	99	1	-	-	-	30	70	-	-	100	-	-	E/A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	24	56	20	-	42	58	-	-	18	53	29	-	-	80	20	-	A/R
CHACO	CHARATA	-	14	60	25	1	8	56	26	10	-	18	69	13	-	8	48	33	11	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	78	22	-	-	-	50	50	-	-	77	23	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	68	32	-	-	-	100	-	-	-	70	30	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/03/2026 al 12/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	45	34	21	-	-	100	-	-	-	41	36	23	-	-	100	-	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	90	10	-	-	100	-	-	-	-	83	17	-	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	58	42	-	-	100	-	-	-	15	51	34	-	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	36	54	-	-	100	-	-	-	-	32	68	-	-	100	-	-	E/A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

