

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

26 de marzo de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 26 de marzo de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 26/03/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En el periodo analizado se reportaron acumulados de más de 150mm en algunas estaciones: 203mm en Resistencia (Chaco), 165mm en Pehuajó (Buenos Aires), 151mm en Victoria (Entre Ríos) y 151mm en General Pico (La Pampa). En gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, donde las lluvias venían siendo muy escasas en el verano, recibieron más de 100mm en total en el periodo analizado.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 16/03/2026 al 24/03/2026.

Entre jueves y viernes se prevén lluvias y tormentas de forma aislada en el NOA y algunos sectores de Córdoba y Santa Fe. Entre sábado y domingo las lluvias se trasladarán a provincias de la zona central, incluyendo Buenos Aires, noreste de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y localidades del NOA. El lunes 30 podrán darse tormentas aisladas en Cuyo. En Patagonia, podrían darse lluvias aisladas en Tierra del Fuego y en el sur de la región cordillerana durante el jueves 26.

TEMPERATURAS

Durante el periodo analizado se registraron temperaturas normales en la mayor parte del país, con excepción de Patagonia, donde resultaron inferiores a las normales. Las temperaturas no alcanzaron los 40°C en ninguna estación del SMN, con un máximo registro de 38°C en Ituzaingó (Corrientes). Hubo heladas en Patagonia, con un mínimo valor reportado de -3.1°C en El Calafate.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 16/03/2026 al 24/03/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal desde el norte de Patagonia hasta el norte del país, mientras que en el centro y sur de Patagonia se esperan temperaturas normales a levemente por debajo de lo normal para esta época. Entre jueves y martes de la próxima semana se espera que las temperaturas aumenten de forma paulatina en la zona central y norte. Asimismo, entre lunes y martes próximos, localidades del norte de San Luis, oeste de Córdoba y el NOA podrían registrar máximas superiores a los 35°C.

En Patagonia hay una distinción entre el norte, por un lado, y el centro y sur, por el otro. El norte de dicha región seguirá un comportamiento similar al de la zona central de Argentina y donde se prevé que durante sábado, lunes y martes podría haber localidades de Río Negro y Neuquén con máximas superiores a los 30°C. Por otra parte, en la zona centro y sur se mantendrían temperaturas frías con leves aumentos entre domingo y martes de la próxima semana.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Predominan las recargas con respecto a la situación descrita en el informe anterior. Sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, las reservas habrían escalado de las categorías regular, escasa o deficitaria a condición adecuada a óptima, incluso con algunas unidades de suelo con excesos temporarios.

Sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires las recargas fueron menores y todavía se mantienen los almacenajes escasos o deficitarios, según la zona. Lo mismo se observa en el centro y sudoeste de la provincia de Chaco.

Fuera de Buenos Aires, las mayores recargas se habrían concretado en el norte de La Pampa, en el sudeste de Córdoba, en el centro de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Las lluvias en el NOA fueron menores en el periodo analizado, por lo que los excesos hídricos precedentes se ven disminuidos, aunque los perfiles seguirán cargados.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Santa Fe continúa siendo lenta la cosecha de los lotes tempranos en el norte de los departamentos Nueve de Julio y Vera, registrándose un avance del 7%. Se están obteniendo buenos rendimientos (promedio de 18 qq/ha) y calidad de fibra, teniendo en cuenta las adversidades climáticas que se dieron a lo largo del ciclo del cultivo. Se observan lotes tardíos muy afectados por picudo, muchos de los cuales no se están tratando por las muy bajas expectativas de rendimiento.

Continúa la recolección del cultivo en la provincia de Chaco, cubriéndose el 32% del área implantada y obteniéndose rindes que promedian los 19 qq/ha. Los lotes restantes se desarrollan en fases reproductivas de floración a capsulado.

En Salta y Santiago del Estero, los perfiles edáficos mantienen niveles adecuados de humedad, sosteniendo el buen estado general del cultivo que se encuentra, principalmente, en llenado de cápsulas, con algunos lotes más atrasados en floración.

ARROZ

Prosiguió la cosecha en la provincia de Corrientes, alcanzando el 66% de avance, estando más adelantada en el norte con respecto a la zona centro y sur provincial. Los rindes obtenidos se mantienen en los 49 qq/ha en el caso del arroz largo ancho y 75 qq/ha para el largo fino.

En la provincia de Entre Ríos continuó la recolección cubriéndose casi la mitad del área total y obteniéndose rindes buenos a muy buenos que promedian los 52 a 62 qq/ha para el largo ancho y los 72 a 77 qq/ha en el caso del largo fino.

En el departamento San Javier, en el noreste de Santa Fe, la cosecha del largo fino avanza lentamente, debiéndose detener en varias oportunidades por las lluvias. Los rindes promedian los 60 qq/ha. Se estima que el largo ancho se empezará a cosechar en abril. En el departamento Garay la misma condición meteorológica detuvo la cosecha de ambos tipos de arroz, con rindes levemente inferiores a la campaña pasada del orden de los 70 qq/ha para el largo fino y 62 qq/ha para el largo ancho. El estado de los lotes es bueno a muy bueno, y se presentan en fin de llenado de granos y madurez.



GIRASOL



Durante la semana han ocurrido precipitaciones en prácticamente toda la provincia, las que, en la mayoría de los casos, superaron los 100mm llegando hasta cerca de los 300mm en el partido de Carlos Casares correspondiente a la delegación Pehuajó. Esta situación retrasó el avance de la cosecha que actualmente se encuentra en un 30% del total implantado. Los rendimientos y el contenido de materia grasa son buenos.



Nuevamente la ocurrencia de precipitaciones de forma generalizada en la provincia demora el avance de la cosecha. El cultivo se encuentra en su totalidad en la etapa de madurez con la cosecha progresando en función de las condiciones de piso. La superficie trillada hasta la fecha representa el 67% del total sembrado. Los rendimientos obtenidos se sitúan en un rango de entre los 25 y 30 qq/ha.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Los mayores volúmenes ocurrieron en la zona norte que contempla la delegación General Pico. No obstante, en ambas delegaciones, el avance de la cosecha estuvo restringido a causa de las contingencias climáticas. A la fecha se reporta un total cosechado del 43% de la superficie sembrada, con rendimientos que oscilan entre los 14 y 22 qq/ha para la zona de la delegación General Pico, y entre 20 y 40 qq/ha para el área de la delegación Santa Rosa.



Durante la semana informada se registraron abundantes precipitaciones acompañadas de fuertes vientos impidiendo el avance de la cosecha en la delegación Casilda en donde aún hay cultivo en pie.



Los lotes implantados en el oeste provincial mantienen muy buenas condiciones evolucionando normalmente, con la mayoría de los planteos entre etapas de floración y llenado de granos.

MAÍZ



Hacia el norte de la provincia, la cosecha de los planteos tempranos avanza con buenos resultados y rindes destacados, en algunos casos superiores a 100 qq/ha, aunque con demoras puntuales por lluvias; en paralelo, los maíces tardíos se mantienen en muy buen estado y con perspectivas favorables. En el sudoeste, los maíces tempranos transitan etapas de llenado a madurez, próximos a generalizar la recolección. Más hacia el centro oeste, la cosecha progresa con buenos rindes, pero se ve condicionada por precipitaciones abundantes que, a su vez, benefician a los planteos tardíos. En el sudeste, las lluvias recientes aportaron alivio al cultivo que atraviesa el tramo final del ciclo tras un período seco. Por último, en el centro sur y este, el avance es dispar, con siembras tempranas afectadas por estrés hídrico previo y menores rindes esperados, mientras que los planteos tardíos presentan mejores perspectivas gracias a las últimas precipitaciones.



El cultivo presenta un estado general muy bueno a excelente, con los planteos tempranos en madurez y en plena cosecha, y los tardíos favorecidos por las recientes lluvias. En Marcos Juárez, el avance de recolección alcanza cerca del 70%, con rindes promedio de 95–100 qq/ha y picos de hasta 120–135 qq/ha en los mejores ambientes. San Francisco muestra un buen ritmo de cosecha, con valores entre 80 y 120 qq/ha, mientras que en Laboulaye los rendimientos se ubican entre 60 y 85 qq/ha. En Río Cuarto, las precipitaciones detuvieron momentáneamente la cosecha de los tempranos, pero mejoraron las perspectivas de los tardíos. Por su parte, en Villa María coexisten lotes en distintas etapas fenológicas, todos con muy buen estado general.



El cereal muestra una mejora en su estado general a partir de las lluvias recientes, que favorecen a los lotes que están en etapas críticas. En la delegación Charata, el cultivo transita entre floración y comienzo de llenado de granos con mejores perspectivas productivas, mientras que en Roque Sáenz Peña se desarrolla desde fases vegetativas hasta grano lechoso, con condiciones más favorables tras el alivio hídrico.



Las abundantes lluvias recientes detuvieron la cosecha de los últimos maíces de primera, que registran rindes cercanos a 72 qq/ha en la delegación Paraná, mientras que los planteos tardíos y de segunda se ven favorecidos por la mejora hídrica. En Rosario del Tala, la campaña se caracterizó por siembras y cosechas tempranas con rindes dispares, observándose además la incorporación de esquemas de doble cultivo de gruesa sobre lotes ya recolectados.



En Santa Rosa, los planteos de primera se encuentran mayormente en madurez (R6) y parte se destina a forraje, mientras que los tardíos y de segunda avanzan entre R2 y R5 en buenas condiciones, con humedad de suelo entre regular y adecuada. En el ámbito de la delegación General Pico, los maíces de primera transitan el final del llenado de granos, en tanto que los tardíos, entre floración y comienzo de llenado, son los más favorecidos por las lluvias recientes.



En Avellaneda, los planteos de segunda continúan mayormente en estado vegetativo, con algunos lotes en floración y una recuperación favorecida por las lluvias, aunque con presencia de gusano cogollero. En Casilda, las abundantes precipitaciones frenaron la cosecha del maíz temprano y mejoraron la condición de los tardíos, si bien no se esperan rindes destacados. Hacia Cañada de Gómez, la recolección venía avanzando con buen ritmo y promedios cercanos a 95 qq/ha, aunque también se vio interrumpida por las lluvias. En Rafaela, se destacan muy buenos rindes en los maíces tempranos, con picos de hasta 135 qq/ha, y excelentes condiciones en los tardíos. Por su parte, en Venado Tuerto, la cosecha continúa con resultados satisfactorios.



En el ámbito de la delegación Quimilí, el cereal presenta una buena recuperación tras haber atravesado estrés hídrico y altas temperaturas, encontrándose mayormente entre floración e inicio de llenado de granos, con buen estado general pese a algunos casos puntuales de resiembra por lluvias intensas.



En Jujuy, el cultivo transita etapas críticas de floración y llenado de granos con buen desempeño, favorecido por las precipitaciones y las adecuadas fechas de siembra. Por su parte, en Tucumán se observa un muy buen estado general, con algunos sectores puntuales afectados por anegamientos y monitoreos activos por chicharrita, aunque sin generar inconvenientes de relevancia hasta el momento.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo permanece en muy buen estado general transitando etapas entre floración y madurez en mayor proporción.

En Córdoba, el cultivo también mantiene buenas condiciones generales con la mayoría de los planteos en etapa de llenado con humedad adecuada para transitarla sin inconvenientes. En la zona de Marcos Juárez se realizaron aplicaciones de fungicidas de modo preventivo ante la posibilidad de apariciones de enfermedades propiciadas por la elevada humedad ambiental.

En la zona del NOA, el cultivo se encuentra, en su mayoría, en etapa de floración, en buenas condiciones.

POROTO

En Jujuy, el cultivo finalizó su siembra y avanza en etapas de crecimiento con buen estado general, mientras que en Salta la implantación se encuentra próxima a concluir. En el resto de las provincias productoras, el cultivo presenta un muy buen estado, favorecido por adecuadas condiciones de humedad.

SOJA



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada, han permitido la recuperación del estado de humedad de los suelos en prácticamente toda la provincia, favoreciendo principalmente al cultivo de soja de segunda que mayoritariamente se encuentra en la etapa de llenado.



Para el caso de las sojas de primera, la mayoría de los planteos transitan etapas entre llenado y madurez. Este cultivo se ha visto afectado por la elevada demanda ambiental y el déficit hídrico ocurrido durante los primeros meses del verano lo que ha provocado una importante pérdida de flores que podría incidir negativamente en el rendimiento potencial. Ya se visualizan los primeros signos de la madurez con amarillamiento de plantas. En la zona de Pergamino se han comenzado a cosechar los primeros lotes de siembra temprana de ciclos cortos, estimándose que en los próximos días las labores se generalicen. Los rendimientos obtenidos se ubicaron algo por debajo de lo esperado.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Las sojas de primera presentan buenas condiciones, en general, con los lotes más adelantados mostrando el amarillamiento característico de la madurez. En el caso de las sojas de segunda, la mayoría de los planteos se encuentran en la etapa de llenado, viéndose favorecidas por este último aporte hídrico. Este cultivo estuvo muy afectado por las adversas condiciones ocurridas durante los primeros meses del cultivo. A partir de la ocurrencia de lluvias se detuvo el deterioro, y en muchos casos se revirtieron los síntomas, pero se estima que la producción se ubique por debajo de los valores potenciales.



Nuevamente se registraron precipitaciones que, junto con el descenso de las temperaturas, traen alivio al cultivo que se encuentra atravesando etapas entre vegetativas e inicio de llenado con signos progresivos de mejora en el estado general.



Se han registrado precipitaciones de abundantes milimetrajes. Estas lluvias resultan beneficiosas y mejoran las perspectivas de rendimiento para las sojas de primera que se encuentran entre llenado e inicio de madurez. Respecto de las sojas de segunda, la mayoría de los planteos se encuentra en la etapa crítica que el cultivo sorteará sin limitantes hídricas.



Las precipitaciones registradas durante lo que va del año favorecieron el desarrollo y el ciclo de este cultivo y se observa en buen estado. Las sojas de primera se encuentran en etapas R5-R6 (formación de granos), mientras que los de segunda en R4 (vainas totalmente desarrolladas). La humedad en el suelo es adecuada. Se están haciendo aplicaciones para el control de isocas y chinche.



En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte provincial, se ha cosechado la soja de siembra temprana que representa una escasa superficie, con buenos resultados, aunque se estima que la mayor parte de la trilla de la soja de primera se iniciará en el mes de abril. El cultivo se encuentra en etapas entre floración y llenado, con un estado entre regular y malo, mejorando paulatinamente a partir de las últimas lluvias, pero con una merma en el rendimiento potencial.

En Rafaela, las últimas lluvias llevaron la humedad de los perfiles edáficos a niveles entre levemente excesivos y adecuados. Las sojas de primera se encuentran en etapas entre llenado e inicio de madurez, y las sojas de segunda entre fin de floración hasta llenado de granos, por lo que la adecuada disponibilidad de agua para transitar estas etapas críticas permite augurar una muy buena performance del cultivo, que en términos generales presenta un muy buen estado con excepción de algunos planteos al norte de la delegación.

En Cañada de Gómez, las sojas de primera se encuentran en madurez, y se estima que en los próximos días se inicie la cosecha. Las sojas de segunda se encuentran en etapas entre formación de grano hasta inicios de madurez en buen estado general sin presencia de plagas o enfermedades.

En la delegación Casilda las sojas de primera transitan las últimas etapas previas a la madurez comercial. Las primeras pruebas arrojan rendimientos cercanos a los 35 qq/ha, considerados buenos en función de la sequía que afectó al cultivo durante gran parte de la etapa reproductiva. Se prevén ciertos inconvenientes para la recolección de los primeros lotes dados los anegamientos temporales causados por las últimas lluvias. En el caso de las sojas de segunda ocupación, el panorama es muy variado con lotes donde las expectativas alcanzan los 30 qq/ha y otros que no superan los 5 qq/ha. Se estima que estas últimas lluvias impacten positivamente solamente en aquellos lotes de siembra tardía sobre trigo.

En la zona de Venado Tuerto, la cosecha avanza de manera sostenida, con rendimientos entre buenos y muy buenos en la mayoría de los lotes. Las precipitaciones recientes favorecieron la condición del cultivo y permitieron la reactivación de la trilla, registrándose una elevada entrega de lotes en los últimos días. Las soja de segunda están en la etapa fenológica R5 (inicio de formación de semillas) con buenas condiciones para el llenado.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial causando anegamientos temporales en zonas de los departamentos del oeste. El cultivo presenta muy buen estado habiendo transitado etapas críticas con buena disponibilidad hídrica augurando buenos resultados finales. La mayoría de los planteos se encuentran en llenado con una menor proporción de lotes más atrasados aún en floración.



El cultivo presenta muy buen desarrollo con lotes avanzando en etapas entre floración y llenado. La ausencia de precipitaciones durante la semana mejora la situación lo que permite realizar aplicaciones para tratamiento de enfermedades foliares.

SORGO GRANÍFERO

En el ámbito de la delegación Pergamino, en el norte de Buenos Aires, la cosecha avanza con buen ritmo y rindes acordes a lo esperado, aunque con algo de humedad en los granos.

En Córdoba, el cultivo mantiene un estado general aceptable a bueno, con planteos de primera en llenado y los tardíos entre etapas vegetativas y reproductivas, sin inconvenientes sanitarios relevantes. Se informa el inicio de la cosecha en el ámbito de la delegación Marcos Juárez.

En el ámbito de la delegación Rafaela, provincia de Santa Fe, se registró un leve avance de cosecha la que se detuvo por lluvias. Los rindes son muy buenos entre 45 y 60 qq/ha y el cultivo presenta muy buenas a excelentes condiciones. Los cuadros transitan llenado de grano y madurez. No se observan problemas sanitarios de importancia.




En Entre Ríos, la recolección progresa con resultados más ajustados y algunas dificultades por aves y enfermedades, en tanto que en Corrientes continúa de manera paulatina acompañando la madurez de los lotes.

Hacia el norte, en Jujuy y Santiago del Estero el cultivo transita etapas de floración a llenado de granos con buen desarrollo general, aunque en este último caso con un ciclo algo más atrasado. En conjunto, el panorama es favorable, aunque con marcada variabilidad entre regiones.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/02 %	26/02 %	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	350								
Río Cuarto	800								
San Francisco	148								
Villa María	400								
CÓRDOBA	1.348								
Charata	82.000			4	10	14	19		15.875
Pcia. R. S. Peña	39.580				18	31	59		23.249
CHACO	121.580			3	13	20	32		39.124
FORMOSA	4.000						20		800
SALTA	13.450								
SAN LUIS	3.950								
SANTA FE	145.600				5	6	7	12.100	9.625
Stgo. del Estero	82.740								
Stgo. del Estero (Quimilí)	78.920								
SANTIAGO DEL ESTERO	161.660								
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	0 0	0 0	1 0	5 0	7 3	11 4	12.100	49.550

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPANA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/02	26/02	05/03	12/03	19/03	26/03	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	11.000	21	30	44	51	62	67		7.370
	LF	77.800	22	29	42	51	61	66		51.348
T. CORRIENTES		88.800	22	29	42	51	61	66	0	58.718
R. S. Peña		5.500								
T. CHACO		5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.900				5	41	73		2.117
	LF	22.650				6	31	54		12.231
T. PARANÁ		25.550	0	0	0	6	32	56	0	14.348
R. DEL TALA	LA	10.000			10	23	33	43		4.300
	LF	20.000			10	22	32	42		8.400
T. R.DEL TALA		30.000	0	0	10	22	32	42	0	12.700
T. ENTRE RÍOS		55.550			5	15	32	49	0	27.048
FORMOSA		14.400				5	8	10		1.440
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	5	8	10	0	1.440
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	15.000	10	30	50	50	55	60		9.000
T. AVELLANEDA		16.500	9	27	45	45	50	55	0	9.000
RAFAELA	LA	350					5	7		25
	LF	14.300		2	10	35	55	60		8.580
T. RAFAELA		14.650	0	2	10	34	54	59	0	8.605
T. SANTA FE		31.150	5	15	29	40	52	57	0	17.605
TOTAL PAÍS	LA	25.750	11	16	26	33	44	54		13.812
	LF	169.650	11	16	25	34	46	54		90.999
TOTAL PAÍS		25/26 24/25	11 25	16 29	25 38	34 50	46 63	54 72	0	104.811

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/02 %	26/02 %	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900				10	15	35		2.065
Bolívar	85.648			1	22	42	53		45.042
Bragado	9.920			10	15	30	67		6.600
General Madariaga	95.500					27	35		33.549
Junín	6.350			5	27	58	86		5.461
La Plata	18.150			1	8	11	16		2.815
Lincoln	70.500				4	39	90		63.683
Pehuajó	102.259			3	17	45	74		75.355
Pergamino	6.000			14	36	79	100		6.000
Pigüé	90.000					3	3		2.700
Salliqueló	171.000				1	16	32		54.600
Tandil	225.264				3	10	18		41.404
Tres Arroyos	303.966				1	2	7		20.639
25 de Mayo	61.715				3	10	30	3.074	17.839
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.252.172 1.173.852	0 0	0 1	1 1	5 2	17 16	30 38	3.074	377.751
Laboulaye	103.615				5	25	45	1.300	46.627
Marcos Juárez	47.500	26	34	49	58	82	89		41.261
Río Cuarto	19.000					37	67		12.700
San Francisco	58.450	38	54	55	55	75	86		50.179
Villa María	30.350			10	24	50	70		21.151
CÓRDOBA 25/26 24/25	258.915 277.203	13 7	19 9	23 10	28 18	50 40	67 69	1.300	171.918
Paraná	13.400	75	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	82	87	95	100	100	100	960	17.040
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	79 89	93 100	97 100	100 100	100 100	100 100	960	30.440
General Pico	190.000				10	25	55	3.800	102.410
Santa Rosa	120.000			2	5	10	25		29.496
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	1 0	8 1	19 31	43 65	3.800	131.906
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	64	84	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000		21	31	50	67	67		5.360
Rafaela	192.600	98	99	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800		5	40	60	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	96 79	97 87	99 89	99 92	99 96	99 98	5.060	497.900
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	83	91	100	100	100	100	4.000	1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100		264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150			3	9	22	52		62.018
STGO. ESTERO	5.200							150	
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.104.151 2.413.081	37 19	38 20	39 21	42 23	51 39	61 59	19.874	1.887.057

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/02 %	26/02 %	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		22.600								
Bolívar		256.500					4	7	76.950	13.071
Bragado		179.750			5	8	11	21	10.245	34.782
General Madariaga		164.500					1	1		1.645
Junín		189.000				1	8	20	7.700	36.260
La Plata		58.700					5	9	24.240	2.977
Lincoln		320.000					2	5	27.000	14.504
Pehuajó		352.992					5	21	55.694	61.214
Pergamino		160.418			3	16	31	41	17.500	58.268
Pigüé		205.000								
Salliqueló		301.000						4	170.000	5.070
Tandil		326.197								
Tres Arroyos		391.495								
25 de Mayo		167.871						2	44.033	2.984
BUENOS AIRES	25/26	3.096.023	0	0	0	1	4	9	433.362	230.775
	24/25	3.130.724	0	0	0	1	2	6		
Laboulaye		546.856					5	10	18.641	52.822
Marcos Juárez		460.500		3	13	16	48	71	55.700	287.408
Río Cuarto		900.000				1	2	5		45.990
San Francisco		561.000				7	8	14	70.700	68.201
Villa María		440.000				4	4	9		38.984
CÓRDOBA	25/26	2.908.356	0	0	2	5	11	18	145.041	493.404
	24/25	2.563.297	0	0	0	1	4	9		
Paraná		153.400	72	78	83	86	88	88	1.900	134.047
Rosario del Tala		425.000	45	65	80	90	91	93	63.650	336.056
ENTRE RÍOS	25/26	578.400	51	68	81	89	90	92	65.550	470.103
	24/25	359.700	54	56	60	64	72	80		
General Pico		525.000								
Santa Rosa		250.000								
LA PAMPA	25/26	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25	706.000	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		144.280	16	20	21	21	21	21	8.350	28.545
Cañada de Gómez		290.000		2	13	19	46	67		193.111
Casilda		159.000	3	7	20	61	69	69		109.710
Rafaela		362.400	9	9	37	47	72	75	126.100	176.422
Venado Tuerto		235.500			2	5	15	25	12.000	55.875
SANTA FE	25/26	1.191.180	5	6	18	29	45	54	146.450	563.663
	24/25	781.643	4	9	14	19	34	44		
CATAMARCA		14.100								
CORRIENTES		10.220	71	79	94	97	99	99	1.240	8.890
CHACO (Charata)		111.000	11	16	18	20	21	21	5	23.309
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		162.710								
FORMOSA		36.000								
JUJUY		7.598								
MISIONES		33.000								
SALTA		285.191								
SAN LUIS		469.200								
STGO. ESTERO		155.125								
STGO. ESTERO (Quimilí)		640.600								
TUCUMÁN		74.230								
TOTAL PAÍS	25/26	10.547.933	3	4	7	9	14	18	791.648	1.790.144
	24/25	9.234.043	3	4	4	5	8	12		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/03/2026 al 26/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	36	64	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	20	80	50	40	10	-	A
	BRAGADO	-	-	-	7	93	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	24	76	11	74	15	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	6	94	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	73	27	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	6	94	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	37	63	10	77	13	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	5	95	-	40	60	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	25	75	5	85	10	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	8	88	4	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	6	94	-	85	15	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	32	68	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	37	63	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/03/2026 al 26/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	73	27	21	45	25	9	A
	BRAGADO	-	-	-	43	57	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	2	62	30	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	43	57	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	70	30	-	70	30	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	46	54	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	48	52	39	45	16	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	37	63	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	65	35	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	64	36	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	91	9	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	85	15	40	60	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	5	55	40	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	7	93	6	82	12	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	8	56	35	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	3	21	59	18	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	13	57	30	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	4	7	88	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	10	90	-	-	80	20	-	A
	SANTA ROSA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	43	27	-	30	8	36	25	32	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	79	16	5	-	A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	A
	RAFAELA	-	-	6	10	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	48	52	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	3	46	29	22	5	48	38	8	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	44	49	8	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	65	35	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	10	20	60	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	9	41	50	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	29	71	-	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	36	64	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	46	54	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	51	49	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/03/2026 al 26/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	96	4	29	57	13	1	-	-	10	90	-	15	50	30	5	A
	BRAGADO	-	-	-	90	10	-	94	6	-	-	-	-	100	-	-	88	12	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	88	12	1	60	39	-	-	-	25	75	-	-	15	66	18	A
	JUNÍN	-	-	-	83	17	97	3	-	-	-	-	20	80	-	96	2	2	-	A
	LA PLATA	-	-	-	75	25	-	57	43	-	-	-	75	25	-	-	62	38	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	56	44	-	100	-	-	-	-	8	92	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	42	46	12	-	-	-	23	77	-	44	46	10	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	8	92	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	11	89	-	-	93	7	-	-	-	31	69	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	81	19	-	74	26	-	-	-	64	36	-	1	59	40	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	94	6	-	41	52	7	-	-	40	60	-	-	-	24	76	A
25 DE MAYO	-	-	-	100	-	9	90	1	-	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	75	25	15	60	20	5	-	-	15	85	-	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	15	84	1	-	-	-	-	100	-	-	66	24	10	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	80	20	-	45	39	16	-	-	-	100	-	-	40	32	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	91	9	-	73	27	-	-	-	50	50	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	15	65	20	-	100	-	-	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	81	19	-	-	-	15	85	-	-	68	29	3	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	90	10	10	60	30	-	-	-	10	90	-	20	50	30	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	36	64	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	48	52	-	2	30	38	30	-	-	46	54	-	-	29	35	36	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	51	49	83	12	5	-	-	-	-	100	-	65	20	12	3	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	46	38	16	-	-	-	69	31	-	28	52	20	A
	RAFAELA	-	-	-	100	-	62	36	2	-	-	-	2	98	-	50	45	5	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	8	72	20	-	99	1	-	-	-	10	70	20	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	30	70	-	-	42	58	-	-	18	53	29	-	-	80	20	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	29	71	1	10	50	29	10	-	-	25	75	-	8	44	36	12	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	22	50	28	-	-	50	50	-	-	22	50	28	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	23	77	-	-	-	90	-	-	-	20	80	-	-	-	90	10	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/03/2026 al 26/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	38	62	-	-	100	-	-	-	-	36	64	-	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	41	59	-	-	100	-	-	-	-	34	66	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	-	21	79	-	-	97	3	-	-	-	32	68	-	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	13	67	20	-	100	-	-	-	-	10	69	21	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

