

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

9 de abril de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 9 de abril de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 09/04/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

Durante el periodo analizado se registraron acumulados superiores a 100mm en varias estaciones del SMN. Se destacan los montos registrados en localidades de Santa Fe: 214mm en Sunchales, 145mm en Rafaela, 143mm en Sauce Viejo, 114mm en Reconquista y 109mm en Ceres. Fuera de esta provincia, otros registros destacados son: 190mm en Ituzaingó (Corrientes), 127mm en Córdoba (capital), 112mm en Paraná (Entre Ríos), 111mm en Marcos Juárez (Córdoba) y 109mm en Santa Rosa de Conlara (San Luis).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 01/04/2026 al 07/04/2026.

Esta semana se esperan pocas precipitaciones en el país. Entre viernes y sábado se prevén algunos acumulados de lluvia en Mendoza y posibilidad de nieve en su zona cordillerana, además de algunas precipitaciones aisladas en San Luis y oeste de Córdoba. También entre viernes y sábado se esperan lluvias aisladas en el sur de Patagonia. Entre lunes y martes, podrían darse precipitaciones en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones debido a un sistema de baja presión que se desplaza por la zona.

TEMPERATURAS

En el periodo analizado la temperatura media fue superior a la normal en el noreste del país e inferior a lo normal en el noreste de Patagonia. Las máximas no llegaron a 40°C, siendo los registros más altos el de 39.5°C en Rivadavia (Salta) y 38.2°C en Las Lomitas (Formosa). Se reportaron heladas leves en Patagonia, con un mínimo de -5.3 en Maquinchao (Río Negro).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 01/04/2026 al 07/04/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a inferiores a lo normal en el centro y norte de Argentina, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal. Entre jueves y martes de la próxima semana se mantendrán condiciones de temperatura baja, sin grandes cambios, en el centro del país, mientras que en el norte podrían aumentar levemente entre sábado y domingo y luego disminuir. Entre sábado y domingo podría haber máximas sobre 30°C en el centro y oeste de Formosa. En Patagonia, entre jueves y sábado se espera un aumento de las temperaturas que disminuirán a partir del domingo y hasta el martes próximo con el ingreso de un sistema frontal frío.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Predominan las recargas que llevaron a excesos hídricos en lotes de soja en gran parte de las provincias pampeanas. Las lluvias fueron abundantes esta semana y la anterior, en tanto el consumo de agua disminuye progresivamente a medida que avanza el otoño. En Tucumán y noreste de San Luis también se observan excedentes hídricos generados por las últimas precipitaciones.

En el NOA las precipitaciones fueron menores, con excepción de Tucumán: se reportaron 60mm en la capital provincial y según datos extraoficiales habría acumulados muy superiores en el sur provincial.

En el NEA, dado a las lluvias registradas recientemente, ya no se observan áreas clasificadas como deficitarias. En la provincia de Corrientes y en el este de Formosa, también se estimaron excesos hídricos.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

La cosecha avanza con buen progreso en la delegación Roque Sáenz Peña, donde alcanza el 90% del área con rindes promedio de 19 qq/ha, mientras que en Avellaneda se inició con escaso avance y alta variabilidad en los rendimientos, viéndose interrumpida por lluvias. Hacia el norte del país, los cultivos transitan etapas de floración y llenado, como en Salta y Quimilí, con lotes en general en buen estado, aunque con menor potencial en siembras tardías. En Quimilí se destaca una fuerte caída de la superficie implantada en algunas zonas, asociada tanto a decisiones de mercado como a limitantes climáticas durante la siembra. Además, se registran problemas puntuales de plagas, principalmente picudo, y cierta heterogeneidad productiva.

ARROZ

El cultivo presenta un buen avance de cosecha a nivel país, con rendimientos en general normales a buenos y adecuada calidad de grano. No obstante, las precipitaciones recientes han provocado interrupciones y demoras en las labores, con situaciones de saturación hídrica más marcadas en Rosario del Tala. En el plano comercial, se observa estabilidad en los precios del largo fino y cierta mejora en largo ancho, en un contexto de incertidumbre por el incremento de costos productivos y las condiciones internacionales.

GIRASOL



Las lluvias ocurridas durante la semana impidieron avanzar con las labores de trilla de manera sostenida, estando suspendidas en las zonas con mayores registros. Inclusive, en muchos casos ha sucedido que parte de lo cosechado fue acopiado en silos bolsas en los campos por el mal estado de los caminos. Los rendimientos que se están obteniendo siguen siendo buenos a muy buenos. Ya cerca del 100% de los girasoles en pie están en etapa de madurez y se espera que se reinicie la recolección de lo que resta una vez que los lotes y caminos se oreen.



En la zona de las delegaciones Bolívar y Veinticinco de Mayo se observan lotes más demorados, con alta humedad y que aún no lograron la etapa de madurez por haber sido sembrados más tarde luego de las inundaciones hasta el mes de noviembre inclusive.



Finalizó la cosecha en el área de la delegación Marcos Juárez, resultando en una campaña muy buena para este cultivo, con rindes promedios zonales de 27- 30 qq/ha.

En el resto de la provincia las labores continuaron pero lentamente por las condiciones climáticas de lluvias y elevada humedad. Sólo resta levantar un 9% del área implantada. Los rindes obtenidos se encuentran por encima de los promedios de campañas previas.



Continúa la cosecha, ya en sus etapas finales y dependiendo fundamentalmente de las lluvias y alto porcentaje de humedad ambiente. Los rindes van desde 14 hasta 40 qq/ha según las zonas.



La ocurrencia de lluvias y lloviznas en esta última semana en casi todo el territorio provincial, frenó la recolección del cultivo, esperándose la mejora de las condiciones ambientales para proseguir con la misma. Los rendimientos obtenidos, hasta el momento, van desde los 12 hasta los 24 qq/ha en áreas de secano, mientras que en planteos bajo riego, los rindes alcanzan los 30 qq/ha.



Las últimas lluvias demoran el avance de la cosecha en la delegación Casilda. En el resto de la provincia, la trilla ya finalizó.



En la región oeste de la provincia, el cultivo se encuentra entre las etapas de llenado y madurez. Los suelos se encuentran saturados luego de las últimas lluvias, favoreciendo a los lotes que se encuentran aún llenando granos. El estado del cultivo es muy bueno sin presencia de plagas o enfermedades.

MAÍZ



Las lluvias recientes condicionan el desarrollo y la cosecha del cultivo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hacia el norte bonaerense, los planteos tardíos y de segunda muestran buena evolución y perspectivas, mientras que la cosecha de los tempranos se encuentra demorada por excesos hídricos, aunque con rindes buenos y cercanos o superiores a los promedios históricos; en el centro-oeste, se mantienen muy buenas condiciones para los planteos tardíos y de segunda, favorecidos por la humedad en el perfil, aunque persisten sectores anegados que dificultan el avance de la recolección; en el sudoeste, se registra el inicio de la cosecha con ritmo moderado en los planteos tempranos, mientras otros lotes transitan el final del llenado de granos; en el sudeste, las precipitaciones y temperaturas templadas favorecen a los maíces más atrasados; y en el sur y este, la cosecha avanza lentamente por condiciones climáticas adversas, con rindes iniciales moderados y heterogeneidad entre planteos tempranos afectados por estrés hídrico y tardíos con mejores perspectivas tras las lluvias.



La cosecha de planteos tempranos presenta distintos grados de avance; mientras en Marcos Juárez se encuentra próxima a finalizar, en Laboulaye supera el 25% y en San Francisco toma impulso con buenos resultados. Sin embargo, las lluvias recientes han frenado las labores en varias delegaciones, como Río Cuarto y Villa María.

Por su parte, los maíces tardíos y de segunda se encuentran completando el llenado de granos, con muy buen estado general y buenas perspectivas de rendimiento. Se destacan los altos rindes en San Francisco y Marcos Juárez, con valores que superan ampliamente los promedios en los mejores ambientes.



En la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo se desarrolla desde etapas vegetativas hasta grano lechoso, en condiciones más favorables.



En el ámbito de la delegación Paraná, las lluvias recientes mejoraron la disponibilidad hídrica, favoreciendo a los maíces tardíos y de segunda, que muestran buen estado y perspectivas de rendimiento.

En Rosario del Tala, el maíz de primera fue cosechado, mientras que los de segunda se presentan en buen estado, transitando etapas entre grano pastoso y maduración, con resultados mejores a los previstos inicialmente y una mayor superficie implantada respecto a lo estimado.



En Santa Rosa, los maíces tempranos se hallan mayormente en madurez, con algunos lotes destinados a picado para forraje, mientras que los tardíos y de segunda transitan etapas de llenado de granos en buenas condiciones.

Por su parte, en la delegación General Pico, los cultivos de primera se ubican en finales de llenado de granos y en algunos casos en madurez comercial, mientras que los lotes tardíos continúan en pleno llenado, manteniendo una evolución favorable hacia la cosecha.



En Avellaneda, el cultivo de segunda transita entre floración y llenado de granos, con muy buen estado general y perspectivas de mejora en el rendimiento a partir de las últimas lluvias. En Casilda, las intensas precipitaciones dificultan la finalización de la cosecha del maíz temprano y generan riesgos en los lotes pendientes, mientras que el maíz de segunda muestra buena disponibilidad hídrica, con mejor desempeño en siembras tardías y menor potencial en las tempranas por la sequía previa.

En Cañada de Gómez, la cosecha se encuentra momentáneamente suspendida por lluvias, con rindes promedios cercanos a 95 qq/ha. En Rafaela, el maíz temprano fue cosechado con muy buenos resultados con promedios entre 85 y 110 qq/ha y picos de hasta 140 qq/ha, mientras que los de segunda y tardíos presentan excelente evolución y altos rindes potenciales. Por último, en Venado Tuerto, la cosecha avanzó muy poco debido a las condiciones climáticas adversas.



En Quimilí, el cultivo transita mayormente el inicio de llenado de granos, con algunos lotes en floración, y buenas perspectivas productivas, aunque se registra un incremento reciente de daños por chicharrita (*Spiroplasma*), aún de impacto incierto. En el área de la delegación Santiago del Estero, la mayoría de los lotes se encuentran en grano lechoso, con buen estado sanitario general y sin daños significativos por la plaga, manteniéndose un monitoreo constante.



En Jujuy, el cultivo avanza en sus estadios finales de llenado de grano y grano lechoso; en Salta, se encuentra en etapas reproductivas, con buenos pronósticos de rendimiento.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, se encuentra, en su mayoría en la etapa de llenado de granos, en muy buenas condiciones generales, sin presencia de plagas o enfermedades. En la provincia de Córdoba, el cultivo presenta un muy buen estado general y buena carga de cajas por planta. A nivel provincial el 35% de la superficie ya presenta amarillamiento de hojas entrando en la etapa de madurez. Las adversas condiciones climáticas con ocurrencia de lluvias no permiten comenzar con la labor de arrancado en la zona de la delegación Marcos Juárez, en donde el cultivo está más avanzado, estimándose un 95% de los lotes en madurez. En la provincia de La Pampa, los lotes se encuentran entre floración y llenado de granos con buenas condiciones generales. En la zona del NOA, el cultivo continúa evolucionando normalmente y ya se encuentran transitando las etapas de floración a llenado, los más avanzados.

POROTO

En Jujuy, el cultivo se halla entre inicio de floración y etapas previas, con adecuada humedad en el perfil; en Salta, el poroto mung presenta los estadios más avanzados, con algunos lotes próximos a madurez, mientras que el resto se ubica entre siembra y crecimiento; y en la delegación Santiago del Estero, continúa la siembra, con lotes en crecimiento activo y un porcentaje en floración, manteniendo en general un muy buen estado sanitario.

SOJA



Nuevamente se registraron precipitaciones en toda la provincia con variado milimetraje, siendo más acentuadas en el norte provincial trayendo inconvenientes por anegamientos temporales y problemas en los accesos. Antes de la ocurrencia de las lluvias se pudo avanzar con la cosecha en el área de la delegación Pergamino y se inició incipientemente en la delegación Bolívar. En general, las sojas de primera de siembra temprana y ciclos cortos se encuentran en estado de madurez fisiológica, mientras que las de ciclo intermedio/largo se encuentran en llenado de grano, y las de segunda o de siembra tardía en formación de vainas / llenado de grano. Su evolución es muy buena gracias a las recurrentes precipitaciones de este último mes, estimándose muy buenos rindes generales.



Se inició la cosecha de lotes de soja de primera en la zona norte y centro del departamento Marcos Juárez, con muy buenos rindes del orden de los 40 a 45 qq/ha promedio, con picos de 60 qq/ha y valores de 35-40 qq/ha en lotes de escasa capacidad agrícola. Las sojas de segunda se encuentran en R6 – R7. Las lluvias al final del ciclo ayudaron a completar el llenado, pero están muy afectadas por las altas temperaturas y falta de humedad de enero y febrero, sumado a que arrancaron con muy poca agua en el perfil suelo. Se esperan rindes de 25 qq/ha en promedio. También se pudieron cosechar lotes aislados en el área de la delegación San Francisco, con rindes que varían entre 35 y 50 qq/ha.

Se espera una mejora en las condiciones climáticas para avanzar e iniciar la cosecha en el resto de la provincia.



En el ámbito de la delegación Charata el cultivo se encuentra en fase de llenado de granos, en su mayoría, y comienzo de maduración. Las lluvias hacia fines de la semana beneficiarán el proceso de carga y peso en los cuadros más retrasados que venían tolerando días de extremas temperaturas y sin lluvias. La zona centro sigue siendo la más afectada por estrés térmico e hídrico en la región con cuadros con baja carga y desarrollo de chauchas.



En la delegación Paraná las lluvias presentes desde la semana pasada han demorado la cosecha de los primeros lotes de soja de primera. El cultivo fue perjudicado en amplias zonas por el déficit hídrico que se presentó durante enero y parte de febrero, lo que resultaría en menores rendimientos. En el caso de la soja de segunda, esta pudo mostrar signos de recuperación de estado a partir de las últimas lluvias, esperando resultados cercanos al promedio histórico.

En la delegación Rosario del Tala, la soja de primera sigue su buena evolución favorecida por las lluvias. Las sojas de segunda presentan mejores perspectivas de rinde, encontrándose en etapa de llenado de vainas.



Las sojas de primera presentan buenas condiciones, en general, y se encuentran entre finales de formación de granos y comienzo de maduración, con un porcentaje ya en madurez comercial. Los lotes de segunda están en etapa de llenado de granos. Las precipitaciones registradas durante lo que va del año favorecieron el desarrollo y el ciclo de este cultivo que presenta un buen estado.



En la zona de Avellaneda, en el norte provincial, los lotes más adelantados se encuentran en R8 (madurez fisiológica). Las sojas tempranas presentan un buen a muy buen estado; en tanto que las tardías quedaron demasiado pequeñas, pero las lluvias que se dieron en las últimas semanas ayudarán con el llenado de granos.

En Rafaela comenzó la cosecha de lotes de soja de primera al inicio de la semana, registrando muy buenos rindes, de 35 a 42 qq/ha, que por precipitaciones abundantes se detuvo. Los lotes se encuentran en buen estado a excelente, transitando el fin de llenado de granos a madurez comercial. Las sojas de segunda están en etapas de llenado de grano e inicio de madurez con excesos hídricos debido a los elevados registros de precipitaciones. Las condiciones del cultivo son buenas a muy buenas, existiendo un bajo porcentaje regular a malo en el sector noreste de la delegación por los excesos de agua.

En Cañada de Gómez, también se recolectaron los primeros lotes de sojas de primera, siendo los rindes obtenidos muy buenos, con promedios de 40 qq/ha. Por las lluvias se suspendieron las labores. Las sojas de segunda se encuentran en etapas entre formación de grano hasta inicios de madurez en buen estado general y sin presencia de plagas o enfermedades.

Se paralizó la actividad de recolección en la delegación Casilda por las continuas lluvias que provocaron anegamientos de lotes bajos, siendo lento el escurrimiento de las zonas planas, en donde se encuentra implantada gran parte de la soja de mayor potencial de rendimiento. Si bien se estaban logrando promedios de rinde mejores a los estimados tras la fase de sequía, el riesgo de pérdidas cuantitativas y de calidad comercial se incrementa a medida que se prolonga el clima lluvioso y húmedo. Las sojas de segunda más tardías están finalizando su etapa de llenado de granos, en tanto que ya están madurando los cuadros más precoces. Se observó un cambio importante en las expectativas de producción a medida que comenzó a llover post fase seca, pero en algunos casos las precipitaciones fueron muy tardías como para revertir la afectación de los lotes.

También en la zona de la delegación Venado Tuerto, la cosecha está detenida por malas condiciones climáticas.



Se informa la cosecha de los primeros lotes de soja en departamentos del oeste de la provincia. Las altas temperaturas hicieron que se acelerara la evolución fenológica, por lo que ya hay algunos lotes comenzando la madurez comercial, pero la mayoría está en llenado de granos. En general, los lotes presentan un buen estado.




El cultivo se encuentra en la etapa reproductiva y definitiva de rendimiento (floración y llenado de granos) con excelente disponibilidad de humedad. Comenzó la cosecha en lotes de riego sembrados en noviembre en el departamento de Anta, provincia de Salta.

SORGO GRANÍFERO

A nivel país, el cultivo presenta una evolución favorable, con lotes entre etapas reproductivas, llenado de granos y madurez, buen estado sanitario y avances de cosecha condicionados en algunos casos por lluvias. Laboulaye muestra un estado aceptable con un 20% de la superficie en madurez, mientras que en San Francisco predominan los estadios de grano pastoso y lechoso sin problemas sanitarios. Rafaela se destaca por muy buenas condiciones y rindes elevados, aunque con cosecha interrumpida, en tanto que Avellaneda presenta lotes de regular a buenos con presencia de cogollero y Cañada de Gómez evoluciona sin inconvenientes, con cuadros en llenado y algunos en madurez. En Corrientes la cosecha avanza, mientras que en Paraná se registran demoras por lluvias y en Rosario del Tala el progreso alcanza cerca del 60% con maduración despareja y rindes mejores a lo esperado. En las delegaciones de Santiago del Estero y Quimilí el cultivo se mantiene en buen estado entre grano lechoso y llenado, con algunos planteos más atrasados, mientras que en Jujuy y Salta continúan en etapas reproductivas en condiciones generales favorables.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	350									
Río Cuarto	800									
San Francisco	148									
Villa María	400									
CÓRDOBA	1.348									
Charata	82.000	4	10	14	19	24	30		24.600	
Pcia. R. S. Peña	39.580		18	31	59	78	91		36.018	
CHACO	121.580	3	13	20	32	42	50		60.618	
FORMOSA	4.000				20	22	50		2.000	
SALTA	13.450									
SAN LUIS	3.950									
SANTA FE	145.600	5			6	7	9	10	12.100	13.350
Stgo. del Estero	82.740									
Stgo. del Estero (Quimilí)	78.920									
SANTIAGO DEL ESTERO	161.660									
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	451.938 687.925	1 0	5 0	7 3	11 4	14 5	17 9	12.100	75.968

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/03	12/03	19/03	26/03	01/04	09/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	11.000	44	51	62	67	72	76		8.360
	LF	77.800	42	51	61	66	71	75		58.350
T. CORRIENTES		88.800	42	51	61	66	71	75	0	66.710
R. S. Peña		5.500					20	50		2.750
T. CHACO		5.500	0	0	0	0	20	50	0	2.750
PARANA	LA	2.900		5	41	73	90	100		2.900
	LF	22.650		6	31	54	72	81		18.347
T. PARANÁ		25.550	0	6	32	56	74	83	0	21.247
R. DEL TALA	LA	10.000	10	23	33	43	61	68		6.800
	LF	20.000	10	22	32	42	57	59		11.800
T. R.DEL TALA		30.000	10	22	32	42	59	62	0	18.600
T. ENTRE RÍOS		55.550	5	15	32	49	66	72	0	39.847
FORMOSA		14.400		5	8	10	20	50		7.200
T. FORMOSA		14.400	0	5	8	10	20	50	0	7.200
AVELLANEDA	LA	1.500						5		75
	LF	15.000	50	50	55	60	70	85		12.750
T. AVELLANEDA		16.500	45	45	50	55	64	78	0	12.825
RAFAELA	LA	350			5	7	30	45		158
	LF	14.300	10	35	55	60	90	95		13.585
T. RAFAELA		14.650	10	34	54	59	89	94	0	13.743
T. SANTA FE		31.150	29	40	52	57	75	85	0	26.568
TOTAL PAÍS	LA	25.750	26	33	44	54	65	71		18.293
	LF	169.650	25	34	46	54	65	74		124.782
TOTAL PAÍS 25/26		195.400	25	34	46	54	65	73	0	143.074
TOTAL PAÍS 24/25		232.125	38	50	63	72	80	86		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900		10	15	35	50	55		3.245
Bolívar	85.648	1	22	42	53	66	71		60.810
Bragado	9.920	10	15	30	75	92	92		9.126
General Madariaga	95.500			27	35	40	46		43.930
Junín	6.350	5	27	58	86	86	86		5.461
La Plata	18.150	1	8	11	16	19	21		3.812
Lincoln	70.500		4	39	90	98	99		69.795
Pehuajó	102.259	3	17	45	74	93	99		101.236
Pergamino	6.000	14	36	79	100	100	100		6.000
Pigüé	90.000			3	3	30	50		45.000
Saliqueló	171.000		1	16	32	45	55		94.050
Tandil	225.264		3	10	18	50	71		159.937
Tres Arroyos	303.966		1	2	7	26	62		188.459
25 de Mayo	61.715		3	10	30	65	81	3.074	47.499
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.252.172 1.173.852	1 1	5 2	17 16	30 38	50 67	67 85	3.074	838.361
Laboulaye	103.615		5	25	45	80	90		93.254
Marcos Juárez	47.500	49	58	82	89	95	100	1.300	46.200
Río Cuarto	19.000			37	67	90	90		17.100
San Francisco	58.450	55	55	75	86	87	88		51.436
Villa María	30.350	10	24	50	70	83	84		25.494
CÓRDOBA 25/26 24/25	258.915 277.203	23 10	28 18	50 40	67 69	85 80	91 90	1.300	233.484
Paraná	13.400	100	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	95	100	100	100	100	100	960	17.040
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	97 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	960	30.440
General Pico	190.000		10	25	55	85	94	3.800	175.028
Santa Rosa	120.000	2	5	10	25	71	90		108.000
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	1 0	8 1	19 31	43 65	80 72	92 85	3.800	283.028
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	100	100	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000	31	50	67	67	74	74		5.950
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800	40	60	100	100	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	99 89	99 92	99 96	99 98	99,6 98	99,6 99	5.060	498.490
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150	3	9	22	52	64	64		76.494
STGO. ESTERO	5.200							150	
STGO. ESTERO (Quimili)	118.004	100	100	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.104.151 2.413.081	39 21	42 23	51 39	61 59	75 76	83 89	19.874	2.575.421

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	22.600			4	7	12	14	76.950	25.137
Bolívar	256.500								
Bragado	179.750	5	8	11	21	37	37	11.678	62.187
General Madariaga	164.500			1	1	2	4		6.580
Junín	189.000		1	8	20	23	23	7.700	42.424
La Plata	58.700			5	9	15	16	24.240	5.514
Lincoln	320.000			2	5	10	12	27.000	35.160
Pehuajó	352.992			5	21	26	33	55.694	98.108
Pergamino	160.418	3	16	31	41	48	50	17.500	71.459
Pigüé	205.000								
Salliqueló	301.000				4	7	13	170.000	17.030
Tandil	326.197					8	9	23.900	27.207
Tres Arroyos	391.495								
25 de Mayo	167.871				2	5	7	44.033	8.669
BUENOS AIRES 25/26 24/25	3.096.023 3.130.724	0 0	1 1	4 2	9 6	13 13	15 19	458.695	399.474
Laboulaye	546.856			5	10	20	25	18.641	132.054
Marcos Juárez	460.500	13	16	48	71	82	89	55.700	360.272
Río Cuarto	900.000		1	2	5	15	15		135.000
San Francisco	561.000		7	8	14	16	17	70.700	83.351
Villa María	440.000		4	4	9	14	14		62.788
CÓRDOBA 25/26 24/25	2.908.356 2.563.297	2 0	5 1	11 4	18 9	26 13	28 19	145.041	773.465
Paraná	153.400	83	86	88	88	88	88	1.900	133.320
Rosario del Tala	425.000	80	90	91	93	93	93	63.650	336.056
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	578.400 359.700	81 60	89 64	90 72	92 80	92 83	92 83	65.550	469.376
General Pico	525.000								
Santa Rosa	250.000								
LA PAMPA 25/26 24/25	775.000 706.000						0 0	0	0
Avellaneda	144.280	21	21	21	21	21	21	8.350	28.545
Cañada de Gómez	290.000	13	19	46	67	78	85		246.500
Casilda	159.000	20	61	69	69	73	73		116.213
Rafaela	362.400	37	47	72	75	81	84	126.100	198.492
Venado Tuerto	235.500	2	5	15	25	40	50	12.000	111.750
SANTA FE 25/26 24/25	1.191.180 781.643	18 14	29 19	45 34	54 44	62 51	67 63	146.450	701.500
CATAMARCA	14.100								
CORRIENTES	10.220	94	97	99	99	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	18	20	21	21	21	21	5	23.598
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.710								
FORMOSA	36.000								
JUJUY	7.598								
MISIONES	33.000					10	20		6.600
SALTA	285.191								
SAN LUIS	469.200					1	1	36.650	4.931
STGO. ESTERO	155.125								
STGO. ESTERO (Quimili)	640.600								
TUCUMÁN	74.230								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	10.547.933 9.234.043	7 4	9 5	14 8	18 12	23 16	25 21	853.631	2.387.923

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/03 %	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	14.700								
Bolívar	3.350								
Bragado	1.220								
General Madariaga	450								
Junín	7.400								
La Plata	13.350								
Lincoln	25.000								
Pehuajó	2.672								
Pergamino	10.500			7	13	30	40		4.200
Pigüé	9.000								
Salliqueló	8.100								
Tandil	550								
Tres Arroyos	5.325								
25 de Mayo	7.752								
BUENOS AIRES 25/26	109.369	0	0	1	1	3	4	0	4.200
24/25	116.248	0	0	1	3	3	6		
Laboulaye	8.930								
Marcos Juárez	21.400				2	2	2	2.000	388
Río Cuarto	16.700								
San Francisco	85.000								
Villa María	34.700								
CÓRDOBA 25/26	166.730	0	0	0	0,2	0,2	0,2	2.000	388
24/25	191.632	0	0	0	0	2	4		
Paraná	35.500		13	34	63	72	82	2.100	27.388
Rosario del Tala	43.000	10	20	30	40	60	60	1.750	24.750
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	6	17	32	50	65	70	3.850	52.138
24/25	108.500	3	5	20	26	40	60		
General Pico	12.900								
Santa Rosa	14.600								
LA PAMPA 25/26	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	26.390	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	39.700	6	8	8	8	8	8	13.850	2.104
Cañada de Gómez	12.000								
Casilda	15.000								
Rafaela	68.300			20	26	59	74	36.100	23.828
Venado Tuerto	5.000					5	8		400
SANTA FE 25/26	140.000	2	2	9	12	24	29	49.950	26.332
24/25	222.702	1	2	5	13	26	42		
CATAMARCA	1.500								
CORRIENTES	6.020	4	13	26	46	56	73	3.220	2.044
CHACO (Charata)	43.000			1	1	2	4		1.720
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	46.480								
FORMOSA	32.000								
JUJUY	2.252								
MISIONES	0								
SALTA	35.465								
SAN LUIS	23.820								
STGO. ESTERO	73.300								
STGO. ESTERO (Quimili)	64.560								
TUCUMÁN	14.200								
TOTAL PAÍS 25/26	864.696	0,7	2	4	6	9	11	59.020	86.822
24/25	1.005.799	0,6	1,2	4	6	11	18		


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/04/2026 al 09/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	9	91	50	40	10	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	11	74	15	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	6	94	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	73	27	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	1	99	10	77	13	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	40	60	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	5	95	6	84	10	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	1	99	-	85	15	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	94	6	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	16	84	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	54	46	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/04/2026 al 09/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	68	32	21	45	25	9	A
	BRAGADO	-	-	-	32	68	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	53	47	3	60	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	23	77	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	60	40	-	70	30	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	25	75	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	46	54	39	45	16	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	35	65	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	48	52	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	27	73	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	38	62	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	79	21	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	50	50	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	45	55	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	3	97	6	82	12	-	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	62	38	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	11	63	26	4	74	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	57	43	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	12	88	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	88	12	-	80	20	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	89	11	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	35	35	30	7	36	25	32	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	8	92	79	16	5	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	22	78	4	49	29	18	E/A
	RAFAELA	-	-	-	15	85	66	34	-	-	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	18	80	2	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	17	61	22	9	43	40	8	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	23	49	28	-	-	50	50	-	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	-	15	85	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	20	10	70	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	31	69	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	85	15	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	14	86	-	-	71	29	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	28	71	1	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 02/04/2026 al 09/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad			
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General						
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	88	12	29	57	13	1	-	-	-	-	97	3	15	50	30	5	A
	BRAGADO	-	-	-	50	50	-	96	4	-	-	-	-	96	4	-	86	14	-	A	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	68	32	1	60	39	-	-	-	-	100	-	-	15	67	18	A	
	JUNÍN	-	-	-	70	30	97	2	1	-	-	-	-	98	2	96	4	-	-	A	
	LA PLATA	-	-	-	65	35	-	57	43	-	-	-	28	72	-	-	62	38	-	E/A	
	LINCOLN	-	-	-	1	99	-	100	-	-	-	-	-	-	87	13	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	50	50	42	47	11	-	-	-	8	92	-	44	46	10	-	E/A	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	59	41	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	50	50	25	50	25	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	88	12	-	93	7	-	-	-	-	8	92	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	75	25	-	74	26	-	-	-	-	-	100	-	1	59	40	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	21	79	-	41	52	7	-	-	-	-	74	26	-	-	23	77	A
25 DE MAYO	-	-	-	95	5	5	85	10	-	-	-	-	-	100	-	5	83	12	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	60	40	15	60	20	5	-	-	-	-	100	-	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	15	84	1	-	-	-	-	-	98	2	-	66	24	10	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	30	70	-	45	39	16	-	-	-	-	97	3	-	41	31	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	34	66	-	73	27	-	-	-	-	11	86	3	-	63	37	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	58	42	-	100	-	-	-	-	-	6	66	28	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	96	4	-	81	19	-	-	-	-	-	100	-	-	68	29	3	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	88	12	10	60	30	-	-	-	-	-	98	2	20	50	30	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	80	20	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	98	2	-	100	-	-	-	-	-	-	99	1	-	36	64	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	11	85	4	2	30	38	30	-	-	-	15	85	-	-	29	35	36	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	83	12	5	-	-	-	-	-	64	36	65	21	12	2	E/A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	46	38	16	-	-	-	-	15	85	-	28	52	20	E/A
	RAFAELA	-	-	-	56	44	62	36	2	-	-	-	-	-	98	2	50	45	4	1	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	97	3	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	46	54	-	99	1	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	30	60	10	-	42	58	-	-	-	-	43	57	-	-	80	20	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	3	87	10	17	40	34	9	-	-	-	1	84	15	11	45	35	9	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	3	50	47	-	-	50	50	-	-	-	-	3	50	47	-	50	50	-	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	-	71	29	-	-	100	-	-	-	-	-	75	25	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/04/2026 al 09/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	6	91	3	-	100	-	-	-	-	4	94	2	-	100	-	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	17	83	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	81	19	-	100	-	-	-	-	-	88	12	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	-	90	10	-	97	3	-	-	-	-	99	1	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	53	47	-	100	-	-	-	-	-	49	51	-	100	-	-	A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

