



Informationen zur Haartransplantation Vorsorge & Nachsorge

Information about Hair Transplantation
Pre- and Post-Operative Care

Vorsorge

1 Woche vor der Haartransplantation

- Blutverdünnende Medikamente absetzen (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Marcumar) – nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt!
- Kein Alkohol konsumieren.
- Kein Rauchen oder E-Zigarette (mindestens reduzieren, besser ganz weglassen), da dies die Durchblutung und Heilung verschlechtert.
- Haarwuchsmedikamente (z. B. Minoxidil) nach Absprache eventuell pausieren.

2–3 Tage vor der Haartransplantation

- Kein Kaffee, schwarzer Tee oder Energydrinks, da Koffein die Blutung verstärken kann.
- Keine aufwendigen Frisuren, Haarspray oder Styling-Produkte mehr nutzen.
- Gut und ausgewogen essen, ausreichend trinken (Wasser!).

Am Tag der Haartransplantation

- Haare bitte frisch gewaschen und frei von Styling-Produkten.
- Frühstück ist erlaubt und empfohlen – aber nur leicht und nicht fettig.
- Keine Parfüms, Lotionen oder Aftershaves auf Kopf oder Gesicht verwenden.
- Medikamente nur nach Absprache einnehmen.
- Einen bequemen Kapuzenpulli oder Hemd mit Knöpfen tragen.
- Organisieren Sie Ihre Heimfahrt (Sie sollten nach dem Eingriff nicht selbst Auto fahren).



Bitte lassen Sie vor der OP Ihren Blutdruck kontrollieren – erhöhter Blutdruck bleibt oft unbemerkt und kann den Eingriff beeinflussen.



Teilen Sie unseren Ärzten bitte frühzeitig mit, wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen

Tag der OP

1. Empfang & Vorbereitung

- Aufnahme der persönlichen Daten
- Blutentnahme, Blutdruckmessung und kurze Gesundheitskontrolle
- Patient erhält eine ausführliche Nachsorgeanleitung (mündlich und schriftlich)
- Anlegen der OP-Kleidung

2. Planung

- Planung und Zeichnen der Haarlinie und des Entnahme-/Empfangsbereichs
- Rasur der Spender- und Empfängerbereiche (falls notwendig)
- Lokale Betäubung wird gesetzt (kleine Injektionen, meist gut erträglich)

3. Entnahme der Grafts

- Die Haarfollikel werden mit der FUE - Methode schonend entnommen
- Die Grafts werden gezählt, sortiert und aufbereitet

4. Pause

- Kurze Pause mit Snacks/Getränken, je nach OP-Dauer

5. Einsetzen der Grafts

- Vorbereitung und Betäubung des Empfängerbereichs
- Kanalöffnung und Einsetzen der vorbereiteten Grafts in natürlicher Wuchsrichtung mit Saphir oder DHI-Technik

6. Abschluss & Kontrolle

- Endkontrolle des Ergebnisses
- Anlegen eines leichten Verbands im Spenderbereich
- Entlassung

Nach der OP

Medikation

- Prednisolon 20 mg: 1 Tablette für 3 Tage.
- Doxycyclin 200 mg: 1 Tablette für 5 Tage.
- Ibuprofen 600 mg (bei Bedarf)
- Fynzur 2,275 mg/ml Spray (freiwillig ab dem 12. Tag) 1 Pumpstoß täglich.

Schlafen und Körperhaltung

- Schlafen Sie für die nächsten 8 Tage auf dem Rücken mit Nackenkissen.
- In den ersten 2–3 Tagen ist es wichtig, den Kopf nicht nach vorne zu neigen, um Schwellungen zu vermeiden.

Schutz der Grafts

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Ein- und Aussteigen aus Autos oder anderen engen Bereichen, um den Kopf nicht zu stoßen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitze und Regen in den ersten 10 Tagen.
- Tragen Sie keine Mützen, Hüte oder Helme in den ersten 12 Tagen nach der Operation.

Sport und körperliche Aktivitäten

- Verzichten Sie in den ersten 15 Tagen auf anstrengende Aktivitäten.
- Leichter Sport wie Joggen ist nach etwa zwei Wochen erlaubt, aber vermeiden Sie schweres Heben oder Krafttraining für mindestens sechs Wochen.

Ernährung und Lebensstil

- Vermeiden Sie in der ersten Woche scharfe oder stark salzhaltige Speisen.
- Verzichten Sie möglichst zwei Wochen lang auf Nikotin und Alkohol – beides kann die Durchblutung und Regeneration der Transplantate negativ beeinflussen.
- Achten Sie darauf, ausreichend Wasser zu trinken, um den Heilungsprozess optimal zu unterstützen.

Haarwäsche

Die erste Haarwäsche erfolgt am **zweiten Tag nach der Haartransplantation**.
Anschließend führen Sie die Haarwäsche **täglich für insgesamt 10 Tage** durch.

Bitte senden Sie uns **nach jeder Haarwäsche** aktuelle Fotos Ihres Kopfes – sowohl vom **Spender-** als auch vom **Empfängerbereich** – entweder per WhatsApp an +49 172 2888879 oder per E-Mail an info@dionhairclinic.de

Waschanleitung Tag 1 - 9

1. Schritt:

- Tragen Sie das Bepanthen Schaumspray gleichmäßig auf den Empfänger- und Spenderbereich auf.



2. Schritt:

- Drücken Sie den Schaum im Empfängerbereich vorsichtig mit der flachen Handinnenfläche an.
- Im Spenderbereich (Hinterkopf) dürfen Sie den Schaum sanft einmassieren.
- Lassen Sie den Schaum für ca. 30 min einwirken.



3. Schritt

- Spülen Sie den Schaum anschließend vorsichtig mit lauwarmem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, keinen harten Wasserstrahl zu verwenden.



4. Schritt

- Nehmen Sie eine kleine Menge des Shampoos und schäumen Sie es in den Händen mit lauwarmem Wasser auf.



5. Schritt

- Drücken Sie den Schaum im Empfängerbereich vorsichtig mit der flachen Handinnenfläche an.
- Lassen Sie das Shampoo für 1 min einwirken



6. Schritt

- Spülen Sie den Schaum nun vorsichtig mit lauwarmem Wasser ab.
- Trocknen Sie die Kopfhaut anschließend an der Luft oder tupfen Sie sie vorsichtig mit Küchenpapier ab.
- Bitte verwenden Sie kein Handtuch und kein Toilettenpapier.



Waschanleitung Tag 10

1. Schritt:

- Tragen Sie das Bepanthen Schaumspray gleichmäßig auf den Empfänger- und Spenderbereich auf.



2. Schritt:

- Massieren Sie den Schaum in die Kopfhaut ein.
- Lassen Sie den Schaum für ca. 30 min einwirken.



3. Schritt

- Reiben Sie die Krusten mit Ihren Fingerkuppen oder Handflächen in kreisenden Bewegungen weg.
- Sie dürfen die Krusten keineswegs wegkratzen.




Haarwäsche nach dem 10. Waschtage

Die Haare können wieder wie gewohnt gewaschen werden. Für die weitere Pflege empfehlen wir unser **„Dion Daily Hair Shampoo“**, das für transplantiertes Haar entwickelt wurde. Alternativ können auch PH-neutrale Produkte verwendet werden.

Weitere Informationen

Haarwachstumsverlauf



Hinweis: Im Durchschnitt wachsen etwa **85–95 %** der transplantierten Grafts dauerhaft an. Das Wachstum beginnt meist nach 3–4 Monaten, erreicht nach 6–9 Monaten rund 70–80 % des Endergebnisses und gilt nach etwa 12 Monaten (manchmal bis 18 Monaten) als abgeschlossen. Unterschiede zwischen vorderem Bereich und Tonsur sind normal – in der Tonsur liegt die Anwuchsrate meist etwas niedriger.

Phase	Zeitraum nach OP	Prozess	Typische Erscheinungen & Symptome
Heilungsphase	0–7 Tage	Wundheilung & Verankerung der Grafts	Rötung, Krustenbildung, Schwellung, Spannungsgefühl, Jucken. Grafts empfindlich, nicht reiben oder kratzen.
Shock-Loss-Phase	2–4 Wochen	Ausfallen der transplantierten Haare	Haare fallen aus (Haarschaft), Wurzeln bleiben. Kopfhaut normalisiert sich, evtl. kleine Pickel oder Trockenheit.
Ruhephase (Telogenphase)	1–3 Monate	Follikel ruhen	Keine sichtbaren Veränderungen, Gefühl des Haarausfalls, Kopfhaut evtl. empfindlich.
Erste Wachstumsphase	3–6 Monate	Beginn des neuen Haarwachstums	Erste feine, weiche Haare sprießen, oft ungleichmäßig. Jucken oder Kribbeln beim Durchbruch möglich.
Verdichtungsphase	6–9 Monate	Verstärktes Wachstum & Verdichtung	Haare werden kräftiger, dichter. Wachsende Fülle, Unterschiede zwischen Bereichen möglich.
Reifephase / Endphase	9–12 (bis 18) Monate	Endgültige Haarstruktur & Dichte	Haare kräftig, dicht, natürlich. Tonsur erreicht oft später volle Dichte. Anwuchsrate ca. 85–95%.

Tätigkeiten

Beschreibung	Empfohlen nach...
Stylingprodukte (Haargel, Haarwachs, Haarspray)	Spenderbereich: 1 Monat Empfängerbereich: 6 Monate Bestehendes Haar: 2 Wochen
Haare föhnen	1. Monat: Gar nicht 2. Monat: Kaltes Föhnen Ab 3. Monat: Freigestellt
Haare glätten	3 Monate
Haare schneiden (Schere)	Spenderbereich: 1 Woche Empfängerbereich: 2 Wochen
Haare schneiden (Rasierer)	Spenderbereich: 2 Wochen Empfängerbereich: 3 Monate
Haare färben	Empfängerbereich: 6 Monate Bestehendes Haar: 1 Woche
Haarpuder / Streuhaar	3 Monate
Ohne Nackenkissen schlafen	Nach 8 Tagen
Auf dem Bauch schlafen	Nach 10 Tagen
Alkohol	2 Wochen
Zigaretten	2 Wochen
Geschlechtsverkehr	3 Tage
Sport leicht (Joggen, Fahrrad)	2 Wochen
Sport mittel (Fitness, Fußball)	4 Wochen
Sport schwer (Krafttraining)	6 Wochen
Arbeit im Bau / als Koch	2 Wochen
Schwimmen	6 Wochen
Solarium	6 Wochen
Sauna	6 Wochen
Motorradhelm (kurzzeitig)	1 Monat

Beschreibung

Motorradhelm (langzeitig)

Sonneneinstrahlung /
Strandurlaub

Badewanne

Jegliche Kopfbedeckung

Perücke

Tauchen

Minoxidil

Empfohlen nach...

3 Monate

-10°C–23°C: Keine
Kopfbedeckung
24°C–39°C: 14 Tage
Kopfbedeckung
ab 40°C: 1 Monat
Kopfbedeckung

2 Wochen

2 Wochen

6 Monate

1 Monat

2 Wochen

Typische Erscheinungen

Beschreibung

Pickel

Rötungen

Juckreiz

Schwellungen

Blaue Flecken

Kann auftreten bis...

Bis 12 Monate
(meist Monat 1–4)

2 Wochen – 3 Monate

Max. 3 Monate

Max. 1 Woche

1–2 Wochen

Behandlungen

Behandlung

Pigmentierung (Empfänger)

Pigmentierung (Spender)

Pigmentierung (bestehendes Haar)

Empfohlen nach...

8 Monate

3 Monate

3 Monate

Behandlung

PRP-Behandlung

Zweite Operation

Zweite Operation (Verdichtung)

Empfohlen nach...

Nach 2 Wochen

9 Monate

12 Monate