

# INTRODUCCIÓN A LA VARIABLE COMPLEJA

¡BIENVENID@S! NÚMEROS COMPLEJOS (REPASO). FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA. LÍMITE Y CONTINUIDAD. DIFERENCIABILIDAD Y FUNCIONES ANALÍTICAS. INTEGRACIÓN EN EL CAMPO COMPLEJO. SUCESIONES Y SERIES.

---

Manuel Carlevaro

Departamento de Ingeniería Mecánica  
Grupo de Materiales Granulares - UTN FRLP  
manuel.carlevaro@gmail.com

## Docentes:

- ▶ Profesor: Manuel Carlevaro
- ▶ Ayudante de Primera: Christian Molina

## Clases:

- ▶ Miércoles de 17:00 a 19:15
- ▶ Teoría + práctica
- ▶ Clases de consulta:
  - › MC: Miércoles 15 a 16 hs.
  - › CM: A coordinar.

## Evaluación:

- ▶ Parciales 2 (+ 2 recuperatorios) + Instancia evaluativa complementaria (febrero 2026)
- ▶ Aprobación directa: 2 parciales ( $\geq 6$ )
- ▶ Aprobación no directa - examen final: al menos un parcial con 4 o 5

1. Introducción a la variable compleja (2 clases)
2. Transformada y serie de Fourier (2 clases)
3. Transformada de Laplace (1 clase)
4. Errores en el cálculo numérico (1 clase)
5. Cálculo de raíces: soluciones de una variable (2 clases)
6. Normas de vectores y matrices (2 clases)
7. Autovalores y autovectores (2 clases)
8. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales (2 clases)
9. Aproximación discreta y continua por el método de los mínimos cuadrados (dos clases)
10. Resolución de problemas de valor inicial (dos clases)
11. Resolución de problemas de contorno (dos clases)
12. Resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden mediante diferencias finitas (2 clases)

1. Introducción a la variable compleja (2 clases)
2. Transformada y serie de Fourier (2 clases)
3. Transformada de Laplace (1 clase)
4. Errores en el cálculo numérico (1 clase)
5. Cálculo de raíces: soluciones de una variable (2 clases)
6. Normas de vectores y matrices (2 clases)

Primer parcial: 25/6,  
recuperatorios: 16/7 y 6/8.

7. Autovalores y autovectores (2 clases)
8. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales (2 clases)
9. Aproximación discreta y continua por el método de los mínimos cuadrados (dos clases)
10. Resolución de problemas de valor inicial (dos clases)
11. Resolución de problemas de contorno (dos clases)
12. Resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden mediante diferencias finitas (2 clases)

Segundo parcial: 03/12,  
recuperatorios: 10/12 y 17/12 (?).

## Específicos de Cálculo Avanzado:

- ▶ CVG: [Cálculo Avanzado](#)
- ▶ GitHub: [https://github.com/manuxch/calculo\\_avanzado](https://github.com/manuxch/calculo_avanzado)

## Recursos adicionales:

- ▶ Python y programación: <https://github.com/gmg-utn/compTools>
- ▶  $\text{\LaTeX}$ -  $\text{\XLaTeX}$ : [https://es.wikibooks.org/wiki/Manual\\_de\\_LaTeX](https://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_LaTeX)

- ▶ E. Kreyszig, H. Kreyszig y E.J. Norminton. ***Advanced Engineering Mathematics***. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2011.
- ▶ M.R. Spiegel et al. ***Variable compleja***. Mexico: McGraw-Hill, 1991.
- ▶ J.W. Brown y R.V. Churchill. ***Variable compleja y aplicaciones***. Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana, 2004.
- ▶ P.V. O'Neil. ***Matemáticas avanzadas para ingeniería (7a. ed.)*** Mexico: Cengage Learning, 2015.
- ▶ C. H. Edwards y D.E. Penney. ***Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera***. México: Pearson Educación, 2009.
- ▶ R.L. Burden, D.J. Faires y A.M. Burden. ***Análisis numérico***. 10.<sup>a</sup> ed. Mexico: Cengage Learning, 2017.
- ▶ R.K. Gupta. ***Numerical Methods. Fundamentals and Applications***. Cambridge University Press, 2019.
- ▶ Gilbert Strang. ***Linear Algebra and Its Applications, 4th Edition***. 4th. Brooks Cole, 2006.
- ▶ D. Pine. ***Introduction to Python for Science and Engineering***. Florida, USA: CRC Press, 2019.
- ▶ F. Batista y C.M. Carlevaro. ***Python en ámbitos científicos***. <https://pyciencia.taniquetil.com.ar/>. 2025.

¿PREGUNTAS, DUDAS, COMENTARIOS?

# LOS NÚMEROS COMPLEJOS

Sistema de enteros:

$$2x = 3$$

$$x = ?$$

Números "reales":  $\{x : x^2 \geq 0\}$

$$x^2 = -1$$

$$x = ?$$

Motivación:  $x^2 + 1 = 0$  ¿tiene solución?

Ejemplo: usar  $y = e^{rx}$  para resolver:

$$y'' + y = 0$$



Sistema de enteros:

$$2x = 3$$

$$x = ?$$

Números "reales":  $\{x : x^2 \geq 0\}$

$$x^2 = -1$$

$$x = ?$$

Motivación:  $x^2 + 1 = 0$  ¿tiene solución?

Ejemplo: usar  $y = e^{rx}$  para resolver:

$$y'' + y = 0$$

$$r^2 e^{rx} + e^{rx} = 0$$

$$\therefore r^2 + 1 = 0 \therefore r = \pm\sqrt{-1} = \pm i$$

$$\therefore y = e^{ix} \text{ o } y = e^{-ix}$$

$$y = \cos x \text{ o } y = \sin x$$

De "alguna manera"  $i$  debe existir  
y  $e^{ix}$  debe estar relacionado a  
 $\sin x$  y  $\cos x$ .

# LOS NÚMEROS COMPLEJOS

Sistema de enteros:

$$2x = 3$$

$$x = ?$$

Números "reales":  $\{x : x^2 \geq 0\}$

$$x^2 = -1$$

$$x = ?$$

Motivación:  $x^2 + 1 = 0$  ¿tiene solución?

Ejemplo: usar  $y = e^{rx}$  para resolver:

$$y'' + y = 0$$

$$r^2 e^{rx} + e^{rx} = 0$$

$$\therefore r^2 + 1 = 0 \therefore r = \pm\sqrt{-1} = \pm i$$

$$\therefore y = e^{ix} \text{ o } y = e^{-ix}$$

$$y = \cos x \text{ o } y = \sin x$$

De "alguna manera"  $i$  debe existir y  $e^{ix}$  debe estar relacionado a  $\sin x$  y  $\cos x$ .

El sistema de números complejos:

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x \text{ y } y \text{ son reales.}\}$$

con la estructura:

$$(1) x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \Leftrightarrow$$


$$x_1 = x_2 \text{ y } y_1 = y_2$$

$$(2) (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$(3) r(x + iy) = rx + iry$$

$r$  real.

$\therefore$  los números complejos son un **espacio vectorial** por definición.



Estructura adicional de  $\mathbb{C}$ :


$$(4) (a + ib)(c + id) = \\ = (ac - bd) + i(bc + ad)$$

Caso especial:

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 \geq 0 \\ = |a + ib|^2$$

**Definición:** el complejo conjugado de  $z = x + yi$  es

$$\bar{z} = x - yi$$



$$\frac{c + di}{a + bi} = \left( \frac{c + di}{a + bi} \right) \left( \frac{a - bi}{a - bi} \right) \\ = \frac{(ac + bd) + (ad - bc)i}{a^2 + b^2}$$

$$\frac{3 + 2i}{4 + i} = \frac{(3 + 2i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)} \\ = \frac{14 + 5i}{17} \\ = \frac{14}{17} + \frac{5}{17}i$$

$$\therefore \frac{\text{complejo}}{\text{complejo}} = \text{complejo}$$

(excepto para división por cero).

Producto en coordenadas polares:

$$(r_1, \theta_1)(r_2, \theta_2) = (r_1 \cos \theta_1 + ir_1 \sin \theta_1) \\ (r_2 \cos \theta_2 + ir_2 \sin \theta_2) = \\ r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + \\ ir_1 r_2 (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1) = \\ r_1 r_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + ir_1 r_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = \\ \boxed{(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)}$$

Por inducción:

$$(r_1, \theta_1) \cdots (r_n, \theta_n) = \\ (r_1 \cdots r_n, \theta_1 + \cdots + \theta_n)$$

Caso especial:

$$(r, \theta)^n = (r^n, n\theta) \\ \therefore r = 1 \rightarrow (1, \theta)^n = (1, n\theta)$$

Teorema de De Moivre:

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^2 &= \cos 2\theta + i \operatorname{sen} 2\theta \\ &= (\cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta) + i 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \operatorname{sen} 2\theta &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta\end{aligned}$$

Raíces: encontrar  $\sqrt[n]{i}$

$$\sqrt[6]{i} = x + iy \rightarrow i = (x + iy)^6 = 0 + 1i$$

$$\begin{aligned}\therefore x^6 + 15x^4(iy)^2 + 15x^2(iy)^4 + (iy)^6 \\ + 6x^5(iy) + 20x^3(iy)^3 + 6x(iy)^5\end{aligned}$$

Sistema complicado a resolver:

$$\begin{cases} x^6 + 15x^4(iy)^2 + 15x^2(iy)^4 + (iy)^6 = 0 \\ 6x^5(iy) + 20x^3(iy)^3 + 6x(iy)^5 = 1 \end{cases}$$

Teorema de De Moivre:

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^2 &= \cos 2\theta + i \operatorname{sen} 2\theta \\ &= (\cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta) + i 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \operatorname{sen} 2\theta &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta\end{aligned}$$

Raíces: encontrar  $\sqrt[n]{i}$

$$\sqrt[6]{i} = x + iy \rightarrow i = (x + iy)^6 = 0 + 1i$$

$$\begin{aligned}\therefore x^6 + 15x^4(iy)^2 + 15x^2(iy)^4 + (iy)^6 &= 0 \\ + 6x^5(iy) + 20x^3(iy)^3 + 6x(iy)^5 &= 1\end{aligned}$$

Sistema complicado a resolver:

$$\begin{cases} x^6 + 15x^4(iy)^2 + 15x^2(iy)^4 + (iy)^6 = 0 \\ 6x^5(iy) + 20x^3(iy)^3 + 6x(iy)^5 = 1 \end{cases}$$

En coordenadas polares:

$$i = (1, \pi/2) \therefore \sqrt[6]{i} = (r, \theta)$$


$$\rightarrow i = (r, \theta)^6 = (r^6, 6\theta)$$

$$\therefore r = 1, \quad 6\theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi k = \frac{1 + 4k}{2}\pi$$

$$r = 1,$$

$$\theta = \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{9\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{21\pi}{12}, \frac{25\pi}{12}, \dots$$


$$\begin{aligned} \left(1, \frac{3\pi}{4}\right) &= \cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1 + i) \end{aligned}$$




### Sistema de números complejos:


Los números complejos son **cerrados** respecto de la radicación.

**PAUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS: 1 – 8.**










## Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= z^2 = (x + iy)^2 \\
 &= x^2 + 2xiy + i^2y^2 = x^2 - y^2 + 2ixy \\
 \therefore f(x, y) &= (x^2 - y^2, 2xy)
 \end{aligned}$$



## Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= z^2 = (x + iy)^2 \\
 &= x^2 + 2xiy + i^2y^2 = x^2 - y^2 + 2ixy \\
 \therefore f(x, y) &= (x^2 - y^2, 2xy)
 \end{aligned}$$

$\therefore f(z) = z^2$  es equivalente al sistema real:

$$\begin{cases} u = x^2 + y^2 \\ v = 2xy \end{cases}$$

$\mathbb{C}$ : números complejos

$f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}$

## Definición:

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = L$$

dado  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$0 < |z - a| < \delta \mapsto |f(z) - L| < \epsilon$$

$\mathbb{C}$ : números complejos


$f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}$

## Definición:

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = L$$

dado  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$0 < |z - a| < \delta \mapsto |f(z) - L| < \epsilon$$



$\mathbb{C}$ : números complejos


$f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}$

## Definición:

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = L$$

dado  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$0 < |z - a| < \delta \mapsto |f(z) - L| < \epsilon$$



Los teoremas usuales sobre límites **son válidos**. En particular:

Si

Entonces:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$L = L_1 + iL_2$$

$$a = a_1 + ia_2$$

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = L \iff \begin{cases} \lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} u(x, y) = L_1 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} v(x, y) = L_2 \end{cases}$$

**Definición:**

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \right]$$

**Definición:**

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \right]$$

Si  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} \right] \end{aligned}$$




## Definición:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \right]$$

Si  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} \right] \end{aligned}$$



**Caso 1:**  $\Delta y \equiv 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u}{\Delta x} + i \frac{\Delta v}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)}\end{aligned}$$

**Caso 1:**  $\Delta y \equiv 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u}{\Delta x} + i \frac{\Delta v}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)}\end{aligned}$$

**Caso 2:**  $\Delta x \equiv 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore f'(z_0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u}{i \Delta y} + \frac{\Delta v}{\Delta y} \right] = \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)}\end{aligned}$$

**Caso 1:**  $\Delta y \equiv 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u}{\Delta x} + i \frac{\Delta v}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)}\end{aligned}$$

**Caso 2:**  $\Delta x \equiv 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore f'(z_0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta u}{i \Delta y} + \frac{\Delta v}{\Delta y} \right] = \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{z_0=(x_0, y_0)}\end{aligned}$$

### Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Si  $f = u + iv$  es diferenciable (**analítica**), entonces:

$$u_x = v_y$$

$$u_y = -v_x$$

Ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned}f(z) &= z^2 = (x + iy)^2 \\ &= (x^2 - y^2) + i(2xy)\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}u_x &= 2x, & v_x &= 2y \\ u_y &= -2y, & v_y &= 2x\end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned}u_x &= v_y \\ u_y &= -v_x\end{aligned}$$

$$f(z) \mapsto \text{diferenciable}$$

Ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned}f(z) &= z^2 = (x + iy)^2 \\&= (x^2 - y^2) + i(2xy)\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}u_x &= 2x, & v_x &= 2y \\u_y &= -2y, & v_y &= 2x\end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned}u_x &= v_y \\u_y &= -v_x\end{aligned}$$

$f(z) \mapsto$  **diferenciable**

Derivada por definición:

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \frac{(z_0 + \Delta z)^2 - z_0^2}{\Delta z} \\&= \frac{2z_0\Delta z + \Delta z^2}{\Delta z} \quad (\Delta z \neq 0) \\&= 2z_0 + \Delta z\end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{f'(z_0) = 2z_0}$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy$$
$$u = x, v = -y \Rightarrow u_x \neq v_y$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy$$
$$u = x, v = -y \Rightarrow u_x \neq v_y$$


$$\begin{aligned}\frac{\Delta w}{\Delta z} &= \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} \\ &= \frac{1 - i\frac{\Delta y}{\Delta x}}{1 + i\frac{\Delta y}{\Delta x}} \rightarrow \frac{1 - \frac{dy}{dx}}{1 + i\frac{dy}{dx}}\end{aligned}$$



$$f(z) = \bar{z} = x - iy$$

$$u = x, v = -y \Rightarrow u_x \neq v_y$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta w}{\Delta z} &= \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} \\ &= \frac{1 - i\frac{\Delta y}{\Delta x}}{1 + i\frac{\Delta y}{\Delta x}} \rightarrow \frac{1 - \frac{dy}{dx}}{1 + i\frac{dy}{dx}} \end{aligned}$$



$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{1 - im}{1 + im} = g(m)$$

$u(x, y)$  satisface la ecuación de Laplace si:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$u(x, y)$  satisface la ecuación de Laplace si:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Si  $u + iv$  es **analítica**:

$$u_x = v_y \quad \therefore \quad u_{xx} = v_{yx}$$

$$u_y = -v_x \quad \therefore \quad u_{yy} = -v_{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

$u(x, y)$  satisface la ecuación de Laplace si:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Si  $u + iv$  es **analítica**:

$$u_x = v_y \quad \therefore \quad u_{xx} = v_{yx}$$

$$u_y = -v_x \quad \therefore \quad u_{yy} = -v_{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

**Ejemplo:**

$$f(z) = z^2 \longrightarrow \begin{cases} u = x^2 - y^2 \\ v = 2xy \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ v_{xx} + v_{yy} = 0 \end{cases}$$


**PAUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS: 9 – 13.**

## Revisión:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \lim_{\substack{\max \\ \Delta x \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(c_k^*) \Delta x_k$$

$$= F(x_1) - F(x_0), \quad F' = f$$

rango de  $f$




## Revisión:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \lim_{\substack{\max \\ \Delta x \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(c_k^*) \Delta x_k$$

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz \stackrel{?}{=} \lim_{\substack{\max \\ \Delta z \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(c_k^*) \Delta z_k \stackrel{?}{=}$$


$$= F(x_1) - F(x_0), F' = f$$

rango de  $f$



$$C : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} = \begin{cases} \vec{R} = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} \\ z = x(t) + iy(t) \end{cases}$$

$$t_0 \leq t \leq t_1$$



$$\int_{C: z_0}^{z_1} f(z) dz = \lim_{\substack{\max \\ \Delta z \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(c_k(t_k)) \frac{\Delta z_k}{\Delta t_k} \Delta t_k$$

$$\therefore \int_{C: z_0}^{z_1} f(z) dz = \int_{t_0}^{t_1} f(z(t)) z'(t) dt$$

En términos de  $u$  y  $v$ :  $f(z) = u + iv$ ,

$$\Delta z = \Delta x + i\Delta y:$$

$$\begin{aligned} \int_C^{z_1} f(z) dz &= \int_C^{(x_1, y_1)} (u + iv)(dx + idy) = \\ &= \int_C^{(x_1, y_1)} (u dx - v dy) + i \int_C^{(x_1, y_1)} (v dx + u dy) \\ C: &\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \end{aligned}$$

Si  $u + iv$  es **analítica**:  $u_x = v_y$ ,  $u_y = -v_x$ .

$$\therefore \begin{cases} u dx - v dy \\ v dx + u dy \end{cases} \text{ es diferencial exacta.}$$

$\therefore$  Si  $f = u + iv$  en analítica:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz$$

es **independiente** de  $C$ , y

$$\oint_C f(z) dz = 0, \quad \forall C$$

$f$  analítica  $\rightarrow$

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0), \quad F' = f$$

**Nota:**

$$\oint_C f(z) dz$$

**no necesariamente es 0** si  $f$  no es analítica.




## EJEMPLO

Calcular:

$$\oint_C \frac{dz}{z}$$

donde



El integrando es analítico en  $\mathbb{C}$  excepto en  $z = 0$ .

Método #1:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z} &= \oint_C \frac{dx + idy}{x + iy} \\ &= \oint_C \frac{(x - iy)(dx + idy)}{x^2 + y^2} = \\ &= \oint_C \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} + i \oint_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

En  $C$ :  $x = R \cos \theta$ ,  $y = R \sin \theta$ ,

$$dx = -R \sin \theta d\theta,$$

$$dy = R \cos \theta d\theta,$$

$$x^2 + y^2 = R^2, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$


$$\begin{aligned}\therefore \oint_C \frac{dz}{z} &= 0 \\ &+ i \int_0^{2\pi} \frac{R^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta}{R^2} \\ &= \boxed{2\pi i}\end{aligned}$$

## EJEMPLO

Calcular:

$$\oint_C \frac{dz}{z}$$

donde



El integrando es analítico en  $\mathbb{C}$  excepto en  $z = 0$ .

Método #1:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z} &= \oint_C \frac{dx + idy}{x + iy} \\ &= \oint_C \frac{(x - iy)(dx + idy)}{x^2 + y^2} = \\ &= \oint_C \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} + i \oint_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

En  $C$ :  $x = R \cos \theta$ ,  $y = R \sin \theta$ ,

$$dx = -R \sin \theta d\theta,$$

$$dy = R \cos \theta d\theta,$$

$$x^2 + y^2 = R^2, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$


$$\begin{aligned}\therefore \oint_C \frac{dz}{z} &= 0 \\ &+ i \int_0^{2\pi} \frac{R^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta}{R^2} \\ &= \boxed{2\pi i}\end{aligned}$$

Método #2:

$$C : z = Re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$


$$\begin{aligned}\frac{dz}{d\theta} &= iRe^{i\theta} \\ \oint_C \frac{dz}{z} &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{z(\theta)} \frac{dz}{d\theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\theta}}{Re^{i\theta}} d\theta \\ &= \boxed{2\pi i}\end{aligned}$$

$$\oint_{\phi} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz - \oint_{C_1} f(z) dz = 0$$




Si  $f$  es analítica en  $C_1$  y  $C_2$ , y en la región entre ellas, entonces:

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz$$




Geometría elástica (topología):



Si  $f$  es analítica en  $C_1$  y  $C_2$ , y en la región entre ellas, entonces:

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz$$




$$\oint_{\emptyset} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz - \oint_{C_1} f(z) dz = 0$$

**Ejemplo:** calcular

$$\oint_C \frac{dz}{z}$$

donde



$$\oint_C \frac{dz}{z} = \oint_{C_1} \frac{dz}{z} = 2\pi i$$


**PAUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS: 14 – 17.**

$$e^z = ?, \quad \text{sen } z = ?$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = ?$$

Gráficamente:



En forma similar podemos definir:


$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_1 + \cdots + c_n)$$

Por su estructura, **son válidos** todos los teoremas usuales.

En particular, si

$S = \{z : \sum a_n z^n \text{ converge}\}$ ,  
entonces pueden darse los  
siguientes casos:

- i)  $S = \{0\}$ .
- ii)  $S = \mathbb{C}$  (todos los números complejos).
- iii) Existe un  $R > 0$  tal que  $S = \{z : |z| < R\}$ , y la convergencia es absoluta e uniforme para  $|z| \leq r < R$ .



## Definición :

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  significa que

dado  $\varepsilon > 0$ , ( $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ), existe  $N$ ,  
tal que

$$n > N \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

Entonces podemos **definir**:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Se puede entonces probar que:

$$e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z$$

o

$$e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$$

$$\begin{aligned} \therefore (r, \theta) &= r \cos \theta + i r \operatorname{sen} \theta \\ &= r e^{i\theta} \end{aligned}$$

Tres observaciones:

$$1. z = r e^{i\theta} = r e^{i(\theta+2\pi k)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log z &= \log r + \log e^{i(\theta+2\pi k)} \\ &= \ln r + i(\theta + 2\pi k) \end{aligned}$$

$\therefore \log z$  es multivaluada, el **valor principal** es  
 $-\pi < \theta \leq \pi$ .

2.

$$\begin{aligned} \cosh ix &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \\ &= \frac{(\cos x + i \operatorname{sen} x) + (\cos(-x) + i \operatorname{sen}(-x))}{2} = \cos x \end{aligned}$$


$$3. e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} =$$

$$e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y) =$$

$$e^x \cos y + i e^x \operatorname{sen} y$$

$$u(x, y) + i v(x, y)$$

$u$  y  $v$  representan un **mapeo conforme** real:



Entonces podemos **definir**:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Se puede entonces probar que:

$$e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z$$

o

$$e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$$

$$\begin{aligned} \therefore (r, \theta) &= r \cos \theta + i r \operatorname{sen} \theta \\ &= r e^{i\theta} \end{aligned}$$

Tres observaciones:

$$1. z = r e^{i\theta} = r e^{i(\theta+2\pi k)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log z &= \log r + \log e^{i(\theta+2\pi k)} \\ &= \ln r + i(\theta + 2\pi k) \end{aligned}$$

$\therefore \log z$  es multivaluada, el **valor principal** es  $-\pi < \theta \leq \pi$ .

2.

$$\begin{aligned} \cosh ix &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \\ &= \frac{(\cos x + i \operatorname{sen} x) + (\cos(-x) + i \operatorname{sen}(-x))}{2} = \cos x \end{aligned}$$


$$3. e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} =$$

$$e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y) =$$

$$e^x \cos y + i e^x \operatorname{sen} y$$

$$u(x, y) + i v(x, y)$$

$u$  y  $v$  representan un **mapeo conforme** real:





$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} u^n$$

converge para  $|u| < 1$ .

$$\therefore \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

$$= \sum_n (-1)^n x^{2n}$$

converge para  $|x| < 1$ .


¿Qué pasa en  $x = \pm 1$ ?

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n} = \frac{1}{1+z^2}, \quad (|z| < 1)$$

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z+i)(z-i)}$$

$\therefore z = \pm i \leftarrow$  ¡problema!

Gráficamente:



Los puntos problemáticos están **sobre**  $|z| = 1$ , pero no en  $z = 1$  o en  $z = -1$ .

**PAUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS: 18 – 19.**

- ▶ E. Kreyszig, H. Kreyszig y E.J. Norminton. ***Advanced Engineering Mathematics***. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2011. Capítulo 13 – 16.
- ▶ M.R. Spiegel et al. ***Variable compleja***. Mexico: McGraw-Hill, 1991. Capítulos 1, 2, 6, 14.