A3: Randomisation und Verblindung

- Grundlegendes zur Randomisation
  - Ziele
    - ➢ Vermeidung von Verzerrungen bei der Zusammenstellung der Therapiegruppen (bewussten oder unbewussten)
    - ➢Einheitlichkeit der Gruppen
  - Voraussetzungen: Überprüfung, ob Patient Kriterien erfüllt; Aufklärung mit Patienten; nicht vorhersagbaren Zuteilung
- Randomisations-Methoden
  - Einfache Randomisation
    - Zuweisung über Zufallszahlen
    - Nachteil: Wenn n zu groß ist, können die Anteile nur annähernd erreichen
  - Blockrandomisation
    - Blöcke sollten ausreichend kurz sein
    - Gewünsches Verhältnis wird innerhalb eines Blockes genau eingehalten
  - Stratifizierte Randomisation
    - Schichtweise Durchführung der Randomisation
      - Vermeidung von Ungleichgewichten bez. einiger prognostischer Faktoren
      - Z.B.: Geschlecht, Altersklasse, Gewicht (normal-/ übergewichtig)
    - Besonders von Bedeutung für kleine Studien
    - Anzahl der Faktoren sollte nicht zu groß sein
  - Minimisation
    - Vorteil: möglich, eine größere Anzahl von Faktoren zu berücksichtigen
    - Kein reiner Zufallsmechanismus
- Verbindung
  - Ziele
    - Entfernung von Auswirkungen des Wissens um die Therapie auf Versuchergebnis und Interpretation
    - Im Idealfall kennen die Patient und die befassten Personen nicht die individuell zugeteilte Therapie
  - Arten
    - doppel-blind
    - einfach-blind
    - offen (keine Verblindung)