A4: Intention-to-treat analyse

- Protokollverletzungen
  - z.B. Patienten nehmen Medikamente nicht regelmäßig ein; Patienten haben eine andere Therapie oder Behandlungsform; Patienten machen keine Untersuchungen; Patienten scheiden sehr früh aus.
  - Abweichungen kommen von:
    - Gesundheitszustand der Patienten
    - Therapie
    - Behandlungserfolg
- Umgang mit Protokollverletzungen
  - Per-Protokoll-Analyse („PP-Analyse“)
    - Entfernung der Patienten, die Protollverletzungen passiert haben
  - As-Treated-Analyse („AT-Analyse“)
    - Bewertung der Patienten unter der Therapie, die der Patient auch tatsächlich bekommen hat
      - Ausschluss von Patienten mit (anderen) Protokollverletzungen
      - Kann auch als eine Unterform der PP-Analyse angesehen werden
  - Intention-to-Treat-Analyse („ITT-Analyse“)
    - Berücksichtigung aller Patienten, die zu Beginn der Studie teilnahmen
    - Ein Patient wird in der Gruppe ausgewertet, zu der er anfangs randomisiert wurde
- Vor-und Nachteilte der ITT-Analyse
  - Vorteile
    - erhalten Randomisierung
    - keine selektionsbedingten Verzerrungen bei Analyse
    - Zeigt die Wirkung von Therapien, weil sie in der Praxis beobachtet wurden
  - Nachteile
    - echte Wirkung und Unterschied von Therapien wird abgeschwächt oder verschleiert
    - Bei Nachweis von Äquivalenz (->siehe später) problematisch ?
    - Schwer unter A auswerten : mit Therapie A randomisierte Patienten + mit Therapie B behandelt wurden
  - Es ist sinnvoll mit AT-oder PP-Analyse zu vergleichen
- **Beispiel: Bypass-OP vs. medikamentöse Therapie**
  - ITT: Med. Beh. vs. Bypass –-nicht signif.
  - PP: Med. Beh. vs. Bypass-–-signifikant
  - AT: Med. Beh. vs. Bypass---signifikant
  - Fazit:
- Clofibrate-Studie
  - Langzeitbehandlung der koronaren Herzerkrankung
    - mit Cholesterinsenker Clofibrate
    - mit Placebo randomisiert
  - 5-Jahres-Sterblichkeitsraten
    - Clofibrate vs. Placebo : 20.0% vs. 20.9% ---nicht signif.
  - Auswertung getrennt nach Compliance
    - Compliance < 80%: Clofib. vs. Placebo 24,6% vs. 28.2% -–nicht signif.
    - Compliance >=80%: Clofib. vs. Placebo15,0% vs. 15,1% –-nicht signif.
      - signifikant signifika
    - Unterschied ist nicht auf Wirksamkeit von Clofibrate, sondern auf Patientenzusammensetzung