- A6-1
  - APSAC-Studie
  - Fisher-Yates-Test für APSAC-Studie
    - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11* = 9
    - Wahrscheinlichkeit hierfür, wenn p1 = p2 gilt:
    - p-Wert (siehe auch Grafik auf nächster Folie):
      - Summation über alle Tafeln mit n11 <=9 und n11 >=20:
      - bei einseitigem Test: pW = 2,34%
    - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
      - Sterblichkeit bei den Therapien ist signifikant verschieden
      - ▪ bei einseitigem Test: Sterblichkeit ist bei APSAC signifikant geringer
    - **Grafik**
  - Vierfelder-X^2-Test für APSAC-Studie
    - Übliche Formulierung
      - Erwartete Häufigkeiten
      - Wert der Teststatistik
      - Kritischer Wert (Niveau a= 5%):
      - p-Werte
      - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
        - Sterblichkeit bei den Therapien ist signifikant verschieden
    - Formulierung bei [Schum]
      - Schaut wie bei exaktem Test von Fisher nur auf N11
        - bedingt auf konstante Randsummen
      - Unter H0 ist N11 hypergeometrisch verteilt
      - Teststatistik
      - Konkrete Werte für APSAC-Studie:
        - Beobachteter Wert der Teststatistik:
        - Zugehöriger p-Wert
  - Vergleich von Anteilen – Differenz
    Differenz der Wahrscheinlichkeiten (von 1 zu 2):
    - Differenz:
    - Approximativer Standardfehler der empirischen Differenz:
      - entweder:
      - oder alternativ:
      - approximatives KI
    - Für APSAC-Studie :
      - approx. Standardfehler:
      - appr. KI für delte:
  - Vergleich von Anteilen – Relatives Risiko
    Relatives Risiko von Behandlung 1 zu Behandlung 2:
    - p1 und p2: W-keitfür Eintreten eines Ereignisses bei Therapie 1 bzw. 2
    - Relatives Risiko:
    - Für APSAC-Studie :
  - Vergleich von Anteilen – Odds Ratio
    Odds Ratio von Behandlung 1 zu Behandlung 2:
    - Odds Ratio
    - Approximativer Standardfehler des logarithmierten empirischen Odds Ratios:
    - Für APSAC-Studie :