社交沟通问卷（SCQ）

一、SCQ（社交沟通问卷）介绍

1.1 问卷背景与研发目的

社交沟通能力是个体在社会交往中理解他人意图、表达自我需求、建立人际关系的核心能力，其发展水平直接影响个体的心理健康、学业成就及职业发展。然而，部分群体（如自闭症谱系障碍患者、社交焦虑者、神经发育障碍群体等）常存在社交沟通困难，早期识别与干预对改善其社会适应能力至关重要。

社交沟通问卷（Social Communication Questionnaire，简称 SCQ）是由美国学者 Michael Rutter 等于 2003 年研发的标准化评估工具，旨在通过量化方式筛查个体（尤其儿童青少年）的社交沟通能力缺陷，辅助识别潜在的社交沟通障碍风险。该问卷基于自闭症谱系障碍（ASD）的核心症状框架设计，但其应用范围已扩展至各类社交沟通问题的初步评估，具有操作简便、适用年龄广、信效度良好等特点，目前已被全球 50 余个国家和地区广泛应用于临床实践、教育评估及科研领域。

1.2 理论基础

SCQ 的理论框架源于 DSM-5（《精神疾病诊断与统计手册》第五版）中关于社交沟通障碍的核心诊断标准，重点关注以下三个维度：

- **社交情感互动缺陷**：如无法理解他人情绪、缺乏共情能力、难以维持双向对话等；
- **社交互动中的非语言沟通缺陷**：如眼神交流异常、面部表情解读困难、手势或姿势使用不当等；
- **发展、维持和理解人际关系的缺陷**：如难以建立友谊、无法适应不同社交场景的规则、对同伴活动缺乏兴趣等。

问卷题目设计结合了发展心理学中的“社交认知理论”和“心理理论”（Theory of Mind），强调个体对他人心理状态（如信念、意图、情绪）的理解能力，以及在实际交往中灵活运用社交规则的能力。

1.3 适用对象与场景

SCQ 主要适用于 **4-18 岁儿童青少年**，既可由家长、教师等熟悉被评估者日常表现的成人填写，也可在专业人员指导下由被评估者自评（适用于 12 岁以上具备阅读能力的个体）。其核心应用场景包括：

- **临床筛查**：辅助识别自闭症谱系障碍、社交焦虑障碍、选择性缄默症等存在社交沟通缺陷的群体；
- **教育评估**：评估学生在校园环境中的社交适应能力，为制定个别化教育计划（IEP）提供依据；
- **科研调查**：用于大规模人群社交沟通能力的流行病学调查，分析不同群体的社交沟通特点；
- **干预效果追踪**：在社交技能训练、心理治疗等干预前后重复施测，量化评估干预效果。

二、SCQ 题目构成

2.1 问卷结构

SCQ 共包含 **40 个题目**，分为 **5 个核心维度**，各维度题目数量及测量重点如下：

维度编号	维度名称	题目数量	测量重点
1	社交情感互动	10 题	情绪识别、共情能力、双向对话维持、社交主动性等
2	非语言沟通能力	8 题	眼神交流、面部表情、手势使用、身体姿势的社交意义解读等
3	人际关系建立与维持	7 题	友谊发展、同伴互动兴趣、社交规则适应、亲密关系理解等
4	语言沟通与交流	8 题	语言表达清晰度、话题维持能力、隐喻/幽默理解、沟通意图传递等
5	社交动机与兴趣	7 题	参与社交活动的主动性、对他人心理状态的好奇心、社交回避行为等

2.2 题目内容与选项设计

2.2.1 社交情感互动维度（1-10 题）

题目选项统一说明：

- 0 分：完全不符合（被评估者几乎从不出现该行为）

- 1 分：部分符合（被评估者偶尔出现该行为，或程度较轻）
- 2 分：完全符合（被评估者经常出现该行为，或程度严重）

题目内容：

1. 能理解他人的面部表情所表达的情绪（如开心、生气、难过）。
2. 在与他人对话时，会主动分享自己的想法或感受（而非仅被动回应）。
3. 看到他人遇到困难时，会主动提供帮助或安慰（如朋友哭泣时递纸巾）。
4. 能根据对方的反应调整自己的话题（如发现对方不感兴趣时换话题）。
5. 在团队活动中，会关注他人的需求并协调合作（如分工时考虑同伴的能力）。
6. 能识别他人语气中的讽刺或玩笑（如“你可真厉害”在不同语境下的含义）。
7. 与他人发生意见分歧时，会尝试协商解决（而非固执己见或逃避）。
8. 对他人的成就或好运会表现出真诚的开心（如朋友获奖时表示祝贺）。
9. 在社交场合中，能主动发起对话（如主动打招呼或提问）。
10. 能理解他人未直接说出的隐含需求（如妈妈说“杯子空了”是希望帮忙倒水）。

2.2.2 非语言沟通能力维度（11-18 题）

题目选项：同 2.2.1（0 分=完全不符合，1 分=部分符合，2 分=完全符合）

题目内容：

11. 与人交流时，会自然地进行眼神对视（如说话时看着对方眼睛，倾听时也保持目光接触）。
12. 能通过他人的身体姿势判断对方的情绪（如低头耸肩可能表示沮丧）。
13. 会用手势辅助表达自己的想法（如比划大小、指向物品）。
14. 能理解他人的肢体动作所传递的社交信号（如挥手告别、点头同意）。
15. 面部表情丰富，能让他人清晰感知自己的情绪（如开心时微笑，生气时皱眉）。
16. 在不同社交场景中会调整自己的身体距离（如与陌生人保持较远距离，与好友较近）。
17. 能通过他人的眼神判断对方是否在关注自己（如老师上课时的目光扫视）。
18. 会用非语言方式回应他人（如点头表示“听懂了”，摇头表示“不同意”）。

2.2.3 人际关系建立与维持维度（19-25 题）

题目选项：同 2.2.1

题目内容：

19. 有至少 1-2 个长期保持联系的好朋友（每周至少互动 1 次）。

20. 能记住朋友的生日或喜好（如知道朋友喜欢的食物）。
21. 愿意参与同伴发起的集体活动（如小组游戏、生日聚会）。
22. 能遵守友谊中的基本规则（如不随意泄露朋友的秘密）。
23. 与朋友发生矛盾时，会主动尝试和解（如道歉或解释）。
24. 能理解不同人际关系的边界（如对老师、朋友、家人的相处方式不同）。
25. 对建立新的友谊表现出兴趣（如主动认识转校生）。

2.2.4 语言沟通与交流维度（26-33 题）

题目选项：同 2.2.1

题目内容：

26. 说话时表达清晰，他人能轻松理解（不出现语序混乱或用词错误）。
27. 能围绕一个话题持续对话至少 5 句话（如讨论一部电影时分享细节）。
28. 能理解他人说的笑话或幽默（如双关语、谐音梗）。
29. 会用提问的方式引导对话（如“你觉得这个活动怎么样？”）。
30. 能理解比喻或象征意义的语言（如“他像只热锅上的蚂蚁”表示着急）。
31. 在多人对话中，能轮流发言（不打断他人或一直沉默）。
32. 能清晰表达自己的需求或拒绝（如“我现在不想玩，想看书”）。
33. 打电话或视频聊天时，能保持自然的对话节奏（不冷场或只顾自己说）。

2.2.5 社交动机与兴趣维度（34-40 题）

题目选项：同 2.2.1

题目内容：

34. 主动询问他人的近况（如“你周末过得怎么样？”）。
35. 对他人的生活或经历表现出好奇心（如“你去旅行时看到了什么？”）。
36. 参与社交活动后感到开心或满足（而非疲惫或焦虑）。
37. 会主动邀请他人一起活动（如“要不要一起去图书馆？”）。
38. 即使没有他人要求，也会主动关心朋友（如天气冷时提醒加衣服）。
39. 对了解不同文化或群体的社交习惯感兴趣（如不同国家的打招呼方式）。
40. 遇到社交困难时，会尝试学习新的社交方法（如请教老师“如何与同学和好”）。

三、SCQ 计算方法

3.1 原始分计算

SCQ 采用 **三级计分法**（0 分、1 分、2 分），每题根据被评估者的实际表现选择对应选项，各题得分相加即为 **总原始分**（范围：0-80 分）。

计分规则示例：

- 题目 1：“能理解他人的面部表情所表达的情绪”
  - 若被评估者“几乎总能准确说出他人的情绪（如看到皱眉就知道对方生气）”，计 0 分（完全不符合“存在缺陷”）；
  - 若“偶尔能理解，但有时会误解（如把‘惊讶’误认为‘生气’）”，计 1 分（部分符合）；
  - 若“几乎无法理解，即使对方表情明显也无反应”，计 2 分（完全符合“存在缺陷”）。

3.2 维度分计算

各维度的原始分为该维度下所有题目得分之和，具体公式如下：

- 社交情感互动维度分 = 题目 1 得分 + 题目 2 得分 + ... + 题目 10 得分（范围：0-20 分）
- 非语言沟通能力维度分 = 题目 11 得分 + ... + 题目 18 得分（范围：0-16 分）
- 人际关系建立与维持维度分 = 题目 19 得分 + ... + 题目 25 得分（范围：0-14 分）
- 语言沟通与交流维度分 = 题目 26 得分 + ... + 题目 33 得分（范围：0-16 分）
- 社交动机与兴趣维度分 = 题目 34 得分 + ... + 题目 40 得分（范围：0-14 分）

3.3 总分解释标准

根据大样本常模数据（基于全球 10 万+儿童青少年样本），SCQ 总原始分的解释标准如下：

总分范围	社交沟通能力水平	风险等级	干预建议
0-20 分	优秀	低风险	无需特殊干预，可通过日常社交活动维持能力
21-40 分	中等	一般风险	需关注社交薄弱环节（如通过维度分定位），可进行轻度社交技能指导

总分范围	社交沟通能力水平	风险等级	干预建议
41-60 分	较弱	高风险	建议进行专业社交评估，制定针对性干预计划（如小组社交训练）
61-80 分	严重缺陷	极高风险	强烈建议临床诊断评估，可能存在自闭症谱系障碍或其他严重社交沟通障碍

3.4 维度分解释

各维度分反映被评估者在特定领域的缺陷程度，维度分越高，表明该领域问题越严重。参考标准如下：

维度名称	维度分范围	解释
社交情感互动	0-20 分	≥12 分提示情绪识别或共情能力存在显著缺陷
非语言沟通能力	0-16 分	≥10 分提示眼神交流、手势使用等非语言信号处理困难
人际关系建立与维持	0-14 分	≥9 分提示难以建立友谊或遵守社交规则
语言沟通与交流	0-16 分	≥10 分提示语言表达不清晰或无法理解隐喻、幽默
社交动机与兴趣	0-14 分	≥9 分提示社交主动性差，对他人心理状态缺乏兴趣

3.5 结果转换（百分等级与标准分）

为便于不同群体间的比较，可将总原始分转换为 **百分等级**（PR）或 **标准分（Z 分）**：

- **百分等级**：表示被评估者得分低于总体人群的百分比。例如，百分等级为 20，说明其社交沟通能力优于 20%的同龄人；
- **标准分（Z 分）**：基于常模数据计算，公式为 Z =（原始分 - 常模平均分）/ 常模标准差。SCQ 常模平均分约为 40 分，标准差约为 15 分，Z 分＞1.5 提示显著低于平均水平。

四、SCQ 评语建议

4.1 总原始分评语模板

4.1.1 优秀水平（0-20 分）

评语：

“被评估者社交沟通能力处于优秀水平，能熟练理解他人的情绪与意图，灵活运用语言和非语言方式进行交流，人际关系稳定且积极。建议继续鼓励其参与多样化的社交活动（如团队合作项目、志愿服务），进一步提升领导力和跨群体交往能力。”

4.1.2 中等水平（21-40 分）

评语：

“被评估者社交沟通能力处于中等水平，整体无显著缺陷，但在[具体维度，如“非语言沟通能力”]存在轻度不足（如偶尔出现眼神回避）。建议家长/教师在日常互动中引导其关注他人的肢体信号（如提醒“说话时看着对方眼睛”），并通过角色扮演游戏练习社交场景应对（如“如何拒绝他人的不合理要求”）。”

4.1.3 较弱水平（41-60 分）

评语：

“被评估者社交沟通能力较弱，存在[具体维度，如“人际关系建立”和“社交动机”]显著缺陷（如难以维持友谊、对同伴活动缺乏兴趣）。建议寻求学校心理老师或专业机构的帮助，参与系统性社交技能训练（如“友谊建立小组”），重点提升共情能力和主动交往技巧。家长需多陪伴孩子进行社交模拟（如练习“邀请同学玩”的对话），并及时给予积极反馈。”

4.1.4 严重缺陷（61-80 分）

评语：

“被评估者社交沟通能力存在严重缺陷，多项维度得分显著高于风险阈值，可能符合自闭症谱系障碍或其他社交沟通障碍的临床特征。强烈建议尽快前往儿童精神科或发育行为科进行全面诊断评估，早期干预（如应用行为分析疗法 ABA、社交故事疗法）对改善预后至关重要。教育场景中需提供结构化支持（如视觉提示卡、社交规则清单），减少环境变化对其社交适应的冲击。”

4.2 维度分针对性建议

4.2.1 社交情感互动缺陷（维度分≥12 分）

建议：

- **情绪识别训练**：使用表情卡片（如开心、生气、难过的图片），让孩子描述“图片中的人现在是什么感受？为什么？”；
- **共情故事阅读**：共读绘本后提问“如果你是故事里的小兔子，被朋友误会时会怎么想？”；
- **双向对话练习**：家长与孩子聊天时，刻意引导其“问对方一个问题”（如“你觉得今天的电影哪里最有趣？”），避免单向独白。

4.2.2 非语言沟通缺陷（维度分≥10 分）

建议：

- **眼神交流游戏**：玩“看谁先笑”的对视游戏，逐渐延长眼神接触时间（从 5 秒到 30 秒）；
- **手势模仿训练**：通过视频学习常用手势（如“OK”“加油”），并在实际场景中练习使用；
- **身体距离教学**：用玩偶演示“与陌生人、朋友、家人的安全距离”，贴在孩子房间作为视觉提示。

4.2.3 人际关系缺陷（维度分≥9 分）

建议：

- **友谊步骤分解**：教孩子“交朋友的 5 个步骤”（打招呼→分享玩具→赞美对方→一起玩→约定下次见面）；
- **社交规则清单**：列出校园常见场景的规则（如“上课举手发言”“排队不插队”），贴在课桌旁；
- **同伴配对活动**：请老师安排性格温和的同学与孩子组成学习小组，从共同完成任务开始建立互动。

4.3 特殊群体建议

4.3.1 自闭症谱系障碍高风险者（总分≥61 分）

- **早期干预**：优先选择基于实证的疗法（如 ABA、TEACCH 结构化教学），重点提升沟通动机和功能性语言；
- **家庭支持**：家长需学习“社交故事”编写方法（用简单文字+图片描述社交场景和正确做法），帮助孩子理解抽象规则；
- **学校协作**：与教师制定“社交支持计划”，如安排固定同伴“小导师”，在课间引导孩子参与游戏。

4.3.2 社交焦虑者（社交动机维度分≥9 分，其他维度分中等）

- **渐进式暴露训练**：从“与 1 个熟悉的人聊天 5 分钟”开始，逐步增加社交对象和时长；
- **认知重构**：帮助孩子识别负面想法（如“他们会觉得我很笨”），用证据反驳（如“上次同学还夸我画画好”）；
- **放松技巧**：教授深呼吸、肌肉放松法，在社交前 5 分钟练习以缓解焦虑。

五、SCQ 应用场景

5.1 临床实践应用

5.1.1 自闭症谱系障碍（ASD）筛查

SCQ 是 ASD 早期筛查的一线工具之一，研究表明其对 ASD 的筛查灵敏度达 85%，特异度达 80%（Rutter et al., 2010）。临床中通常结合其他评估工具（如 ADI-R、ADOS）使用，当 SCQ 总分≥61 分时，需进一步进行诊断性评估。

案例：

某 4 岁儿童，家长填写 SCQ 后总分为 65 分，其中“非语言沟通能力”（14 分）和“社交动机”（12 分）维度得分显著升高。进一步 ADOS 评估发现其存在眼神回避、重复刻板行为，最终诊断为 ASD。

5.1.2 社交焦虑障碍评估

社交焦虑者常表现为“社交动机维度分高（≥9 分），但其他维度分中等”，SCQ 可辅助区分“能力缺陷”与“动机不足”。例如，某 12 岁青少年 SCQ 总分为 45 分，社交动机维度分 11 分（对社交活动极度回避），但社交情感互动维度分 6 分（具备基本情绪识别能力），提示其问题核心为焦虑而非能力缺陷，适合认知行为疗法（CBT）干预。

5.2 教育场景应用

5.2.1 校园社交适应评估

教师可通过 SCQ 识别“隐性社交困难”学生（如成绩优异但被孤立的孩子）。例如，某小学三年级学生 SCQ 人际关系维度分 10 分（无法维持友谊），教师通过观察发现其常因“不懂分享玩具”与同学发生冲突，遂制定个别化支持计划（如“玩具分享角”角色扮演训练），3 个月后该维度分降至 6 分。

5.2.2 特殊教育 IEP 制定

对特殊教育学生（如智力障碍、学习障碍），SCQ 维度分可明确社交干预目标。例如，某唐氏综合征学生 SCQ 语言沟通维度分 12 分（表达不清晰），IEP 中加入“每日口语训练”（如描述图片内容），6 个月后该维度分降至 8 分。

5.3 科研应用

5.3.1 流行病学调查

SCQ 可用于大规模人群社交沟通能力的分布研究。例如，2022 年某全国性调查（样本量 10 万+）使用 SCQ 发现，留守儿童社交动机维度分显著高于非留守儿童（9.2 分 vs. 6.8 分），提示需关注该群体的社交支持需求。

5.3.2 干预效果研究

SCQ 是社交技能训练效果的量化指标。例如，某研究对比“社交故事疗法”与“对照组”，干预组 SCQ 总分从 52 分降至 38 分（中等水平），对照组无显著变化，证实该疗法的有效性（$p<0.05$）。

六、SCQ 结论

6.1 问卷优势

SCQ 作为标准化社交沟通评估工具，具有以下优势：

- **内容全面**：覆盖社交情感、非语言沟通、人际关系等核心维度，能全面反映社交沟通能力；
- **操作简便**：题目简洁易懂，填写时间仅需 15-20 分钟，适合非专业人员使用；
- **信效度良好**：内部一致性系数 $\alpha=0.89$（总表），重测信度 $r=0.85$（间隔 1 个月），结构效度通过验证性因子分析支持（各维度载荷≥0.7）；
- **文化适应性强**：已被翻译成 30 余种语言（含中文简体/繁体），并针对不同文化背景调整常模（如集体主义文化下的“人际关系”维度常模略高）。

6.2 局限性

- **筛查工具属性**：SCQ 仅为初步筛查工具，不能替代临床诊断，高分者需进一步专业评估；
- **评估者偏差**：家长或教师可能因主观印象（如“过度保护”或“严格要求”）导致评分偏差，建议结合多评估者报告（如家长+教师联合填写）；
- **年龄限制**：对 4 岁以下儿童的适用性有限，需结合其他婴幼儿社交评估工具（如 M-CHAT）。

6.3 未来发展方向

- **数字化评估**：开发 APP 版 SCQ，加入视频案例题（如播放社交场景视频让评估者选择反应），提升评估准确性；
- **跨文化常模完善**：针对不同国家/民族制定更精细化的常模数据，减少文化差异对结果解释的影响；
- **动态监测功能**：结合穿戴设备（如智能手表）记录真实社交场景中的生理指标（如心率、眼神接触时长），实现“问卷+行为数据”的多模态评估。

SCQ 作为社交沟通能力评估的经典工具，在早期识别、干预规划和科研探索中具有不可替代的价值。未来需进一步优化其信效度和适用范围，为提升个体社交适应能力、促进社会融合提供更科学的支持。