

Respiración celular

Cómo extrae la célula la energía de la glucosa y de las grasas: glucólisis en el citosol y, en la mitocondria, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · D.2


- **Glucólisis:** sustratos y productos, localización y condiciones; vía **independiente del oxígeno**.
- **Respiración aeróbica:** oxidación completa hasta CO_2 y H_2O con alto rendimiento.
- De forma general (sustratos, productos, localización y condiciones): **ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa y β -oxidación**.
- **Respiración anaeróbica** (aceptores distintos del O_2 , en microorganismos) y su diferencia con la fermentación.
- Comparar el **rendimiento** de la respiración y la fermentación, **sin balance exacto de ATP**. Sin intermediarios.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- **Glucólisis y destinos del piruvato; ciclo de Krebs** (qué entra, qué sale, dónde).
- **Esquema de la mitocondria** con la cadena y la ATP sintasa (modelo 2026).
- Venenos de la cadena (rotenona, monóxido de carbono), glóbulos rojos sin mitocondrias, membranas perforadas.

2 Visión general

La **respiración celular** es la oxidación de la materia orgánica en la que el **aceptor final de electrones es una sustancia inorgánica**; en la **respiración aerobia** ese aceptor es el O_2 , que se reduce a agua. La glucosa se oxida **por completo**:



Etapas	Dónde	Necesita O_2
Glucólisis	Citosol	No

Etapa	Dónde	Necesita O ₂
Descarboxilación oxidativa del piruvato	Matriz mitocondrial	Indirectamente
Ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial	Indirectamente (regenera NAD ⁺ y FAD gracias a la cadena)
Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa	Membrana mitocondrial interna (crestas)	Sí: el O ₂ es el aceptor final

En las **procariotas**, que no tienen mitocondrias, el ciclo de Krebs ocurre en el citosol y la cadena respiratoria está en la **membrana plasmática**: por eso muchas bacterias son aerobias aunque no tengan mitocondrias.

3 La glucólisis

La **glucólisis** es el conjunto de **reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico** (piruvato) con **liberación de energía (ATP)**. Es una **degradación incompleta** de la glucosa.




Figura 1. Visión global de la glucólisis (sin intermediarios).

- Localización: **citosol**, en **eucariotas y procariotas**.
- Sustratos: **glucosa, NAD⁺, ADP y Pi**. Productos: **2 piruvato, 2 NADH + H⁺ y ATP**.
- Rendimiento: se gastan 2 ATP y se forman 4: **2 ATP netos**, por **fosforilación a nivel de sustrato**.
- Condiciones: **no necesita oxígeno**: ocurre en **aerobios y anaerobios**. Es una ruta **catabólica**: **libera energía (ATP)** y **genera poder reductor**.

4 Destinos del piruvato




Figura 2. El oxígeno decide el camino del piruvato.

- **Sin oxígeno**: **fermentaciones** en el citosol: piruvato → **lactato o etanol** y se regenera el **NAD⁺** (ver Fermentaciones).
- **Con oxígeno**: el piruvato entra en la **matriz mitocondrial** y sufre la **descarboxilación oxidativa**: pierde un CO₂, se oxida (NAD⁺ → NADH) y se une a la coenzima A: **piruvato + CoA + NAD⁺ → acetil-CoA + CO₂ + NADH**.

5 El ciclo de Krebs

El **ciclo de Krebs** (ciclo del ácido cítrico) es la **vía metabólica central de los aerobios** que **oxida los grupos acetilo hasta CO₂** y produce **ATP (GTP) y NADH**. Ocurre en la **matriz mitocondrial**.




Figura 3. Entradas y salidas de una vuelta del ciclo de Krebs.

- Para cada vuelta hacen falta dos compuestos: **acetil-CoA y oxalacético**. El **oxalacético se regenera en cada vuelta**; el **acetil-CoA procede de la descarboxilación oxidativa del pirúvico o de la β-oxidación** (y de los aminoácidos): de **glúcidos, lípidos y proteínas**.

- **Productos por vuelta:** **2 CO₂** (procedentes del acetilo), **3 NADH**, **1 FADH₂** y **1 GTP** (equivale a un ATP, por fosforilación a nivel de sustrato).
- Por cada glucosa se dan **dos vueltas** (hay dos acetil-CoA).
- El NADH y el FADH₂ **ceden sus electrones a la cadena de transporte**: así se relaciona el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria.
- Es **catabólico** porque **sirve para obtener energía**, y se considera **aeróbico** aunque no use O₂ directamente, porque el **oxígeno es el último aceptor de los electrones** que libera: sin O₂ se acumulan NADH y FADH₂ y el ciclo se detiene. También es anfibólico: algunos de sus intermediarios sirven de precursores para síntesis.

KREBS FRENTE A CALVIN (PREGUNTA FRECUENTE)

El ciclo de Krebs es **catabólico y produce ATP**; el ciclo de Calvin es **anabólico y consume ATP**.

6 La cadena respiratoria




Figura 4. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa (como en el modelo de examen de 2026).

- **Localización:** **membrana mitocondrial interna** (crestas).
- **Qué ocurre:** los **electrones** del NADH y el FADH₂ (procedentes de la glucólisis, la descarboxilación, el ciclo de Krebs y la β -oxidación) pasan por una serie de **transportadores de la membrana interna**, en los que **caen de nivel energético desprendiendo energía**.
- Esa energía se usa para **bombar protones (H^+)** desde la matriz al **espacio intermembrana**, creando un **gradiente de protones**.
- El último aceptor es el **O₂**, que se reduce a **H₂O**.
- **Sustratos:** **NADH, FADH₂ y O₂**. **Productos:** **NAD⁺, FAD y H₂O** (y el gradiente de H^+).

Componentes (sin necesidad de memorizarlos): complejo I (recibe los electrones del NADH), complejo II (los del FADH₂), ubiquinona o coenzima Q, complejo III, citocromo c y complejo IV (citocromo oxidasa, que los cede al O₂). Los complejos I, III y IV bombean protones.

7

La fosforilación oxidativa

La **fosforilación oxidativa** es la **síntesis de ATP por la ATP sintasa** gracias a un **gradiente de protones** creado por el **flujo de electrones por la cadena de transporte hasta el oxígeno**. Ocurre en la **membrana mitocondrial interna**.

- Los protones acumulados en el espacio intermembrana vuelven a la matriz a favor de su gradiente, pero **solo pueden hacerlo a través de la ATP sintasa**, porque la **bicapa lipídica es impermeable a los protones**. Ese flujo hace funcionar la enzima, que une ADP y Pi.
- **Sustratos: ADP + Pi. Producto: ATP**. Es la fuente de la **mayor parte del ATP** de la respiración.
- La explicación es la **hipótesis quimiosmótica** de Mitchell (**premio Nobel de Química en 1978**).

¿Y SI SE PERFORA LA MITOCONDRIA? (PAU 2017)

No habría fosforilación oxidativa: hace falta la **integridad de las membranas** para mantener el **gradiente de protones**; los protones deben volver a la matriz **a través de la ATP sintasa**, y por el orificio se escaparían sin producir ATP.

8

La β -oxidación de los ácidos grasos

Las grasas de reserva (**triglicéridos**, almacenados en el citoplasma de los adipocitos) se **hidrolizan** primero (**lipólisis**) en **glicerina y ácidos grasos**. Los ácidos grasos se activan uniéndose a la coenzima A y entran en la mitocondria, donde se degradan por **β -oxidación**.




Figura 5. La β -oxidación separa el ácido graso en unidades de dos carbonos.

- **Localización:** **matriz mitocondrial** (también en los **peroxisomas**, para ácidos grasos muy largos).
- **Sustrato:** **ácidos grasos** (activados como acil-CoA). **Productos:** **acetil-CoA, NADH y FADH₂**.
- En cada vuelta se separan **dos carbonos** como acetil-CoA y se forman **1 NADH y 1 FADH₂**. El acetil-CoA va al ciclo de Krebs y las coenzimas, a la cadena respiratoria.
- Necesita O₂ (indirectamente), porque el NADH y el FADH₂ solo se reoxidan en la cadena respiratoria.

CUENTAS CON UN ÁCIDO GRASO DE 18 CARBONOS (PAU 2025, ASTURIAS)

18 C $\rightarrow$ 9 acetil-CoA en 8 vueltas (8 NADH + 8 FADH₂). En el ciclo de Krebs, cada acetil-CoA da 3 NADH y 1 FADH₂ (27 + 9). Total: **35 NADH y 17 FADH₂**. Los criterios oficiales escriben 16 FADH₂ en el total, pero su propio desglose (8 + 9) da 17.

9 Rendimiento y comparación con la fermentación




Figura 6. La respiración rinde muchísimo más que la fermentación.

	Respiración aerobia	Fermentación
Oxidación de la glucosa	Completa , hasta CO₂ y H₂O	Parcial : queda una molécula orgánica (lactato, etanol)
Aceptor final de electrones	O ₂	Una molécula orgánica
Dónde	Citosol + mitocondria	Citosol
ATP por glucosa	Muchos (36-38 en los cálculos clásicos; unos 30-32 en los actuales)	2 , solo los de la glucólisis
Productos	ATP, CO₂ y H₂O	Ácido láctico, o etanol y CO ₂ ; NAD ⁺

La fermentación es **menos rentable** porque **los sustratos no se oxidan completamente** y el ATP solo procede de la glucólisis; la respiración añade el ciclo de Krebs y, sobre todo, la fosforilación oxidativa.

10 La respiración anaerobia

Algunos **microorganismos** (sobre todo bacterias) oxidan **completamente** la materia orgánica **sin oxígeno**: tienen cadena de transporte de electrones, pero el **aceptor final** es otra sustancia inorgánica, como el **nitrato** (NO_3^-), el **sulfato** (SO_4^{2-}) o el CO_2 .

- **Diferencia con la fermentación**: en la respiración anaerobia hay **cadena respiratoria** y la oxidación es completa; en la fermentación no hay cadena y el aceptor es **orgánico**.
- Rinde menos que la aerobia, pero mucho más que la fermentación. *Las bacterias que reducen nitratos o sulfatos son importantes en los ciclos del nitrógeno y del azufre.*

11 Razonamientos frecuentes

Situación	Razonamiento
Rotenona (veneno de pesca amazónico), monóxido de carbono o cianuro	Bloquean la cadena de transporte de electrones : cesa el consumo de O_2 (que deja de ser aceptor), no hay gradiente de H^+ ni producción de ATP , y las células mueren .
Glóbulos rojos humanos (sin mitocondrias)	Obtienen energía por glucólisis y fermentación láctica ; el O_2 no les afecta y el rendimiento es menor (2 ATP) .
Procariotas sin mitocondrias	No son todas anaerobias: tienen la maquinaria del catabolismo aerobio en el citosol y la membrana.
Bloqueo de la glucólisis (2-desoxiglucosa) con glucosa como única fuente	Las células mueren: no hay ATP ni por glucólisis ni por fosforilación oxidativa. Con ácidos grasos sobreviven gracias a la β-oxidación , el ciclo de Krebs y la respiración.
Daño en los transportadores de glucosa	La glucosa no entra y no se respira, pero la persona sobrevive obteniendo energía de proteínas y ácidos grasos .
Células tumorales (efecto Warburg)	Captan mucha glucosa y hacen glucólisis y fermentación láctica aunque haya oxígeno: obtienen poca energía por glucosa y compensan consumiendo mucha.

12 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo

1,5 puntos

Con imagen

Una figura representa un proceso de la célula eucariota con NADH (A), FADH₂ (B), agua (C), transporte de electrones (D) y síntesis de ATP (E). a) Orgánulo y localización [0,2]. b) Compartimentos 1 a 5 [0,5]. c) A, B, C y los procesos D y E [0,7]. d) Una ruta que tenga lugar donde se forman A y B [0,2]. e) Molécula generada en E y sus componentes [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Mitocondrias**; **membrana mitocondrial interna** (crestas). b) 1: **citósol**; 2: **membrana externa**; 3: **espacio intermembrana**; 4: **membrana interna**; 5: **matriz**.
c) A: **NADH**; B: **FADH₂**; C: **H₂O**; D: **transporte de electrones**; E: **fosforilación oxidativa**. d) **Ciclo de Krebs** (o **β-oxidación**). e) **ATP**: **ribosa**, **adenina** y **tres grupos fosfato**.

PAU 2017 · Junio (y 2014, 2016)

2 puntos

a) Localización de la glucólisis [0,1]. b) Moléculas de partida y finales [0,4]. c) Rutas que puede seguir el producto final [0,5]. d) Compuestos iniciales y productos finales de cada una [1].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Citósol**. b) **Glucosa, NAD⁺, ADP y Pi** → **piruvato, NADH + H⁺ y ATP**. c) **Fermentaciones** (anaeróbica) y **ciclo de Krebs** (aeróbica). d) Fermentaciones: **piruvato** → **lactato o etanol y NAD⁺**. Krebs: **acetil-CoA y oxalacético** → **CO₂, NADH + H⁺, FADH₂ y GTP (ATP)**.

PAU 2021 · Suplente julio (y 2011, 2016)

2 puntos

a) Defina ciclo de Krebs [0,4]. b) ¿En qué parte de la célula vegetal se realiza? [0,2] c) Dos compuestos imprescindibles para cada vuelta [0,2] y d) su procedencia [0,4]. e) Productos que ceden electrones a la cadena [0,4]. f) Diferencia entre Krebs y Calvin respecto al ATP [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Vía metabólica central** de los aerobios que **oxida los grupos acetilo hasta CO₂** y produce **ATP y NADH**. b) **Matriz mitocondrial**. c) **Oxalacético** y **acetil-CoA**. d) El oxalacético **se regenera en cada vuelta**; el acetil-CoA procede de la **descarboxilación oxidativa del pirúvico** o de la **β-oxidación**. e) **NADH y FADH₂**. f) Krebs es **catabólico** y **produce ATP**; Calvin es **anabólico** y **consume ATP**.

PAU 2022 · Suplente junio (y 2012)

2 puntos

a) Defina glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa [1,2]. b) Dónde se realizan [0,3]. c) ¿En qué condiciones (aeróbicas o anaeróbicas) se producen la glucólisis y el ciclo de Krebs? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Glucólisis: los azúcares se **degradan de forma incompleta con producción de ATP**. Krebs: vía central que **oxida grupos acetilo hasta CO₂**. Fosforilación oxidativa: **flujo de electrones hasta el oxígeno** con un **gradiente de protones** que se usa para **sintetizar ATP**.

b) Glucólisis: **citoplasma**; Krebs: **matriz mitocondrial**; fosforilación oxidativa: **membrana mitocondrial interna**. c) Glucólisis: **aeróbica y anaeróbica**; Krebs: **aeróbica**.

PAU 2024 · Titular A

1 punto

Con imagen

En una figura de la respiración: a) ¿Qué proceso representa en su conjunto? [0,1] b) Nombre las rutas A, B y C [0,3]. c) Localice NADH + H⁺, H₂O, ADP + Pi, O₂, ATP y NAD⁺ [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Respiración celular**. b) A: **ciclo de Krebs**; B: **cadena de transporte electrónico**; C: **fosforilación oxidativa**. c) En la figura del examen: NADH + H⁺: **3**; H₂O: **2**; ADP + Pi: **5**; O₂: **1**; ATP: **6**; NAD⁺: **4**. Para orientarte en cualquier figura: el NADH entra en la cadena y sale como NAD⁺, el O₂ se reduce a H₂O al final de la cadena, y el ADP + Pi se unen en la ATP sintasa para dar ATP.

PAU 2015

2 puntos

Con imagen

En el esquema de un orgánulo: a) ¿Qué orgánulo es? ¿Qué proceso es 1? ¿Y 2 a 6? ¿Con qué compuesto Y empieza y con cuál W termina? ¿Qué pasaría si faltara W? [1] b) ¿Qué es 7 y en qué proceso interviene? ¿Qué es X y por qué solo entra por 7? ¿Qué compuesto B se obtiene? [1]

▼ Ver respuesta modelo

a) **Mitocondria**; 1: **ciclo de Krebs**; 2-6: **cadena de transporte electrónico**; Y: **NADH**; W: **oxígeno**. Sin oxígeno **se inhibiría la respiración celular**.

b) 7: **ATP sintasa**, en la **fosforilación oxidativa**. X: **protones (H⁺)**; solo pasan por 7 porque la **bicapa lipídica es impermeable a los protones**. B: **ATP**.

PAU 2015

1 punto

El monóxido de carbono inhibe la citocromo c oxidasa de la cadena respiratoria. ¿Qué efecto tiene sobre el consumo de O_2 ? [0,5] ¿Y sobre la producción de ATP? [0,25] ¿Podrían vivir las células? [0,25]

▼ Ver respuesta modelo

El **consumo de O_2 cesaría**: al bloquearse la cadena, el O_2 ya no actúa como **aceptor final de electrones**.
La **producción de ATP cesaría**: sin transporte de electrones no hay **gradiente de H^+** . **No**: sin ATP suficiente las células **morirían**.

PAU 2024 · Titular B (y 2014, 2017)

1 punto

Los eritrocitos humanos carecen de mitocondrias. a) ¿Cómo obtienen energía? [0,4] b) ¿Les afecta el nivel de oxígeno? [0,3] c) ¿Su rendimiento es mayor o menor que el de otras células? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

a) Por **fermentación (láctica)**, porque **sin mitocondrias no hay respiración celular**. b) **No afecta**: la fermentación **no requiere oxígeno**. c) **Menor**: solo **2 ATP** de la glucólisis.

PAU 2017 · Junio

1 punto

Si se hace un orificio en las membranas externa e interna de una mitocondria, ¿podrá seguir realizando la fosforilación oxidativa? [1]

▼ Ver respuesta modelo

No. La fosforilación oxidativa está **acoplada a la cadena de transporte electrónico** de la **membrana interna** y necesita la **integridad de las membranas** para mantener el **gradiente de protones**; los protones deben volver a la matriz **a través de la ATP sintasa**.

PAU 2025 · Madrid

2 puntos

a) Respiración celular y fermentación láctica: metabolito común, requerimiento de O_2 , productos finales y causa de la diferencia de ATP [1]. b) Orgánulo y compartimento de la β -oxidación y sus tres productos finales [1].

▼ Ver respuesta modelo

a) Parten de la **glucosa** (o del **piruvato**); la respiración necesita **O_2** y la fermentación ocurre **en su ausencia**; respiración: **ATP, CO_2 y H_2O** ; fermentación: **ácido láctico** (y NAD^+); la respiración **oxida completamente la glucosa** y la fermentación solo produce ATP **en la glucólisis**.

b) **Matriz mitocondrial**; productos: **acetil-CoA**, **$NADH$** y **$FADH_2$** .

Las células procariotas carecen de mitocondrias. ¿Implica que todas tienen metabolismo anaerobio obligado? [1]

▼ Ver respuesta modelo

No: pueden tener **toda la maquinaria enzimática del catabolismo aerobio**, que **no precisa mitocondrias** (la cadena respiratoria está en su membrana plasmática).

Durante una carrera larga, al principio los músculos obtienen energía sobre todo de la glucosa y del glucógeno, y después, cada vez más, de los ácidos grasos. a) ¿Qué rutas degradan los ácidos grasos y dónde? [0,5] b) ¿Por qué hace falta seguir respirando oxígeno para quemar grasa? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Primero la lipólisis libera los ácidos grasos de los triglicéridos; en la matriz mitocondrial, la β -oxidación los convierte en acetil-CoA, que se oxida en el ciclo de Krebs; el NADH y el FADH₂ van a la cadena respiratoria de la membrana interna, donde se produce el ATP. b) Porque el NADH y el FADH₂ que forman la β -oxidación y el ciclo de Krebs solo se reoxidan cediendo sus electrones al O₂ en la cadena respiratoria; sin O₂ ambas rutas se detienen. Las grasas no pueden usarse por fermentación.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Cuántos ATP netos da la glucólisis? ¿Por qué mecanismo? **Ver**

2, por fosforilación a nivel de sustrato.

2. ¿Necesita oxígeno la glucólisis? **Ver**

No.

3. ¿Qué ocurre con el piruvato al entrar en la mitocondria? **Ver**

Descarboxilación oxidativa: acetil-CoA + CO₂ + NADH.

4. ¿Con qué molécula se une el acetil-CoA al empezar el ciclo de Krebs? **Ver**

Con el oxalacético.

5. ¿Qué produce una vuelta del ciclo de Krebs? **Ver**

2 CO₂, 3 NADH, 1 FADH₂ y 1 GTP.

6. ¿Cuál es el aceptor final de la cadena respiratoria? **Ver**

El O₂, que se reduce a agua.

7. ¿Por qué los protones solo vuelven a la matriz por la ATP sintasa? **Ver**

Porque la bicapa lipídica es impermeable a ellos.

8. ¿Qué productos da la β -oxidación y dónde ocurre? **Ver**

Acetil-CoA, NADH y FADH_2 , en la matriz mitocondrial.

9. ¿En qué se diferencia la respiración anaerobia de la fermentación? **Ver**

La respiración anaerobia tiene cadena respiratoria y un aceptor inorgánico distinto del O_2 ; la fermentación no tiene cadena y su aceptor es orgánico.

10. ¿Por qué el cianuro es mortal? **Ver**

Bloquea la cadena respiratoria: no se forma el gradiente de protones ni ATP.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Campbell y Reece, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.