

# Regulación de la expresión génica

Todas tus células tienen los mismos genes, pero una neurona no se parece a un glóbulo blanco. La clave está en qué genes se encienden y cuáles se apagan.

**Palabra clave** = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

**Texto en violeta** = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

## 1 Qué entra en la PAU

### DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

**B.5.3** Regulación de la expresión génica: reconocimiento de su importancia en la diferenciación celular.

1. Conocer el modelo del operón como sistema de regulación de la transcripción en procariotas, utilizando como ejemplo el operón lactosa.
2. Comprender los distintos niveles de regulación de la expresión génica en eucariotas (grado de condensación de la cromatina, transcripción y maduración del ARNm), identificando el grado de condensación del ADN (eucromatina y heterocromatina) como un factor clave de diferenciación celular.
3. Comprender que las características específicas de cada tipo celular dependen del conjunto de genes que se expresan en ella.

### UN CONTENIDO CASI NUEVO

En los exámenes de Andalucía de 2010-2025 apenas se ha preguntado (sí la idea de que dos células del mismo individuo tienen el mismo genoma pero distintas proteínas). Con las directrices de 2026-27 es fácil que aparezca en preguntas competenciales: **interpretar un esquema del operón, predecir qué pasa con o sin lactosa o razonar la diferenciación celular.**

## 2 ¿Por qué regular la expresión génica?

Una célula **no expresa todos sus genes a la vez**. La **regulación de la expresión génica** es el conjunto de mecanismos que controlan **qué genes se expresan, cuándo y en qué cantidad**.

- **Ahorro**: fabricar proteínas cuesta mucha energía y materia; solo se fabrican las que se necesitan.
- **Adaptación al medio** (sobre todo en bacterias): por ejemplo, fabricar las enzimas que digieren la lactosa solo cuando hay lactosa.
- **Diferenciación celular** (en pluricelulares): cada tipo celular expresa un conjunto distinto de genes.

| Tipo de gen                | Qué hace                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genes estructurales</b> | Codifican las proteínas que la célula usa (enzimas, proteínas estructurales...) |

| Tipo de gen                                   | Qué hace                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genes reguladores</b>                      | Codifican proteínas que <b>controlan la expresión</b> de otros genes (por ejemplo, el represor del operón) |
| <b>Genes de mantenimiento (constitutivos)</b> | Se expresan siempre y en todas las células porque son imprescindibles (enzimas de la glucólisis, ARNr...)  |

### 3 Procariotas: el operón lactosa

Un **operón** es un conjunto de **genes estructurales contiguos**, con funciones relacionadas, que se transcriben juntos en un solo ARNm (policistrónico) bajo el control de **un mismo promotor y un mismo operador**. Lo propusieron Jacob y Monod (1961; premio Nobel en 1965) estudiando *Escherichia coli*. La regulación ocurre sobre todo **en la transcripción**.

## Elementos

| Elemento                   | Qué es                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genes estructurales</b> | Codifican las enzimas que metabolizan la lactosa: <i>lacZ</i> ( $\beta$ -galactosidasa, que hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa), <i>lacY</i> (permeasa, que la introduce en la célula) y <i>lacA</i> (transacetilasa) |
| <b>Promotor</b>            | Secuencia donde se <b>une la ARN polimerasa</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Operador</b>            | Secuencia, entre el promotor y los genes, donde se une el <b>represor</b> ; actúa como un «interruptor»                                                                                                                        |
| <b>Gen regulador</b>       | Gen próximo ( <i>lacI</i> ) que codifica la <b>proteína represora</b> ; se expresa siempre                                                                                                                                     |
| <b>Inductor</b>            | Molécula que inactiva al represor: la <b>lactosa</b> (en realidad, la alolactosa, un isómero que se forma a partir de ella)                                                                                                    |




Figura 1. Funcionamiento del operón lactosa.

## Funcionamiento

1. **Sin lactosa:** el represor, activo, **se une al operador** e **impide que la ARN polimerasa transcriba** los genes estructurales. No se fabrican enzimas que no hacen falta: el operón está **reprimido**.
2. **Con lactosa:** el inductor **se une al represor**, que **cambia de conformación** y **ya no puede unirse al operador**. La ARN polimerasa transcribe los genes estructurales y se fabrican las enzimas que permiten aprovechar la lactosa: el operón está **inducido**.
3. Cuando se agota la lactosa, el represor vuelve a estar activo y el operón se apaga de nuevo.

### RAZONAR CON MUTACIONES (MUY COMPETENCIAL)

- **Operador alterado** (el represor no se une) o **represor que no funciona** → los genes se expresan **siempre**, haya o no lactosa.
- **Represor que no reconoce el inductor** → el operón queda **siempre apagado**, aunque haya lactosa.
- **Promotor alterado** (la ARN polimerasa no se une) → **nunca** se expresan.

### PARA SABER MÁS

Si en el medio hay glucosa y lactosa, la bacteria usa primero la glucosa: el operón lac se expresa muy poco hasta que la glucosa se agota (represión catabólica, mediada por el AMPc). Además, hay operones reprimibles, como el del triptófano: sus genes fabrican triptófano y se apagan cuando hay mucho, porque el propio triptófano activa a su represor.

## 4 Eucariotas: niveles de regulación

En eucariotas no hay operones: cada gen tiene su propio promotor y da un ARNm **monocistrónico**. La regulación es más compleja y se produce en **varios niveles**:




Figura 2. Los tres niveles que piden las directrices, en rojo.

## 1. Grado de condensación de la cromatina

Solo pueden transcribirse los genes situados en la cromatina **poco condensada (eucromatina)**, porque la ARN polimerasa y los factores de transcripción tienen acceso al ADN. Los genes de la **heterocromatina**, muy condensada, quedan **silenciados**. Lo verás en detalle en el apartado siguiente.


## 2. Transcripción

La ARN polimerasa eucariota necesita **factores de transcripción**, proteínas que se unen al promotor y a otras secuencias reguladoras del ADN y **activan o inhiben** la transcripción. Cada tipo celular tiene **su propia combinación** de factores de transcripción, y por eso transcribe genes distintos. *Algunas señales externas actúan aquí: por ejemplo, las hormonas esteroideas entran en la célula, se unen a un receptor y el complejo actúa como factor de transcripción.*

## 3. Maduración del ARNm

El transcrito primario puede procesarse de distintas formas. Con el **empalme alternativo**, un mismo pre-ARNm conserva unos exones u otros y origina **ARNm diferentes** y, por tanto, **proteínas diferentes** a partir de **un solo gen**. *Por eso los unos 20 000 genes que codifican proteínas en el genoma humano dan lugar a muchas más proteínas distintas.*

### Un gen, varias proteínas: empalme alternativo




Según el tipo de célula se conservan unos exones u otros (los intrones siempre se eliminan).

Figura 3. Empalme alternativo.

También se regula la salida del ARNm del núcleo, su duración en el citoplasma, la traducción y la activación o degradación de las proteínas; las directrices no lo exigen.

## 5

## Eucromatina y heterocromatina



En el núcleo interfásico la cromatina presenta distintos grados de condensación:

- **Eucromatina**: poco condensada (laxa); es la **cromatina activa**, cuyos genes se transcriben. Al microscopio electrónico se ve **clara**.
- **Heterocromatina**: muy condensada; es la **cromatina no activa**: sus genes no se transcriben. Se ve **oscura**, a menudo junto a la envoltura nuclear.

Figura 4. Núcleo interfásico al microscopio electrónico (esquema).




Figura 5. El grado de condensación decide si un gen es accesible.

- **Heterocromatina constitutiva**: está condensada en todas las células (por ejemplo, junto a los centrómeros y en los telómeros).
- **Heterocromatina facultativa**: se condensa solo en algunas células, y así **silencia los genes que ese tipo celular no necesita**. Por eso es un **factor clave de la diferenciación celular**. Ejemplo clásico: en las células de las hembras de mamífero uno de los dos cromosomas X se condensa casi por completo y la mayoría de sus genes quedan inactivos (corpúsculo de Barr).



La condensación depende de modificaciones químicas que no cambian la secuencia del ADN, como la acetilación de las histonas (descondensa) o la metilación del ADN (condensa y silencia). Se heredan al dividirse la célula y se estudian en la epigenética.

## 6

## Expresión génica y diferenciación celular

Todas las **células somáticas de un individuo contienen el mismo genoma**, porque proceden del cigoto por mitosis. Sin embargo, una célula hepática y una renal fabrican proteínas distintas: las células **se especializan expresando proteínas diferentes** por una **expresión diferencial del genoma**.

Todas tienen el mismo genoma; cada una expresa genes distintos

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Hepatocito                                                                        | Célula β del páncreas                                                             | Fibra muscular                                                                      |
| Enzimas de la glucólisis    | se expresa                                                                        | se expresa                                                                        | se expresa                                                                          |
| Albumina                    | se expresa                                                                        | silenciado                                                                        | silenciado                                                                          |
| Insulina                    | silenciado                                                                        | se expresa                                                                        | silenciado                                                                          |
| Actina y miosina musculares | silenciado                                                                        | silenciado                                                                        | se expresa                                                                          |
| Hemoglobina                 | silenciado                                                                        | silenciado                                                                        | silenciado                                                                          |

Genes de mantenimiento (glucólisis): en todas las células · Genes específicos: solo en un tipo celular.

Figura 6. Mismo genoma, distinto conjunto de genes activos.

- Las **características de cada tipo celular** (forma, función, proteínas) dependen del **conjunto de genes que se expresan** en ella.
- Los **genes de mantenimiento** se expresan en todas las células; los **genes específicos**, solo en un tipo celular (la insulina, en las células β del páncreas; la albúmina, en los hepatocitos).
- Durante el desarrollo embrionario, la diferenciación se consigue condensando en heterocromatina los genes que no se usarán y activando, con factores de transcripción concretos, los que caracterizan cada tejido.

### UNA PRUEBA: LA CLONACIÓN

La oveja Dolly (1996) se obtuvo con el núcleo de una célula de glándula mamaria introducido en un óvulo sin núcleo. Que de un núcleo diferenciado saliera un animal completo demuestra que las células diferenciadas conservan todos los genes: lo que cambia es cuáles se expresan.

## 7 Regulación en procariotas y eucariotas

|                     | Procariotas                                                         | Eucariotas                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para qué            | Adaptarse rápidamente a los cambios del medio                       | Además, la <b>diferenciación celular</b> y el desarrollo                                                                   |
| Organización        | <b>Operones</b> : varios genes, un promotor, un ARNm policistrónico | Cada gen con su promotor; ARNm monocistrónico                                                                              |
| Niveles principales | Sobre todo la <b>transcripción</b> (represor y operador)            | <b>Condensación de la cromatina</b> , <b>transcripción</b> (factores de transcripción), <b>maduración del ARNm</b> y otros |
| Cromatina           | No hay (ADN sin histonas)                                           | Euromatina / heterocromatina                                                                                               |

PAU 2017 · Reserva B

1 punto

Si comparamos una célula hepática con una célula renal del mismo individuo: a) ¿contendrá su ADN la misma información genética? [0,5]; b) y las proteínas de ambas células, ¿serán las mismas? [0,5]. Razone las respuestas.

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Sí**: todas las células somáticas de un individuo contienen el mismo genoma (proceden del cigoto por mitosis).
- b) **No**: las células se especializan expresando proteínas diferentes por una expresión diferencial del genoma. Comparten las de mantenimiento, pero cada una expresa además sus genes específicos.

Banco PAU · Biología celular

Con imagen

En una imagen del núcleo de una célula eucariota se señalan el nucleolo, la heterocromatina, un poro nuclear, la eucromatina y la envoltura nuclear. Indique una función de cada uno.

▼ Ver respuesta modelo

Nucleolo: biosíntesis de componentes de los ribosomas. Heterocromatina: cromatina no activa. Poro nuclear: transporte de moléculas a través de la envoltura. Eucromatina: cromatina activa. Envoltura nuclear: separa el núcleo del citoplasma.

Práctica BioCelia · estilo 26-27

2 puntos

Laboratorio

Se cultivan bacterias *E. coli* en tres medios y se mide la actividad  $\beta$ -galactosidasa: medio 1, sin lactosa: actividad casi nula; medio 2, con lactosa: actividad alta; medio 3, con lactosa, pero con una cepa mutante: actividad alta también en ausencia de lactosa. a) ¿Qué es un operón? Nombre sus elementos [0,6]. b) Explique los resultados de los medios 1 y 2 [0,8]. c) Proponga dos mutaciones que expliquen el resultado de la cepa mutante [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

- a) Conjunto de genes estructurales contiguos que se transcriben juntos en un único ARNm bajo el control de un mismo promotor y un mismo operador. Elementos: genes estructurales, promotor, operador y gen regulador (que codifica el represor).
- b) Sin lactosa, el represor se une al operador e impide que la ARN polimerasa transcriba los genes: no hay  $\beta$ -galactosidasa. Con lactosa, el inductor se une al represor, que cambia de forma y se separa del operador: se transcriben los genes y se fabrica la enzima.
- c) Una mutación en el operador que impida la unión del represor, o una mutación en el gen regulador que produzca un represor no funcional. En ambos casos los genes se expresan siempre.

En las micrografías electrónicas de los núcleos de neuronas maduras se observa mucha heterocromatina, mientras que en las células madre embrionarias predomina la eucromatina. a) Explique la diferencia entre ambos tipos de cromatina [0,5]. b) Relacione esta observación con la diferenciación celular [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) La eucromatina está poco condensada y sus genes son accesibles y se transcriben (cromatina activa); la heterocromatina está muy condensada y sus genes no se transcriben (cromatina inactiva).

b) Las células madre embrionarias aún pueden originar muchos tipos celulares y mantienen accesibles muchos genes. Al diferenciarse, la neurona condensa en heterocromatina los genes que no necesita y solo expresa los propios de su función: su especialización depende del conjunto de genes que expresa.

El gen de la calcitonina se expresa en la tiroides y en algunas neuronas, pero cada tejido obtiene una proteína distinta a partir del mismo gen. a) ¿En qué nivel de la regulación se explica este hecho? [0,4] b) Explique el mecanismo [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

a) En la maduración del ARNm (procesamiento postranscripcional). b) Mediante empalme alternativo: del mismo transcrito primario se eliminan los intrones, pero cada tejido conserva una combinación distinta de exones; se obtienen ARNm maduros diferentes que se traducen en proteínas diferentes (en la tiroides, la calcitonina; en las neuronas, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o CGRP).

## 9

## Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué es un operón? **Ver**

Conjunto de genes estructurales contiguos que se transcriben en un solo ARNm bajo el control de un mismo promotor y operador.

2. ¿Dónde se une el represor? ¿Y la ARN polimerasa? **Ver**

Al operador; al promotor.

3. ¿Qué gen codifica el represor? **Ver**

El gen regulador.

4. ¿Qué hace la lactosa (inductor) sobre el represor? **Ver**

Se une a él, le cambia la conformación y le impide unirse al operador.

5. Si el operador está mutado y el represor no puede unirse, ¿qué ocurre? **Ver**

Los genes se expresan siempre, haya o no lactosa.

**6.** Cita los tres niveles de regulación eucariota de las directrices. **Ver**

Condensación de la cromatina, transcripción y maduración del ARNm.

---

**7.** ¿Qué cromatina es activa? **Ver**

La eucromatina (poco condensada).

---

**8.** ¿Qué son los factores de transcripción? **Ver**

Proteínas que se unen al ADN y activan o inhiben la transcripción de los genes.

---

**9.** ¿Cómo puede un gen dar varias proteínas? **Ver**

Por empalme alternativo del pre-ARNm.

---

**10.** ¿Por qué una neurona y un linfocito del mismo individuo son tan distintos? **Ver**

Tienen el mismo genoma pero expresan conjuntos distintos de genes (expresión diferencial).

---

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2017) y banco de preguntas del departamento; resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.