

VeroniQ 28

Acetato de Nomegestrol 2,5 mg. + Estradiol 1,5 mg.

17β

24
4



El anticonceptivo Natural para la mujer de Hoy



VeroniQ 28

Acetato de Nomegestrol 2.5 mg. + Estradiol 1.5 mg.

17 β ESTRADIOL/NOMEGESTROL

24/4 FARMACOCINÉTICA

 SEGURIDAD

 CARACTERÍSTICAS


El anticonceptivo Natural para la mujer de Hoy



Guía de uso



HOME



La portada-índice inicial muestra todas las secciones del material. Pulse en el icono dónde desee entrar.

MENÚ PRINCIPAL



El menú principal está presente en todo el material. Clique dónde le interese ir. Puede desplegar o plegar el menú.

SWIPE



El movimiento swipe le permitirá ir avanzando o retroceder por el material.

INTERACCIÓN



Las interacciones están indicadas en las slides que las contengan. Estas le permiten interactuar con la información.

CERRAR



Para salir del Pop Up, pulse el icono en forma de "X" que aparece en el extremo superior derecho.



17 β eta Estradiol

Nomegestrol

17 β

24
4



17β Estradiol



Químicamente idéntico al Estradiol Endógeno



Las características cualitativas de las respuestas estrogénicas, son casi idénticas a las de la molécula de estradiol endógeno nativo.

Bajo impacto sobre los parámetros de la coagulación



Menor riesgo de tromboembolismo venoso.

Efecto neutro sobre parámetros metabólicos



- Perfil Lipídico

- Carbohidratos






17β

24
4



Nomegestrol



-  **Progestina con fuerte actividad anti-gonadotrópica anovulatoria**
-  **Vida media de 36 horas**
 -  Mayor seguridad anticonceptiva
-  **Sin actividad glucocorticoide**
 -  Sin retención de Líquidos

17β


24
4



VeroniQ 28

Brinda mejores resultados en las alteraciones ligadas al periodo libre de hormonas (*cefalea y dolor pélvico*) debido a su esquema posológico 24+4

El anticonceptivo hormonal combinado que contiene NOMAC[⊕] y 17 β estradiol se presenta en pauta de 24 días de comprimidos activos y 4 días de placebo.



17 β

24
4



NOMAC | Acetato de Nomegestrol.



La semivida de eliminación ($t_{1/2}$) es de 46 hs
(límites: 28 y 83 h) en el estado estacionario.

17 β

24
4





Seguridad

Tolerabilidad




17β


24
4



← Seguridad del Estradiol/ Acetato de Nomegestrol



**Enfermedad
Tromboembólica
Venosa**



**Cáncer
de Mama**



17β

24
4



Enfermedad Tromboembólica Venosa



Esta combinación fue mejor tolerada a nivel metabólico y con menos impacto en los parámetros de coagulación.

17β

24
4



Cáncer de Mama



NOMAC posee un beneficio global, un efecto antiestrogénico en las enzimas involucradas en la biosíntesis del estrógeno y el metabolismo. NOMAC ha demostrado las siguientes acciones reduciendo la producción local de E2

1. Inhibe el sulfato de estrona
2. Inhibe la 17β -hidroesteroide deshidrogenasa tipo 1.
3. Estimula la sulfotransferencia.

Venosa



17 β

24
4



← Tolerabilidad del Estradiol/ Acetato de Nomegestrol



**Patrón de
Sangrado**

17β

24
4



Patrón de Sangrado



En general el patrón de sangrado de E 2 /NOMAC se caracteriza por menos días de sangrado y/o manchado, episodios de sangrado más cortos

En lo que respecta a la ausencia de sangrado por deprivación, E 2 /NOMAC se observó un incremento progresivo de la amenorrea, desde el 22% en el ciclo 4 hasta el 31% en el ciclo 12.

17β

24
4





Contiene Acetato de
Nomegestrol, un progestágeno
con vida media prolongada.



Menor efecto sobre el colesterol, la
glucemia y los parámetros de la
coagulación.



Ofrece una Alta Eficacia
Anticonceptiva con un excelente
control del ciclo.



Presentación 28 comprimidos

24 comp. recubiertos
activos blancos



4 comp. recubiertos
placebos rojos

17 β

24
4



Referencias

Fórmula: Cada comprimido recubierto de color blanco contiene: Nomegestrol acetato 2,5mg, Estradiol (comohemihidrato) 1,5mg y excipientes c.s. Cada comprimido recubierto de color rojo contiene: excipientes c.s.

Acción terapéutica: Anticonceptivo. Regula los ciclos menstruales. **Indicaciones:** Evitar el embarazo.

Posología y forma de administración: Para lograr la mayor eficacia anticonceptiva VeroniQ 28 debe ser tomado según estas instrucciones y a intervalos no mayores a 24 horas.

Comienzo del tratamiento: El 1 día del ciclo menstrual, esto es el 1 día de sangrado menstrual, se comienza a tomar por vía oral el 1 comprimido del envase. Luego se toma 1 comprimido por día, siempre a la misma hora, durante 28 días consecutivos. El orden de la toma debe ser primero los 24 comprimidos blancos y luego los 4 comprimidos rojos. Cada envase se comienza el mismo día de la semana que se tomó el primer comprimido del primer envase. El sangrado se presenta durante la toma de los comprimidos de color rojo. Si la toma ha comenzado exactamente el 1er día de sangrado menstrual, no es necesario agregar ningún otro método anticonceptivo. Si el tratamiento no comienza en estas condiciones, debe utilizarse un método adicional (de barrera: ej. preservativo).

Comienzo del tratamiento: El 1er día del ciclo menstrual, esto es el 1er día de sangrado menstrual, se comienza a tomar por vía oral el 1er comprimido del envase. Luego se toma 1er comprimido por día, siempre a la misma hora, durante 28 días consecutivos. El orden de la toma debe ser primero los 24 comprimidos blancos y luego los 4 comprimidos rojos. Cada envase se comienza el mismo día de la semana que se tomó el primer comprimido del primer envase. El sangrado se presenta durante la toma de los comprimidos de color rojo. Si la toma ha comenzado exactamente el 1er día de sangrado menstrual, no es necesario agregar ningún otro método anticonceptivo. Si el tratamiento no comienza en estas condiciones, debe utilizarse un método adicional (de barrera: ej. preservativo).

Continuación del tratamiento: Los siguientes envases se comienzan el mismo día de la semana que el 1er comprimido del 1er envase, con el mismo régimen, 24 comprimidos blancos y luego los 4 comprimidos rojos.

Si por alguna razón los siguientes envases no se comenzaron el día indicado, debe usarse otro método adicional (de barrera: preservativo), al menos por 10 días. La protección anticonceptiva se mantiene durante todo el mes, incluidos los días que se toman los comprimidos rojos. **Olvido de la toma:** El olvido de la toma expone al riesgo de embarazo. Si se omitiera la toma de un comprimido deberá tomarse tan pronto como se recuerde. Si se constata el olvido antes de las 12 horas de la hora habitual, tómelo inmediatamente, y continúe con el tratamiento normalmente. Si hubieran pasado más de 12 horas, la efectividad disminuye.

En este caso deberá tomar el comprimido olvidado en el momento que lo recuerda y continúe con el tratamiento, aun cuando tenga que tomar 2 comprimidos el mismo día. En este caso deberá usar un método adicional de barrera, como preservativo, durante los siguientes 7 a 10 días. Si olvidara más de 1 comprimido, continúa con la toma de los siguientes, y debe utilizar preservativo hasta el inicio de un nuevo envase. Si no se presenta el sangrado luego de finalizados 28 días de tratamiento, especialmente si el tratamiento no se hubiera cumplido correctamente, se debe descartar la presencia de embarazo antes de comenzar un nuevo envase. **Abandono de tratamiento:** Si decide abandonar el tratamiento complete la toma del envase y no reinicie el tratamiento con uno nuevo. El siguiente ciclo puede durar unos días más que los anteriores. A partir de ese mes se recupera la capacidad de engendrar.

Precauciones: Las pacientes con trastornos del metabolismo lipídico, hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias deben ser evaluadas periódicamente en caso que opten por ser tratadas con anticonceptivos orales. Los progestágenos pueden elevar los niveles de LDL y hacer más difícil el control de hipercolesterolemia. Si la paciente desarrolla ictericia, la medicación debe ser suspendida y la paciente estudiada para descubrir la causa. Si las pacientes desarrollan síntomas de depresión mientras están tomando anticonceptivos orales, la medicación debe ser suspendida y un método alternativo de anticoncepción debe ser utilizado afin de determinar si la depresión esta relacionada a la medicación. Las pacientes que utilizan lentes de contacto y desarrollan cambios visuales mientras están tomando la medicación anticonceptiva o intolerancia a los lentes de contacto, deben ser evaluadas por un oftalmólogo. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

VeroniQ 28 no debe administrarse en presencia de embarazo o ante la sospecha de un embarazo, enfermedad del hígado, diabetes, enfermedad arterial o venosa. Está contraindicado en presencia de cáncer de mama, conocido o sospechado o de alguna otra neoplasia estrógena dependiente. VeroniQ 28 está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, hepática o adrenal.

Interacciones con otros medicamentos: El uso simultáneo de inductores enzimáticos (Rifampicina, Fenilbutazona, Fenitoína, Fenobarbital, Primidona, Carbamacepina, Topiramato, Felbamato, Griseofulvina) antibióticos (ej. Amoxicilina) y preparaciones con hipérico (hierba de san Juan) pueden disminuir la eficacia anticonceptiva. Asimismo, los inhibidores de la proteasa del VIH con un potencial inductor (por ejemplo, Ritonavir y Nelfinavir) y los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa (por ejemplo) Nevirapina y Efavirenz) pueden afectar al metabolismo hepático. El uso de anticonceptivos orales puede afectar la eficacia en los siguientes medicamentos: Ciclosporina, Teofilina, Diazepam, y probablemente otras benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos.

Efectos secundarios: En forma aislada y con poca frecuencia pueden presentarse cefaleas, gastralgias, náuseas, acné, disminución del deseo sexual, cambios de humor, dolor pélvico, tensión mamaria, estados depresivos o variaciones en el peso corporal. En pacientes susceptibles, los tratamientos prolongados pueden provocar la aparición de pigmentaciones faciales, que pueden aumentar con la exposición al sol.

17β

24/4

