●服用または使用する前に必ずお読み下さい。

ページ: 1/ 1

No	名前・効能・効果	用法・用量	色・形・記号	注意事項	
1	リリカカプセル7 5 mg - 神経性の痛みを和らげる 薬	課 朝 昼 夕 額 全28個 1日2回 朝・夕食後 14日分	LY RICへ 75mg 947.75mg 947.75mg 947.75mg Why 75mg Why 75	 ◆ 組合せに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。アルコール含有品にも、注意が必要です。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。薬の作用により、めまい、眠気、むくみなどの症状が起こることがあります。気になる場合は、ご相談下さい。 ◆ 眠気やめまい等が現れることがありますので、車の運転や危険を伴う作業は控えて下さい。 	
	この薬品には後発医薬品はありません。				
2	トラムセット配合錠 痛みを抑える薬	対 対 夕 線前 対 対 対 対 対 対 対 対 対	トラムセット で音段 5-4(2004 P-50,0004) 1-5 100 P-50,0004 J-C アイルムコーティング・錠 T/P 淡黄色	 ◆ 組合せのできない薬や、組合せに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。アルコール含有品にも、注意が必要です。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。薬の作用により、吐き気、眠気、便秘などの症状が起こることがあります。気になる場合は、ご相談下さい。 ◆ 眠気やめまいが現れることがありますので、車の運転や危険を伴う作業は控えて下さい。また、薬の作用に影響を及ぼすことがあるので、飲酒は控えるようにして下さい。 	
	この薬品には後発医薬品	はありません。			
3	ノバミン錠5mg 気分を落ち着かせる薬 吐き気を抑える薬	財 財 日 夕 額 全42錠 1日3回 毎食後 14日分	(85) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (1	 ◆組合せのできない薬や、組合せに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。有機燐殺虫剤には接触しないように注意して下さい。アルコール含有品にも、注意が必要です。 ◆発疹・かゆみ、日光皮膚炎などの過敏症状が現れた時は、お薬の中は薬剤師にご相談でもありますので、医師または薬剤師にご相談であります。 ◆眠気や注意力等の低下が現れることがありますので、車の運転や危険を伴う作業は控えとがあるので、飲酒は控えるようにして下さい。 	
	この薬品は昔からの医薬品です。				
医療機能 医療法 1 7 中間人名克格森特別の高度 第日女 ・ 州口ナ1 計りいり、 第日中1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7					

医療機関: 医療法人社団 春陽会参宮橋脊椎外科病院

TEL : 03-5308-0511 医師名 : 須藤 梓 先生 薬局名 : ㈱日本入試センター 薬局サンライズファーマシイ

TEL : 03-3370-7916





様 のお薬の説明書です☆

男性

他の病院、診療所にかかるとき、または薬局でお薬をお求めになるときはこの用紙を見せて下さい。 受付番号 指導日 2018年2月6日 ID No 00495-0 1. ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 <u>薬の作用</u> 痛みや炎症をやわらげ 注意事項 寝前 起床 朝 9 るお薬です。また、熱 を下げる作用もありま 1 1 1 1日3回毎食後 記号(2. レバミピド錠100mg「ファイザー」(白) 薬の作用胃潰瘍、胃炎のお薬で 注意事項 LKEEL 寝前 す。 起床 PAREE 1 1 1 1日3回毎食後 記号(RB100: PF/PFRB100: 100mg 7日分

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

参宮橋脊椎外科病院 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-57-1

TEL 03-5308-0511

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

