

Lense-Thirring-Effekt

Vortrag im Hauptseminar SoSe 2025

Marvin Henke - 10. Mai 2025

Betreuer: Dr. Nikodem Szpak

Lense-Thirring-Effekt

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
- Trajektorien

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
- Trajektorien
- Präzession

Lense-Thirring-Effekt

- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
- Trajektorien
- Präzession

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Lense-Thirring-Effekt


- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
 - Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
- Trajektorien
- Präzession

$$c = G = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Metrik und Geodäten

Metrik und Geodäten

$$c = G = 1$$
$$(+,-,-,-)$$




$$c = G = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$



Lense-Thirring-Effekt

Metrik und Geodäten


Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$

Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$


Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 \vec{x}^\lambda}{d\tau^2} = 0$$



Lense-Thirring-Effekt

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$


Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 \vec{x}^\lambda}{d\tau^2} = 0$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$


Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 \vec{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$


Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 \vec{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$



Einsteinsche Feldgleichungen

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Einstein'sche Feldgleichungen

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Einsteinsche Feldgleichungen

$c = G = 1$
 $(+, -, -, -)$

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [\mathbf{g}]$

Einsteinsche Feldgleichungen

$c = G = 1$
 $(+, -, -, -)$

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [\mathbf{g}]$

Krümmungsskalar: $R [\mathbf{g}]$

Einsteinsche Feldgleichungen

$c = G = 1$
 $(+, -, -, -)$

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [\mathbf{g}]$

Krümmungsskalar: $R [\mathbf{g}]$

Energie-Impuls-Tensor: $T_{\mu\nu}$

$c = G = 1$
 $(+, -, -, -)$

Linearisierung

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$\frac{d^2 \textcolor{teal}{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [\mathbf{g}(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\frac{d^2 \textcolor{teal}{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [\mathbf{g}(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

Gravitoelektromagnetismus

(+, -, -, -)

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $\mathbf{h} \ll \boldsymbol{\eta}$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial \textcolor{teal}{x}^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi \textcolor{red}{T}_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\frac{d^2 \textcolor{teal}{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [\mathbf{g}(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi \vec{j}$$

Gravitoelektromagnetismus

(+, -, -, -)

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $\mathbf{h} \ll \boldsymbol{\eta}$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial \mathbf{x}^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi \vec{j}$$

$$\frac{d^2 \mathbf{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [\mathbf{g}(\vec{\mathbf{x}})] \frac{d\mathbf{x}^\mu}{d\tau} \frac{d\mathbf{x}^\nu}{d\tau}$$

$$\frac{d^2 \mathbf{x}^i}{dt^2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial \mathbf{x}^i} + \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial \mathbf{x}^l} \frac{d\mathbf{x}^k}{dt}$$

Gravitoelektromagnetismus

(+, -, -, -)

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $\mathbf{h} \ll \boldsymbol{\eta}$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial \mathbf{x}^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi \vec{j}$$

$$\frac{d^2 \mathbf{x}^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [\mathbf{g}(\vec{\mathbf{x}})] \frac{d\mathbf{x}^\mu}{d\tau} \frac{d\mathbf{x}^\nu}{d\tau}$$

$$\frac{d^2 \mathbf{x}^i}{dt^2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial \mathbf{x}^i} + \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial \mathbf{x}^l} \frac{d\mathbf{x}^k}{dt}$$

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

Rotierende Kugelmasse

$c = G = 1$

(+, -, -, -)

Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$



$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$



Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$



Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M \vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x}) \vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5} M R^2$$

$$\vec{S} = I \vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M \vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x}) \vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5} M R^2$$

$$\vec{S} = I \vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$


$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M \vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x}) \vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5} M R^2$$

$$\vec{S} = I \vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$


$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$


$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$


$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M \vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]}$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$


$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M \vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]}$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Trajektorien




$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$




$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$




$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 1.00$$




$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 1.00$$




$c = G = R = 1$
 $(+, -, -, -)$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$



$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$



$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$




$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$



$$c = G = R = 1$$
$$(+,-,-,-)$$

Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$

