

Vortrag im Hauptseminar SoSe 2025

Marvin Henke - 5. Mai 2025

Betreuer: Dr. Nikodem Szpak





Offen im Denken

• Metrik und Geodäten



- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen



- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus



- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse



- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
- EM-Felder



- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
- EM-Felder
- Gravity Probe B




- Metrik und Geodäten
- Einsteinsche Feldgleichungen
- Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
- EM-Felder
- Gravity Probe B
- Paper





Offen im Denken






Offen im Denken

Fläche

$$\vec{r}(u, \mathbf{v}) = (u, \mathbf{v}, 0)$$



UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken


Fläche

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, 0)$$

Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_{\mu}\vec{r} \cdot \partial_{\nu}\vec{r}$$

$$oldsymbol{g} = \left[egin{array}{cc} 1 & 0 \ 0 & 1 \end{array}
ight]$$



UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Fläche

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, 0)$$


Metrik

$$\mathbf{g}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} \mathbf{r} \cdot \partial_{\nu} \mathbf{r}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{\mathrm{d}^2 p^{\lambda}}{\mathrm{d} \tau^2} = 0$$



UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Fläche

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, 0)$$


Metrik

$$\mathbf{g}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} \mathbf{r} \cdot \partial_{\nu} \mathbf{r}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{\mathrm{d}^2 p^{\lambda}}{\mathrm{d} \tau^2} = 0$$





Offen im Denken

Fläche

$$\vec{r}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$


Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_{\mu}\vec{r} \cdot \partial_{\nu}\vec{r}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{\mathrm{d}^2 p^{\lambda}}{\mathrm{d} \tau^2} = -\Gamma^{\lambda}_{\mu \nu} [\boldsymbol{g}(\vec{r})] \frac{\mathrm{d} p^{\mu}}{\mathrm{d} \tau} \frac{\mathrm{d} p^{\nu}}{\mathrm{d} \tau}$$





Offen im Denken

Fläche

$$\vec{r}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$


Metrik

$$\mathbf{g}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} \mathbf{r} \cdot \partial_{\nu} \mathbf{r}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{\mathrm{d}^2 p^{\lambda}}{\mathrm{d} \tau^2} = -\Gamma^{\lambda}_{\mu \nu} [\boldsymbol{g}(\vec{r})] \frac{\mathrm{d} p^{\mu}}{\mathrm{d} \tau} \frac{\mathrm{d} p^{\nu}}{\mathrm{d} \tau}$$



DUISBURG ESSEN

UNIVERSITÄT

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$



Offen im Denken

DUISBURG ESSEN

UNIVERSITÄT

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten
$$(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

Feldgleichungen:
$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

Feldgleichungen: $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [g]$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

Feldgleichungen: $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [g]$

Krümmungsskalar: R[g]

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

2D Fläche \rightarrow 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

Feldgleichungen: $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu} [g]$

Krümmungsskalar: R[g]

Energie-Impuls-Tensor: $T_{\mu\nu}$

EM-Felder


$$\vec{B} = \frac{1}{r^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} \vec{r} \right]$$

$$ec{E}=-rac{Mar{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{r^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} \vec{r} \right]$$

$$ec{E}=-rac{M ilde{r}}{r^3}$$






$$\vec{B} = \frac{1}{r^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} \vec{r} \right]$$

$$ec{E}=-rac{M ilde{r}}{r^3}$$






EM-Felder

$$\vec{B} = rac{1}{r^3} \left[\vec{S} - rac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} \vec{r} \right]$$

$$\vec{E} = -rac{M\vec{r}}{r^3}$$



EM-Felder

$$\vec{B} = \frac{1}{r^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} \vec{r} \right]$$

$$\vec{E} = -\frac{M\vec{r}}{r^3}$$

