

MÓDULO 1.3: RESPONSABILIDADES Y ÉTICA DEL AUXILIAR DE FARMACIA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Lección 1: Marco Regulatorio y Requisitos de Idoneidad Profesional

Lección 2: Funciones Operativas y Dispensación Informada

Lección 3: Limitaciones Ético-Legales y Relación de Dependencia

LECCIÓN 1: MARCO REGULATORIO Y REQUISITOS DE IDONEIDAD PROFESIONAL

1.1 Introducción

El rol del Auxiliar de Farmacia en Chile está definido por el Estado como un colaborador directo en las acciones de protección, fomento y recuperación de la salud. La ética de este cargo reside en la comprensión de que su labor diaria impacta directamente en la seguridad del paciente y en la salud pública nacional.

1.2 Desarrollo Técnico: Requisitos Legales de Autorización

Para obtener el calificativo de "Auxiliar de Farmacia" y la resolución que permite el ejercicio de la profesión, el interesado debe cumplir con el Artículo 28 del Decreto Supremo 466 (modificado por el Decreto 38):

- **Nivel Educativo:** Haber aprobado satisfactoriamente el 4º año de enseñanza media.
- **Experiencia Práctica:** Acreditar un desempeño efectivo de al menos un año en labores de bodegaje, reposición y manejo de productos farmacéuticos. Esta experiencia debe ser certificada por el Director Técnico (Químico Farmacéutico) del establecimiento.
- **Examen de Competencia:** Rendir y aprobar satisfactoriamente una evaluación ante la SEREMI de Salud sobre regulación sanitaria, almacenamiento, acción terapéutica y contraindicaciones de productos de venta directa.

Desarrollo de Concepto: Biodisponibilidad

Importancia Biológica: Es la fracción del principio activo que llega a la circulación sistémica y la velocidad con que este proceso ocurre. Un auxiliar ético debe entender que si no se respetan las condiciones de almacenamiento o administración (ej: ayunas vs. con comida), la biodisponibilidad cambia, pudiendo causar que el tratamiento falle por falta de absorción o cause toxicidad por exceso.

Fabricación y Liberación: Durante la fabricación se diseñan sistemas de liberación (comprimidos, cápsulas) que aseguran que el fármaco se libere en el lugar adecuado (estómago o intestino).

Ejemplos Milab:

- **Azitromicina 500 mg:** Su biodisponibilidad se reduce drásticamente si se toma con alimentos; el auxiliar debe educar al paciente para tomarla en ayunas.
- **Ciprofloxacino 500 mg:** Los lácteos forman complejos que impiden su absorción; el auxiliar debe advertir sobre esta interacción.
- **Atorvastatina 20 mg:** Requiere una liberación constante para inhibir la síntesis de colesterol durante la noche.

EN EL MESÓN

Un cliente que conoce hace años le pide que "le haga la gauchada" de venderle un psicotrópico porque perdió la receta. Basándose en la ética profesional y el Art. 28 del DTO 466, el auxiliar debe comprender que su autorización sanitaria es personal y depende de actuar bajo supervisión. Acceder a esta petición no solo es ilegal, sino que constituye una falta grave que puede llevar a la cancelación definitiva de su carnet de auxiliar por parte de la SEREMI.

LECCIÓN 2: FUNCIONES OPERATIVAS Y DISPENSACIÓN INFORMADA

2.1 Introducción

La labor del auxiliar se divide en dos grandes ejes: la gestión logística interna y la atención directa al público. En ambas, la rigurosidad técnica es el estándar mínimo exigido por la Norma Técnica 147 y el Decreto 90.

2.2 Desarrollo Técnico: Actividades de Despacho y Abastecimiento

Según el Artículo 5º del Decreto 90, el auxiliar está habilitado para:

- **Recepción de Recetas:** Verificar que estén extendidas según la normativa vigente (DCI, dosis, firma, fecha).
- **Despacho de Productos:** Entregar el medicamento conforme a la prescripción, elaborando la etiqueta con las indicaciones del médico para evitar errores de medicación.
- **Manejo de Stock:** Registrar diariamente el movimiento de fármacos y controlar las fechas de expiración.
- **Educación Sanitaria:** Informar sobre el uso racional de medicamentos, especialmente en productos de venta directa.

Desarrollo de Concepto: Reacción Adversa a Medicamento (RAM)

Importancia Biológica: Es cualquier efecto nocivo y no intencionado que se produce a dosis normales. El auxiliar debe ser capaz de preguntar al paciente si ha sentido molestias nuevas tras iniciar un tratamiento para derivarlo oportunamente al DT.

Detección: Se basa en la farmacovigilancia, ciencia que monitorea la seguridad de los fármacos post-comercialización.

Ejemplos Milab:

- **Carvedilol 12,5 mg:** Puede causar bradicardia o mareos al inicio del tratamiento.
- **Baclofeno 10 mg:** Provoca somnolencia intensa; el auxiliar debe advertir sobre el riesgo al conducir.
- **Losartán 50 mg:** Puede causar mareos por baja de presión súbita.

EN EL MESÓN

Al dispensar un antibiótico, el auxiliar nota que la paciente se lleva también un antiácido. El auxiliar debe intervenir éticamente informando que el antiácido puede anular el efecto del antibiótico si se toman juntos, recomendando un intervalo de al menos 2 horas. Este es el corazón de la dispensación informada.

LECCIÓN 3: LIMITACIONES ÉTICO-LEGALES Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

3.1 Introducción

El auxiliar debe tener plena conciencia de su ámbito de competencia. El sistema farmacéutico chileno se basa en la responsabilidad compartida, pero la Dirección Técnica es indelegable.

3.2 Desarrollo Técnico: Prohibiciones Críticas

El marco legal impone restricciones severas para proteger al paciente:

- **Prohibición de Diagnóstico:** El auxiliar no puede diagnosticar ni recetar; su función es asistir en la dispensación de lo ya prescrito.
- **Dependencia Estricta:** No puede desempeñar funciones propias del farmacéutico en su ausencia. Esto incluye el despacho personal de estupefacientes y psicotrópicos, cuya custodia y expendio es responsabilidad exclusiva del DT.
- **Infracciones:** Despachar un medicamento diferente al indicado en la receta es causal de sanción tanto para el dueño como para el auxiliar y el DT (Art. 39 A DTO 466).

3.3 Glosario Técnico

DCI Denominación Común Internacional; nombre oficial del principio activo.	Petitorio Mínimo Lista de medicamentos que la farmacia debe tener obligatoriamente en stock.
Receta Retenida (RR) Prescripción que debe quedar archivada en el establecimiento.	Uso Racional (URM) Proceso donde el paciente recibe el fármaco adecuado a su necesidad clínica.
Farmacovigilancia Actividad de detección y prevención de efectos adversos.	Principio Activo Sustancia dotada de efecto farmacológico específico.
Forma Farmacéutica Disposición física del medicamento (ej: comprimido, jarabe).	Bioequivalencia Certificación que asegura que un genérico es intercambiable con el original.
Fecha de Expiración Límite tras el cual no se garantiza la estabilidad del fármaco.	Excipiente Materia prima sin actividad terapéutica usada para fabricar el fármaco.