

4 Suites

4.1 Suites, généralités, pas de limites.

Exercice 60

Soit, pour $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2}.$$

1. Ecrire pour u_1, u_2, u_3 les sommes.
2. Montrer que la suite (u_n) est majorée.
3. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq \frac{1}{n}$. ♦

Exercice 61

Exercice 62

Soit a, b, c des réels > 0 en progression arithmétique. Montrer que $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}, \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}}, \frac{1}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}$ sont en progression arithmétique. ♦

Exercice 63

On suppose que les a_1, a_2, \dots, a_n , strictement positifs, sont en progression arithmétique. Montrer que :

$$\frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_n}} = \frac{n-1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}}.$$

Exercice 64

Les réels a_1, a_2, \dots, a_n sont tous non nuls.

1. Si ils sont en progression arithmétique, montrer que :

$$\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_{n-1} a_n} = \frac{n-1}{a_1 a_n} \quad (*)$$

2. Si, pour tout $n \geq 3$, ils vérifient la relation $(*)$, montrer qu'ils sont en progression arithmétique. ♦

Exercice 65

1. Soit un réel q . On considère la suite (u_n) définie par la donnée de u_0 et par, pour tout $n \geq 0$, la relation $u_{n+1} = q u_n$. Montrer, par récurrence, que, pour tout $n \geq 0$, $u_n = q^n u_0$.
2. On considère une suite (a_n) . On considère qu'on a, pour tout $n \geq 0$, $|a_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{2} |a_n - 3|$. Montrer que, pour tout $n \geq 0$, $|a_n - 3| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a_0 - 3|$. ♦

Exercice 66

Soit f définie par $f(x) = \sqrt{6+x}$.

1. On considère u définie par $u_0 \geq -6$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que u est bien définie.
2. On considère u définie par $u_0 \in [-6; 3]$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que u est croissante et majorée.
3. On considère u définie par $u_0 \geq 3$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que u est décroissante et minorée. ♦

Exercice 67

Soit f définie par $f(x) = \sqrt{6-x}$. On considère u définie par $u_0 \in [-30; 6]$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que u est bien définie.
2. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
3. En déduire que, pour $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2|$.

Exercice 68

1. Etablir une formule explicite pour la suite u telle que $u_0 = 4$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2$.
2. Soit a, b des réels. Etablir une formule explicite pour (u_n) définie par, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$. ♦

Exercice 69

Soit f une fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , strictement croissante. Soit une suite (u_n) . On suppose que la suite $(f(u_n))$ est croissante. Etablir les variations de la suite (u_n) . ♦

Exercice 70

1. Etablir une formule explicite donnant la somme de termes consécutifs de réels en progression arithmétique.
2. Même question pour des réels en progression géométrique. ♦

Exercice 71

On ordonne les rationnels strictement positifs selon la suite de nombres :

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Montrer que $\frac{p}{q}$ est le $\left[\frac{1}{2}(p+q-2)(p+q-1)+q\right]$ -ème nombre dans cette suite. ♦

4.2 Suites convergentes.**Exercice 72**

Soit la suite (u_n) , et le réel l .

1. Montrer que

$$|u_n - l| \leq \varepsilon \Leftrightarrow l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon \Leftrightarrow u_n \in [l - \varepsilon; l + \varepsilon].$$

2. Montrer que

$$(u_n) \rightarrow l \Leftrightarrow (u_n - l) \rightarrow 0 \Leftrightarrow (|u_n - l|) \rightarrow 0.$$

Exercice 73

En utilisant la définition d'une suite convergente :

1. Montrer que la suite $(u_n = 3)$ converge.
2. Montrer que la suite $\left(\frac{1}{n}\right)$ converge vers 0.
3. Si $(x_n) \rightarrow x$ et $a \in \mathbb{R}$, montrer que $(ax_n) \rightarrow ax$.
4. Si $(x_n) \rightarrow x$, montrer que $(x_{2n}) \rightarrow x$.
5. Si $(x_n) \rightarrow x$, montrer que $(x_{n+1}) \rightarrow x$.

Exercice 74

1. Ecrire en langage formalisé la négation de $(u_n) \rightarrow l$.
2. Montrer que la suite $((-1)^n)$ ne converge pas.

Exercice 75

1. Soit x, y, z des réels. Montrer que

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

En déduire que :

- (a) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
 (b) $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$. Interpréter géométriquement cette inégalité. ♦
 2. Si $(x_n) \rightarrow x$ et $(y_n) \rightarrow y$, montrer que $(x_n + y_n) \rightarrow x + y$.
 3. Montrer que la somme d'une suite convergente et d'une suite divergente est une suite divergente. Que dire de la somme de deux suites divergentes ?
 4. Si $(x_n) \rightarrow x$, montrer que $(|x_n|) \rightarrow |x|$. Que dire de la réciproque ?

Exercice 76

1. Montrer que si une suite est convergente, alors elle est bornée. Que dire de la réciproque ?

2. On considère la suite $\left(H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)$.

- (a) Montrer que, pour $n \geq 1$,

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

- (b) En déduire que la suite (H_n) ne converge pas. ♦

Exercice 77

1. Énoncé et preuve du théorème des gendarmes.

2. En utilisant le théorème des gendarmes, montrer que la suite $\left(\frac{1}{n^2}\right)$ converge.

3. (a) Montrer que, pour $n \geq 1$, $2^n \geq n$.

- (b) Montrer que la suite $\left(\frac{1}{2^n}\right)$ converge.

4. Montrer que le produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle est une suite de limite nulle.

5. Si $(x_n) \rightarrow x$ et $(y_n) \rightarrow y$, montrer que $(x_n y_n) \rightarrow xy$.

6. (a) Si $(x_n) \rightarrow x$ et si $x \neq 0$, montrer que la suite $\left(\frac{1}{x_n}\right)$ est bien définie, au moins à partir d'un certain rang.

- (b) On suppose que $(x_n) \rightarrow x$ et que $(y_n) \rightarrow y$, avec $y \neq 0$. Montrer que $\left(\frac{x_n}{y_n}\right) \rightarrow \frac{x}{y}$. ♦

Exercice 78

1. Soit a un réel positif, montrer que si, pour tout $\epsilon > 0$, $a \leq \epsilon$, alors $a = 0$.

2. On suppose que $(x_n) \rightarrow x$. On suppose de plus que, pour $n \in \mathbb{N}$, $a \leq x_n \leq b$, où $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $a \leq x \leq b$.

3. Si $(x_n) \rightarrow x$ et $(y_n) \rightarrow y$, et si, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_n \geq y_n$, montrer que $x \geq y$.

4. On considère la suite $\left(H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)$.

- (a) Montrer que, pour $n \geq 1$,

$$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

- (b) En raisonnant par l'absurde, montrer que la suite (H_n) ne converge pas. ♦

Exercice 79

1. Soit $(x_n) \rightarrow x$ et $(x_n) \rightarrow y$. Montrer que $x = y$.

2. Montrer que la suite de terme général $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ converge.

3. On considère la suite définie par $s_1 = 2$ et, pour tout $n \geq 1$, $s_{n+1} = \frac{1}{2} \left(s_n + \frac{2}{s_n} \right)$.

- Montrer que cette suite est décroissante minorée par $\sqrt{2}$.
- En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite.

◆

Exercice 80 (Bac C Etranger 1992)

Soit (u_n) la suite réelle définie par son premier terme u_0 et par la condition :

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n^2 + u_n.$$

- Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
- Démontrer que si (u_n) converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Démontrer que si $u_0^2 + u_0 > 0$, alors la suite (u_n) diverge.
- Démontrer, par récurrence, que si $u_0^2 + u_0 < 0$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 < u_n < 0$.
- Conclure sur la convergence de la suite (u_n) .

◆

Exercice 81

Déterminer la nature et la limite éventuelle des suites de terme général :

- $\frac{1}{n + n^3}$.
- $\frac{3n^2 - 5n}{5n^2 + 3n - 5}$.
- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.
- $\frac{n(n+2)}{n+1} - \frac{n^3}{n^2+1}$.
- $\left(\frac{2n-3}{3n+7} \right)^4$.

◆

Exercice 82

Déterminer la nature et la limite éventuelle des suites de terme général :

- $\frac{n!}{(n+3)!}$.
- $\frac{1}{\sqrt{n^2+1} - n}$.
- $\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$.
- $\frac{\cos^2 n}{2^n}$.
- $(-1)^n \sin \left(\frac{1}{n} \right)$.

◆

Exercice 83

Nature et limite éventuelle de la suite de terme général :

- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}$.
- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.
- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.
- $\sum_{k=1}^n \left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k} \right)$.

◆