

RESOLUCIÓ

- 1 a) Enuncieu el criteri del sandvitx aplicat a successions que compleixen:

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \quad \forall n \geq n_0 \in \mathbb{N}.$$

- b) Feu servir aquest criteri per trobar, si és possible, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ on el terme general de $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ és

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

Resolució: (3 punts)

a) *Criteri del sandvitx.* Siguin $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ i $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tres successions de nombres reals tals que:

$$\left. \begin{array}{l} \triangleright \forall n \geq n_0 \quad a_n \leq b_n \leq c_n, \\ \triangleright a_n \text{ convergent i } \ell_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \\ \triangleright c_n \text{ convergent i } \ell_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n, \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} \text{si la successió } b_n \text{ és convergent} \\ \text{el seu límit compleix} \\ \ell_1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \ell_2. \end{array} \right.$$

En particular, si $\ell_1 = \ell_2 = \ell$, resulta que b_n és convergent i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell$.

- b) Dels sumands del terme general de la successió $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ el més petit és $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ i el més gran $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ (es corresponen al denominador més gran i més petit respectivament). Com que el terme general b_n té n sumands, prenem $a_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$ i $c_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ successions que compleixen $a_n \leq b_n \leq c_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Calculem el límit de a_n i c_n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n^2}{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1+1/n}} = 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n^2}{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1+1/n^2}} = 1.$$

El límit de les dues successions és 1, aleshores es compleixen les hipotesis del criteri del sandvitx, i per tant podem concloure que b_n és convergent i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

- 2 Trobeu les equacions de la recta i la paràbola tangents a la funció $F(x) = \int_0^x \sqrt[3]{8 + \sin t} \, dt$, en el punt d'abscissa $x = 0$.

Resolució: (3 punts)

Les equacions s'obtenen del polinomi de Taylor de la funció $f(x)$ en $x = 0$ de grau 1 i 2 respectivament. Ens cal doncs calcular $F(0)$, $F'(0)$ i $F''(0)$ si existeixen.

Per a les dues primeres, fem ús del Teorema Fonamental del Càlcul Integral, sigui $f(t) = \sqrt[3]{8 + \sin t}$ definida i contínua per a tot real t , llavors la funció $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ està ben definida, compleix que $F(0) = 0$, és derivable i $F'(x) = \sqrt[3]{8 + \sin x}$ per a qualsevol x ; en particular $F'(0) = \sqrt[3]{8} = 2$.

Per calcular $F''(0)$ s'observa que la funció definida per $F'(x) = \sqrt[3]{8 + \sin x}$ és una funció derivable per a tot real x , la seva funció derivada és $F''(x) = \frac{1}{3} \cos x (\sqrt[3]{8 + \sin x})^{-2}$, llavors $F''(0) = 1/12$.

Amb tots els càlculs fets, el polinomi de Taylor $F(0) + F'(0)x$ és $2x$, llavors l'equació de la recta tangent és $y = 2x$.

El polinomi de Taylor $F(0) + F'(0)x + \frac{1}{2}F''(0)x^2$ és $2x + \frac{x^2}{24}$, llavors l'equació de la paràbola tangent és $y = 2x + \frac{x^2}{24}$.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3 Sigui la integral següent:

$$I = \int_{0.6}^{1.0} (\sin(x) \cos(x))^{4/3} dx.$$

- a) Sabent que $0 < f^{(4)}(x) < 20$, $\forall x \in [0.6, 1.0]$, calculeu el nombre de subinterval·s necessaris per obtenir el valor de la integral amb una precisió de com a mínim quatre decimals correctes ($0.5 \cdot 10^{-4}$).
- b) Doneu el valor aproximat de la integral I amb el grau d'exactitud demanat a l'apartat a).
- c) Calculeu una cota superior de l'error comès en el càlcul de l'apartat b).

Resolució: (4 punts)

a) La fórmula de l'error del mètode de Simpson és:

$$\int_a^b f(x) dx - S(h) = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(c), \text{ amb } c \in (a, b).$$

En el nostre cas, $a = 0.6$, $b = 1.0$, $0 < f^{(4)}(x) < 20$ i una precisió de quatre decimals correctes, substituïnt en l'expressió anterior, el nombre de subinterval·s necessaris ha de verificar que

$$\left| -\frac{(0.4)^5}{180n^4} 20 \right| < 0.5 \cdot 10^{-4},$$

equivale a $n > 2.18409$. Aleshores cal pendre $n = 4$ subinterval·s per obtenir el valor de la integral pel mètode de Simpson amb una precisió de com a mínim quatre decimals correctes.

b) Substituïm $a = 0.6$, $b = 1.0$, $n = 4$ i $h = (b-a)/n$ a la fórmula de Simpson, el resultat és

$$\frac{1}{30} [f(0.6) + 4f(0.7) + 2f(0.8) + 4f(0.9) + f(1.0)]$$

que per $f(x) = (\sin(x) \cos(x))^{4/3}$ s'obté el valor de 0.1531040397. El valor de la integral amb l'exactitud demanada és $I = 0.15310 \pm 0.00005$.

c) Per a $n = 4$ l'expressió de la cota d'error $\left| -\frac{(0.4)^5}{180n^4} 20 \right|$ pren el valor de 0.000004, s'han obtingut en realitat cinc decimals correctes, s'escriu $I = 0.15310 \pm 0.000004$.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

RESOLUCIÓ

1 Sigui $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successió tal que $a_1 = 1$ i $a_n = \sqrt{1 + a_{n-1}}$ si $n \geq 1$.

- a) Demostreu que $0 < a_n < 2$, $\forall n \geq 1$.
- b) Demostreu que $\{a_n\}$ és creixent.
- c) Demostreu que $\{a_n\}$ és convergent i calculeu el seu límit.

Resolució: (4 punts)

a) La demostració és pel principi d'inducció.

▷ Verifiquem que el primer ho compleix; com $a_1 = 1$ i $0 < 1 < 2$ queda provat que $0 < a_1 < 2$.

▷ Suposem que $0 < a_n < 2$ i deduïm que llavors $0 < a_{n+1} < 2$.

En efecte, de $0 < a_n < 2$ sumant 1 s'obté $1 < 1 + a_n < 3$; com que la funció $\sqrt{\square}$ és creixent, podem escriure $1 < \sqrt{1 + a_n} < \sqrt{3}$ i com que $\sqrt{3} < 2$ i $1 > 0$ podem afirmar $0 < a_{n+1} < 2$.

b) Cal provar que $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \geq 1$. La demostració és pel principi d'inducció.

▷ Verifiquem que pel primer la propietat és certa; $a_1 = 1$, $a_2 = \sqrt{2}$ i $1 < \sqrt{2}$, llavors $a_1 < a_2$.

▷ Suposem que $a_{n-1} < a_n$ i deduïm que llavors $a_n < a_{n+1}$.

En efecte, de $a_{n-1} < a_n$ sumant 1 s'obté $1 + a_{n-1} < 1 + a_n$; com que la funció $\sqrt{\square}$ és creixent, podem escriure $\sqrt{1 + a_{n-1}} < \sqrt{1 + a_n}$ per tant podem afirmar $a_n < a_{n+1}$.

c) La successió $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ és convergent ja que es verifiquen les hipotesis del teorema de la convergència monòtona.

El límit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ ha de complir $\ell = \sqrt{1 + \ell}$, elevant al quadrat és $\ell^2 = 1 + \ell$. Aquesta equació de segon grau té dues solucions, $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Dels dos valors obtinguts, ens quedem amb $\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, ja que l'altre és 0.61804 però la nostra successió és creixent i $a_1 = 1$.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2 Sigui $f(x) = \sqrt{1+x}$.

- a) Obteniu el desenvolupament de Taylor de grau dos de la funció $f(x)$ en $x = 0$.
- b) Fent ús del polinomi de l'apartat a) calculeu un valor aproximat de $\sqrt{1.02}$.
- c) Doneu una fita superior de l'error comès en el càlcul de l'apartat b).

Resolució: (3 punts)

a) El polinomi de Taylor de grau 2 en $x = 0$ per a la funció $f(x)$ és

$$f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2.$$

Ens cal doncs calcular $f(0)$, $f'(0)$ i $f''(0)$ si existeixen.

Sigui $f(x) = \sqrt{1+x}$ definida, contínua tal que $f(0) = 1$.

La funció $f(x)$ és derivable i la funció derivada és $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ que en $x = 0$ dóna $f'(0) = 1/2$.

La funció $f'(x)$ és derivable, la funció derivada és $f''(x) = \frac{-1}{4\sqrt{(1+x)^3}}$ que substituïnt dóna $f''(0) = -1/4$.

Amb tots els càlculs fets, el polinomi de Taylor és $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$.

b) Cal substituïx $x = 0.02$ en el polinomi de Taylor obtingut, el resultat és 1.009950000.

c) L'expressió del residu és $f(0.02) - P_n(0.02) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.02)^3$, amb $c \in (0, 0.02)$. Per tal de donar una fita superior de l'error comès calcularem i acotarem $f'''(c)$ per a $c \in (0, 0.02)$.

La funció $f''(x)$ és derivable, la seva funció derivada és $f'''(x) = \frac{3}{8\sqrt{(1+x)^5}}$ que té el valor màxim a l'interval en $(0, 0.02)$ en 0; dit altrament, $|f'''(c)| \leq f'''(0) = 3/8$, $\forall c \in (0, 0.02)$.

Així, $0.5 \cdot 10^{-3}$ és una fita superior de l'error comès, ja que

$$\left| \frac{f'''(c)}{3!}(0.02)^3 \right| \leq \frac{3}{8 \cdot 3!}(0.02)^3 = 0.0005.$$

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

- 3 a) Enuncieu el Teorema Fonamental del Càlcul Integral.
 b) Feu servir aquest teorema per calcular, si és possible, el límit següent

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3}.$$

Resolució: (3 punts)

a) *Teorema Fonamental del Càlcul Integral.* Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en $[a, b]$, llavors la funció $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida per

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

és una funció **derivable**, la funció derivada és $F'(x) = f(x)$ per a tot x de $[a, b]$.

En particular, si $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ fent ús de la regla de la cadena i el teorema fonamental és té $F'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$ per a tot x de $[a, b]$.

b) En un primer pas, s'obté indeterminació: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3} = \frac{0}{0}$. Les funcions del numerador ($\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$) i el denominador (x^3) són contínues i derivables en un tot domini de reals positius; llavors satisfan les hipòtesis de la Regla de L'Hôpital.

Sigui $F(x) = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$, la funció $\sin \sqrt{t}$ és contínua per a tot real $t > 0$, llavors pel teorema del fonamental del càlcul, la funció $F(x)$ és derivable i la seva derivada és $F'(x) = 2x \sin \sqrt{x^2} = 2x \sin x$ per a $x > 0$. La funció $G(x) = x^3$ és derivable i $G'(x) = 3x^2$. Finalment, del fet que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x}{3x} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = \frac{2}{3}$$

es dedueix que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3} = \frac{2}{3}.$$

◇ ◇ ◇ ◇ ◇