

Calendário Nacional de Vacinação - 2020

IDADE		VACINA	PASSADO VACINAL	CONDUTA
Menores de 10 anos de idade	Ao nascimento	BCG ¹ + Hepatite B ²	-	-
	2 meses	VIP + Rotavírus + Pentavalente ³ + Pneumo 10	-	-
	3 meses	Meningocócica C	-	-
	4 meses	VIP + Rotavírus + Pentavalente ³ + Pneumo 10	-	-
	5 meses	Meningocócica C	-	-
	6 meses	VIP + Pentavalente ³	-	-
	9 meses	Febre Amarela	-	-
	12 meses	Triviral (SRC) + Pneumo 10 + Meningocócica C	-	-
	15 meses	Tetraviral (SRCV) ⁵ + VOP ⁶ + DTP + Hepatite A	-	-
	4 anos	DTP + VOP + Febre Amarela ⁸ + Varicela ⁹	-	-
	< 6 anos	Influenza na sazonalidade	-	-
Vacinação entre 10 e 29 anos de idade	9 anos	HPV (meninas)	-	Duas doses
		Hepatite B	Não vacinado	3 doses
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			3 doses	Considerar vacinado
		Dupla Adulto (dT)	3 ou + de Penta, Tetra, DTP, DTPa ou dT	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			Não vacinado ou ignorado	3 doses
		Triplíce Viral ¹⁰	Não vacinado	2 doses
			1 dose	1 dose
			2 doses	Considerar vacinado
		Febre Amarela	Não vacinado	1 dose
			1 dose ou mais	Considerar vacinado
	9 - 14 anos	Vacina HPV Quadrivalente	Meninas	2 doses
	11 - 14 anos		Meninos	2 doses
	11 - 12 anos	Meningocócica ACWY	-	1 dose
Vacinação entre 30 e 59 anos de idade		Hepatite B	Não vacinado	3 doses
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			3 doses	Considerar vacinado
		Dupla Adulto (dT)	3 ou + de toxóide tetânico	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			Não vacinado ou ignorado	3 doses
		Triplíce Viral	Não vacinado	1 dose (até 59 anos de idade)
			1 dose	Considerar vacinado
		Febre Amarela	Não vacinado	1 dose
			1 dose ou mais	Considerar vacinado
Vacinação a partir dos 60 anos de idade		Hepatite B	Não vacinado	3 doses
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			3 doses	Considerar vacinado
		Dupla Adulto (dT)	3 doses ou mais de toxóide tetânico	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		Febre Amarela ¹¹	Não vacinado	1 dose
Vacinação dos Profissionais de Saúde		Hepatite B	1 dose ou mais	Considerar vacinado
			Pneumo 23	Vacinar acamados e residentes em ambientes coletivos
			Influenza	Vacinar na sazonalidade
		Dupla Adulto (dT)	Não vacinado	3 doses
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses
			3 doses	Considerar vacinado
		Triplíce Viral	Não vacinado ou ignorado	3 doses (sendo uma das doses com dTpa)
			Menos de 3 doses	Completar 3 doses (sendo uma dose com a dTpa)
			3 ou + de toxóide tetânico	Reforço com dTpa, se última dose há mais de 10 anos
		Febre Amarela	Não vacinado	2 doses
			Menos de 2 doses	Completar 2 doses
		Varicela ¹²	2 doses	Considerar vacinado
			Não vacinado	1 dose
		Influenza	1 dose ou mais	Considerar vacinado
			1 dose ou mais	Considerar vacinado a depender do laboratório
		Influenza	-	Vacinar na sazonalidade
			-	Vacinar na sazonalidade

1. BCG: Crianças vacinadas e sem cicatriz não necessitam ser revacinadas e não administrar após cinco anos completos, exceto contatos de hanseníase.
2. Hepatite B: A dose isolada da Hepatite B é desnecessária após um mês de idade, sendo suficientes as três doses da vacina Pentavalente.
3. Rotavírus: Primeira dose (D1) pode ser administrada a partir de 1 (um) mês e 15 dias até 3 (três) meses e 15 dias e a segunda dose (D2) a partir de 3 (três) meses e 15 dias até 7 (sete) meses e 29 dias.
4. Pentavalente: DTP + Haemophilus b + Hepatite B e pode ser administrada até 6 anos 11 meses e 29 dias.
5. Reforço Pneumo 10 e Meningo C e Dose única de Hepatite A podem ser administradas até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
6. Tetraviral: Aplicar somente se a criança já recebeu a primeira dose (D1) de Triplíce viral.
7. VOP (Vacina Oral Poliomelite): Só deve ser administrada após três doses de VIP (Vacina Inativada Poliomielite).
8. Febre Amarela: ≥ 5 anos com DOSE 1 antes dos 5 anos (todo indivíduo que comprovar 1 dose antes dos 5 anos de idade, aplicar e registrar uma dose de REFORÇO, independente da idade atual)
9. Varicela (2ª dose): Pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.
10. Triplíce Viral: Considerar vacinada a pessoa que comprovar dose de vacina contendo os componentes sarampo e rubéola (dupla viral, tríplíce viral ou tetra viral).
11. Febre Amarela: Só deverá ser administrada após avaliação das contraindicações pelos profissionais de saúde.
12. Varicela: Profissionais de Saúde que trabalham na área assistencial, especialmente em contato com pessoas imunodeprimidas e os da área de pediatria.

OBS: Casos especiais: encaminhar ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais.

PRINCIPAIS CONTRAINDICAÇÕES ÀS VACINAS	
VACINA	CONTRAINDICAÇÕES
BCG	- Lesões dermatológicas generalizadas - Imunodeficiências - Peso inferior a 2 Kg
Hepatite B	Evento adverso grave à dose anterior
ACWY	Evento adverso grave à dose anterior
Polio Oral	Imunodeficiências e contato íntimo com imunodeficientes
DTP	- Cardiopatia congênita - Evento adverso grave à dose anterior - Doença neurológica não controlada - Maiores que 7 anos
Haemophilus B	Evento adverso grave à dose anterior
Rotavírus	- Imunodeficiências - Doenças congênitas gastrointestinais - Histórico de invaginação intestinal - Limites de idade
Pneumo 10	Evento adverso grave à dose anterior
Febre Amarela	- Imunodeficiências - Doenças do timo - Doenças autoimunes - Alergia grave a ovo - Gravidez
Triviral	- Imunodeficiências - Gravidez - Púrpura associada à dose anterior
Influenza	- Alergia grave a ovo - Idade inferior a seis meses
Hepatite A	Evento adverso grave à dose anterior
HPV	- Evento adverso grave à dose anterior - Gravidez
Varicela	- Imunodeficiências - Uso crônico de ácido acetilsalicílico - Gravidez
Tetraviral	- Maior de 12 anos - Vide Triviral e Varicela

Assessoria: Dr. José Geraldo Leite Ribeiro

VACINA INFLUENZA

Feita uma dose anualmente nas idades e situações recomendadas pelo PNI. Geralmente:

- Gestantes: qualquer idade gestacional, puérperas (até 45 dias pós-parto);
- Menores de 6 anos de idade, a partir dos 6 meses;
- Maiores de 60 anos de idade;
- Grupos especiais.

VACINAÇÃO DE GESTANTES

- Vacina Influenza: uma dose em toda gestação, qualquer idade gestacional.
- Vacina dTpa: uma dose em toda gestação, a partir de 20 semanas.
- Vacina Hepatite B: qualquer idade gestacional. 3 doses no passado: vacinada; Menos de 3 doses: completar 3.



SAÚDE



MINAS GERAIS

GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.