Hoja de Referencia Series Temporales

Por Marcelo Moreno Porras - Universidad Rey Juan Carlos
The Econometrics Cheat Sheet Project

Conceptos básicos

Definiciones

Serie temporal: Sucesión de observaciones ordenadas en el tiempo con una frecuencia fija.
Dado el formato de una serie temporal:

- **Punto en el tiempo (stock)**: Se registra un único valor para cada período.
- **Agregado (flujo)**: Los valores representan totales o promedios a lo largo del período.
- **Rango/intervalo (OHLC)**: Cada período registra múltiples estadísticas, como *min, max, open, close*.

Proceso estocástico: Es una secuencia de variables aleatorias que están indexadas en el tiempo.

Componentes de una serie temporal

- **Tendencia**: Movimiento general a l/p de una serie.
- **Variaciones estacionales**: Oscilaciones periódicas producidas en un período igual o inferior al año, y pueden ser fácilmente identificadas en diferentes años (usualmente resultado de la climatología).
- **Ciclo**: Oscilaciones periódicas producidas en un periodo mayor al año (son resultado del ciclo económico).
- **Variaciones residuales**: Movimientos que no siguen una oscilación periódica identificable (eventos irreg.)

Tipos de modelos de series temporales

- **Modelos estáticos**: La relación entre y y x es contemporánea. Conceptualmente:
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$
- **Modelos de rezagos distribuidos**: La relación entre y y x no es contemporánea. Conceptualmente:
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 x_{t-1} + \cdots + \beta_{s+1} x_{t-s} + u_t$$
El efecto acumulado a largo plazo en y cuando $\Delta x = 1$:
$$\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_{s+1}$$
- **Modelos dinámicos**: Introduce rezagos de la variable dependiente. Conceptualmente:
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_s y_{t-s} + u_t$$
- Combinación de lo anterior, como modelos de rezagos distribuidos racionales (rezagos distribuidos + dinámicos).

Supuestos y propiedades

Supuestos MCO en series temporales

Supuestos Gauss-Markov extendidos para series temporales:

t1. **Linealidad de parámetros y dependencia débil**:
   a. y_t debe ser una función lineal de los β's.
   b. El proceso estocástico $\{(x_t, y_t) : t = 1, 2, \ldots, T\}$ es estacionario y débilmente dependiente.

t2. **No colinealidad perfecta**:
   - No hay variables independientes que sean constantes: $\text{Var}(x_{jt}) \neq 0 \quad \forall j = 1, \ldots, k$
   - No hay una relación lineal exacta entre variables independientes.

t3. **Media condicional cero y correlación cero**:
   a. No hay variables relevantes fuera del modelo: $\text{Cov}(x_{jt}, u_t) = 0 \quad \forall j = 1, \ldots, k \rightarrow$ **exogeneidad**
   b. No hay errores sistemáticos: $\text{E}(u_t \mid \text{X}) = \text{E}(u_t \mid \ldots, \text{x}_{t+1}, \text{x}_t, \text{x}_{t-1}, \ldots) = 0 \quad \forall t$ $\rightarrow$ **exogeneidad estricta** (cumple 3a)

t4. **Homocedasticidad**: La variabilidad del término de error es igual para todos los niveles x:
$$\text{Var}(u_t \mid x_{1t}, \ldots, x_{kt}) = \sigma^2 \quad \forall t = 1, \ldots, T$$

t5. **No autocorrelación**: Los errores no contienen información sobre otros errores:
$$\text{Corr}(u_t, u_s \mid x_1, \ldots, x_k) = 0 \quad \forall t \neq s$$

t6. **Normalidad**: Los errores son independientes e idénticamente distribuidos: $u_t \overset{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

t7. **Tamaño de datos**: El número de observaciones disponibles debe ser mayor a $(k + 1)$ parámetros a estimar.

Propiedades asintóticas de MCO

Bajo los supuestos Gauss-Markov y el Teorema Central del Límite (TCL):

- De t1 a t3a: MCO es **consistente**: $\text{plim}(\hat{\beta}_j) = \beta_j$
- De t1 a t3b: MCO es **insesgado**: $\text{E}(\hat{\beta}_j) = \beta_j$
- De t1 a t5: **normalidad asintótica** de estimadores: $\hat{\beta}_j \underset{a}{\sim} \mathcal{N}(\beta_j, \text{Var}(\hat{\beta}_j))$
- De t1 a t5: **estimador insesgado** de σ^2: $\text{E}(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$
- De t1 a t5: MCO es MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado, BLUE en inglés) or **eficiente**.
- De t1 a t6: contrastes de hipótesis e intervalos de confianza son fiables.

Regresión espuria: Ocurre cuando se encuentra una relación estadísticamente significativa—pero falsa—entre series indep. no estacionarias (p.e., debido a tendencias compartidas), a pesar de que no existe un vínculo causal real. Esto **incumple el primer supuesto (t1b)** de MCO.


Tendencia y estacionalidad

Tendencia

Dos series temporales pueden tener la misma (o contraria) tendencia, lo que lleva a altos niveles de correlación. Esto provoca una falsa apariencia de causalidad; el problema es **correlación espuria**. Dado el modelo:
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$
donde:
$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Tendencia} + v_t$$
$$x_t = \gamma_0 + \gamma_1 \text{Tendencia} + w_t$$
Añadir una tendencia al modelo puede resolver el problema:
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 \text{Tendencia} + u_t$$
Una tendencia puede ser lineal o no lineal (cuadrática, cúbica, exponencial, etc.)
Otra manera, es hacer uso del **filtro Hodrick-Prescott** y extraer la tendencia y el componente cíclico.

Estacionalidad

Una serie temporal puede manifestar estacionalidad. Esto es, que está sujeta a variaciones estacionales o patrones climáticos.



Por ejemplo, el PIB es mayor en verano y menor en invierno (serie ajustada estacionalmente en discontinuo).

- La regresión de series temporales que presentan estacionalidad puede conducir a **resultados espurios**.

Existen diferentes métodos de **ajuste estacional**:

a. Incluir variables estacionales binarias en el modelo. Por ejemplo, serie trimestral (Sq_t son variables binarias):
$y_t = \beta_0 + \beta_1 S2_t + \beta_2 S3_t + \beta_3 S4_t + \beta_4 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + u_t$
b. Ajustar estacionalmente las variables y luego realizar la regresión con las variables ajustadas.
c. Tomar diferencias estacionales (s es el período estacional):
$$\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$$
d. Aplicar el ajuste **X-13ARIMA-SEATS**.

Autocorrelación

Los términos de error u_t y u_s están correlacionados a lo largo de distintos periodos temporales, condicionalmente a las variables explicativas. Se **incumple el quinto (t5) supuesto** OLS.


$$\text{Corr}(u_t, u_s \mid x_1, \ldots, x_k) \neq 0 \quad \exists t \neq s$$

Consecuencias

- Estimadores MCO son consistentes.
- Estimadores MCO son insesgados.
- MCO ya **no es eficiente**, pero sigue siendo ELI (Estimador Lineal Insesgado).
- La **estimación de la varianza** de los estimadores es **sesgada**: la construcción de intervalos de confianza y contraste de hipótesis no son fiables.


Detección

Gráficos de dispersión: Buscar patrones en u_{t-1} vs. u_t.



Correlograma: Función de autocorrelación (FAC) y el FAC parcial (FACP).

- Eje Y: correlación.
- Eje X: núm. de retardo.
- Área gris: $\pm 1.96/T^{0.5}$



- **Proceso MA**(q). FAC: los q primeros coeficientes son significativos, el resto se anulan bruscamente. FACP: decrecimiento exponencial rápido u ondas sinusoidales.
- **Proceso AR**(p). FAC: decrecimiento exponencial rápido u ondas sinusoidales. FACP: los p primeros coeficientes son significativos, el resto se anulan bruscamente.
- **Proceso ARMA**(p, q). FAC y FACP: los coeficientes no se anulan bruscamente y presentan un decrecimiento rápido.

Si los coeficientes de la FAC no decaen rápidamente, hay claro indicio de falta de estacionariedad en media.

Contrastes:

Suponiendo que u_t sigue un proceso AR(1):

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \varepsilon_t$$

donde ε_t es ruido blanco.


- **Prueba t AR(1)**:
  - Regresores exógenos.
  - H_0: No autocorrelación.
  - H_1: Autocorrelación de orden uno, AR(1).

$$\text{Bajo } H_0: \quad t = \frac{\hat{\rho}_1}{\text{ee}(\hat{\rho}_1)} \sim t_{T-k-1}$$

- **Estadístico Durbin-Watson**:
  - Regresores exógenos y normalidad de residuos.
  - H_0: No autocorrelación.
  - H_1: Autocorrelación de orden uno, AR(1).

$$\text{Bajo } H_0: \quad d = \frac{\sum_{t=2}^{T}(\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{T}\hat{u}_t^2} \approx 2 \cdot (1 - \hat{\rho}_1)$$

donde $0 \leq d \leq 4$.



- **h de Durbin**:
  - Modelos dinámicos.
  - H_0: No autocorrelación.
  - H_1: Autocorrelación de orden uno, AR(1).

$$\text{Bajo } H_0: \quad h = \hat{\rho} \cdot \sqrt{\frac{T}{1 - T \cdot \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{lag}})}} \underset{a}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$$

- **Prueba Breusch-Godfrey**:
  - MA(q): $u_t = \varepsilon_t - m_1\varepsilon_{t-1} - \cdots - m_q\varepsilon_{t-q}$
  - AR(p): $u_t = \rho_1 u_{t-1} + \cdots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t$
  - H_0: No autocorrelación.
  - H_1: Autocorrelación de orden q o p.

$$\text{Bajo } H_0: \quad T \cdot R^2_{\hat{u}_t} \underset{a}{\sim} \chi^2_{q \text{ ó } p}$$

- **Prueba Ljung-Box Q**:
  - H_0: No autocorrelación hasta retardo h.
  - H_1: Al menos una autocorrelación hasta retardo h.

$$\text{Bajo } H_0: \quad Q_{LB} = T(T+2)\sum_{k=1}^{h}\frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \underset{a}{\sim} \chi^2_h$$

Corrección

- Usar MCO con un estimador de la matriz de varianzas-covarianzas **robusto a la heterocedasticidad y autocorrelación** (HAC), por ejemplo, la propuesta de **Newey-West**.
- Usar **Mínimos Cuadrados Generalizados** (MCG). Suponiendo $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$, con $u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$, donde $|\rho| < 1$ y ε_t es ruido blanco.
  - Si ρ es **conocido**, usar **modelo cuasi-diferenciado**:
    $$y_t - \rho y_{t-1} = \beta_0(1-\rho) + \beta_1(x_t - \rho x_{t-1}) + u_t - \rho u_{t-1}$$
    $$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1' x_t^* + \varepsilon_t$$
    donde $\beta_1' = \beta_1$; y estimarlo por MCO.
  - Si ρ es **desconocido**, estimarlo—por ejemplo—el **método iterativo de Cochrane-Orcutt**:
    1. Obtener $\hat{u}_t$ del modelo original.
    2. Estimar $\hat{u}_t = \rho\hat{u}_{t-1} + \varepsilon_t$ y obtener $\hat{\rho}$.
    3. Crear un modelo cuasi-diferenciado:
       $$y_t - \hat{\rho}y_{t-1} = \beta_0(1-\hat{\rho}) + \beta_1(x_t - \hat{\rho}x_{t-1}) + u_t - \hat{\rho}u_{t-1}$$
       $$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1' x_t^* + \varepsilon_t$$
       donde $\beta_1' = \beta_1$; y estimarlo por MCO.
    4. Obtener $\hat{\beta}_0 = \hat{\beta}_0^*/(1-\hat{\rho})$
    5. Computar $\hat{u}_t = y_t - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1' x_t)$.
    6. Repetir desde el paso 2. El algoritmo termina cuando los parámetros estimados varían muy poco entre iteraciones.
- Si no se arregla, buscar **fuerte dependencia** en la serie.

Suavizado exponencial

Dado $\{y_t\}$, la serie suavizada $\{f_t\}$:

$$f_t = \alpha y_t + (1-\alpha) f_{t-1}$$

donde $0 < \alpha < 1$ es el factor de suavizado y $f_0 = y_0$.

Predicciones

Dos tipos de predicciones:

- Valor medio de y para un valor específico de x.
- Valor individual de y para un valor específico de x.

U de Theil - compara los resultados pronosticados con los de la previsión con datos históricos mínimos.

$$U = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T-1}\left(\frac{\hat{y}_{t+1} - y_{t+1}}{y_t}\right)^2}{\sum_{t=1}^{T-1}\left(\frac{y_{t+1} - y_t}{y_t}\right)^2}}$$

- < 1: La predicción es mejor que adivinar.
- $= 1$: La predicción es tan buena como adivinar.
- > 1: La predicción es peor que adivinar.

Estacionariedad

La estacionariedad permite reconocer relaciones—inalteradas en el tiempo—entre variables.

- **Proceso estacionario** (estacionariedad estricta): La distribución de probabilidad conjunta del proceso permanece inalterada al desplazarse h periodos.
- **Proceso no estacionario**: Por ejemplo, una serie con tendencia, donde al menos la media cambia con el tiempo.
- **Proceso estacionario en covarianza**: Es una forma más débil de estacionariedad:
  - $\mathrm{E}(x_t)$ es constante.
  - $\mathrm{Var}(x_t)$ es constante.
  - Para cualquier $t, h \geq 1$, $\mathrm{Cov}(x_t, x_{t+h})$ depende sólo de h, no de t.

Dependencia débil

La dependencia débil reemplaza el supuesto de muestreo aleatorio en series temporales.

- Un proceso estacionario $\{x_t\}$ es **débilmente dependiente** cuando x_t y x_{t+h} son casi independientes a medida que h aumenta sin límite.
- Un proceso estacionario en covarianza es **débilmente dependiente** si la correlación entre x_t y x_{t+h} tiende a 0 lo suficientemente rápido cuando $h \to \infty$ (no están asintóticamente correlacionados).

La mayoría de procesos estacionarios débilmente dependientes son **integrados de orden cero**, I(0). Ejemplos:

- **Media móvil**: $\{x_t\}$ es una media móvil de orden q, MA(q):
  $$x_t = e_t + m_1 e_{t-1} + \cdots + m_q e_{t-q}$$
  donde $\{e_t : t = 0, 1, \ldots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media cero y varianza σ_e^2.
- **Proceso autorregresivo**: $\{x_t\}$ es un proceso autorregresivo de orden p, AR(p):
  $$x_t = \rho_1 x_{t-1} + \cdots + \rho_p x_{t-p} + e_t$$
  donde $\{e_t : t = 1, 2, \ldots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media cero y varianza σ_e^2.
  Condición de estabilidad: Si todas las raíces z de la ecuación característica $1 - \rho_1 z - \cdots - \rho_p z^p = 0$ satisfacen $|z| > 1$, entonces $\{x_t\}$ es estable y débilmente dependiente AR(p). Para AR(1), la condición es: $|\rho_1| < 1$.
- **Proceso ARMA**: Es una combinación de los dos anteriores; $\{x_t\}$ es un ARMA(p, q):
  $x_t = e_t + m_1 e_{t-1} + \cdots + m_q e_{t-q} + \rho_1 x_{t-1} + \cdots + \rho_p x_{t-p}$

Raíces unitarias

Un proceso es integrado de orden d, I(d), si al aplicar diferencias d veces hace al proceso estacionario.
Cuando $d \geq 1$, se dice que el proceso tiene **raíz unitaria**. Un proceso tiene una raíz unitaria cuando no se cumple la condición de estabilidad (hay raíces en el círculo unitario).

Dependencia fuerte

Generalmente, las series económicas son fuertemente persistentes. Algunos ejemplos de **raíz unitaria** I(1):

- **Paseo aleatorio**: Un proceso AR(1) con $\rho_1 = 1$.
  $$y_t = y_{t-1} + e_t$$
  donde $\{e_t : t = 1, 2, \ldots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media cero y varianza σ_e^2.
- **Paseo aleatorio con deriva**: Un proceso AR(1) con $\rho_1 = 1$ y una constante.
  $$y_t = \beta_0 + y_{t-1} + e_t$$
  donde $\{e_t : t = 1, 2, \ldots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media cero y varianza σ_e^2.

Contrastes de raíz unitaria

Contraste	H_0	Rechazar H_0
ADF	I(1)	$\tau <$ Valor crítico
KPSS	I(0) nivel	$\eta_\mu >$ Valor crítico
KPSS	I(0) tendencia	$\eta_\tau >$ Valor crítico
Phillips-Perron	I(1)	Z(τ) < Val. crítico
Zivot-Andrews*	I(1)	$t_{\min} <$ Valor crítico

* Prueba en presencia de quiebres estructurales.

De raíz unitaria a dependencia débil


Integrado de **orden uno**, I(1), significa que **la primera diferencia** del proceso es **débilmente dependiente** ó I(0) (y usualmente, estacionaria). Sea $\{y_t\}$ un paseo aleatorio:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = e_t$$

donde $\{e_t\} = \{\Delta y_t\}$ es *i.i.d.*

Nota:

- La primera diferencia suele eliminar tendencias.
- Los logaritmos suelen estabilizar la varianza.



Cuando una serie I(1) es estrictamente positiva, a menudo se utilizan logaritmos antes de diferenciar para aproximar cambios porcentuales:

$$\Delta \log(y_t) = \log(y_t) - \log(y_{t-1}) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

Ergodicidad

Un proceso estrictamente estacionario $\{y_t\}$ es **ergódico** si los promedios temporales convergen a sus promedios poblacionales (esperanzas). Esto suele garantizarse mediante una **mezcla fuerte** (strong mixing), que implica independencia asintótica de eventos lejanos.

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_t \underset{a}{\to} \mathrm{E}(y_t)$$

Sin ello, los momentos muestrales pueden no reflejar los momentos poblacionales. Los estimadores son inconsistentes.

Cointegración

Dos series I(1) están **cointegradas** si una combinación lineal de ellas es I(0). Una regresión entre ellas no es espuria, sino que refleja una relación de **largo plazo**. Las variables cointegradas comparten una tendencia estocástica común. Por ejemplo, $\{x_t\}$ y $\{y_t\}$ son I(1), pero $y_t - \beta x_t = u_t$ donde $\{u_t\}$ es I(0). (β es el parámetro cointegrador).

Contraste de cointegración

Contraste Engle-Granger:

1. Estimar $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ y obtener $\hat{u}_t$.
2. Realizar el ADF sobre $\hat{u}_t$ con una distribución especial. El resultado del contraste es equivalente a:
   - H_0: $\hat{u}_t \sim$ I(1) → No hay cointegración.
   - H_1: $\hat{u}_t \sim$ I(0) → Existe cointegración.

   si el estadístico de contraste < valor crítico, rechazar H_0.

Heterocedasticidad en series temp.

Afecta al **supuesto t4**, lo que lleva a que **MCO no sea eficiente**.
Usar contrastes como el Breusch-Pagan o White, donde H_0: No heterocedasticidad. Para que los contrastes funcionen, no ha de existir **autocorrelación**.

ARCH

Un modelo de heteroced. condicional autorreg. (ARCH) se usa para analizar heterocedasticidad condicional dinámica, donde los errores al cuadrado siguen un proceso AR(p).
Dado el modelo: $y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + u_t$, con errores no correlacionados serialmente satisfaciendo $\mathrm{E}(u_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$, una varianza del error ARCH(1) se especifica como:

$$\sigma_t^2 = \mathrm{Var}(u_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \mathrm{E}(u_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2$$

donde $\alpha_0 > 0$ y $0 \leq \alpha_1 < 1$ garantizan la positividad y la estacionariedad de la covarianza.