



## 1. New

Let:

$$\cdot |\lambda| < 1 < |\mu|$$

Then, holds:

$$\cdot A^n = \lambda^n, \mu^n$$

$$\cdot \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{,, } y \neq 0 :$$

$$o((x, y)) \xrightarrow{n} (0, \infty)$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{,, } y = 0 :$$

$$o((x, y)) \xrightarrow{n} (0, 0)$$

Demonstration:

$$x_n = \lambda^n x \xrightarrow{n} 0$$

$$y_n = \mu^n y \xrightarrow{n} \begin{cases} 0 & y = 0 \\ \infty & y \neq 0 \end{cases}$$

### Stable & Unstable subspaces

Let:

$$\cdot A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

We name stable subspace of  $A$  to:

We name unstable subspace of  $A$  to:

We denote:

$$\cdot E^s, E^u$$

### abstract

Let:

$$\cdot A = \lambda, 1\lambda, 0$$

Then, holds:

$$\cdot |\lambda| < 1 \rightarrow o(x, y) \xrightarrow{n} (0, 0)$$

$$\cdot |\lambda| > 1 \rightarrow o(x, y) \xrightarrow{n} (\infty, \infty)$$

Demonstration:

$$A^n = \lambda^{n-1}(\lambda, n, 0, \lambda)$$

## Origin stability theorem

Let:

- $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$
- $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$   
 $x \longmapsto Ax$
- $\sigma(A)$  eigenvalues of  $A$

Then, holds:

- $\forall i \in [1, n]_{\mathbb{N}} :$   
 $|\lambda_i| < 1 \rightarrow \text{origin is attractive}$
- $\forall i \in [1, n]_{\mathbb{N}} :$   
 $|\lambda_i| > 1 \rightarrow \text{origin is repulsive}$
- $\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(A) :$   
 $|\lambda_1| > 1 \wedge |\lambda_2| < 1 \rightarrow \mathbb{R}^n = E^s + E^u$

Demonstration:

*demonstration*

## Local stability of fixed points of non-linear applications

Let:

$$\cdot f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\cdot x \in \text{Fix}(f)$$

$$\cdot \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \text{ open} \quad \text{,, } x \in \mathcal{U} \quad f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ differentiable in } x$$

Then, holds:

$$\cdot \rho(Df(p)) < 1 \rightarrow x \text{ attractive}$$

$$\cdot \forall \lambda \in \sigma(A) :$$

$$|\lambda| > 1 \rightarrow x \text{ repulsive}$$

Demonstration:

Suppose  $p = 0$

$$A := Df(0)$$

Consider:

$$\| - \| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ norm} \quad \text{,, } \|A\| < 1$$

$$\exists \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \text{ open} :$$

$$f \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U}) \quad \forall v \in \mathbb{R}^n :$$

$$f(v) = Av + \mu(v) \quad \text{,, } \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\mu(v)}{\|v\|} = 0$$

$$\forall \eta \in \mathbb{R}^+ :$$

$$\exists r \in \mathbb{R}^+ :$$

$$\|v\| < r \rightarrow \|\mu(v)\| \leq \eta \|v\| \quad \eta := a + \eta < 1$$

$\forall n \in \mathbb{N} :$

$\forall v \in \mathbb{D}(0, r) :$

$$f^n(v) \in \mathbb{D}(0, r)$$

$$\|f^n(v)\| \leq (a + \eta)^n \|v\|$$

Induction over  $n$ :

$n = 0$  ok

Suppose true for  $n$

$$\begin{aligned} \|f^{n+1}(v)\| &= \|f(f^n(v))\| \leq \|A f^n(v)\| + \|\mu(f^n(v))\| \\ &\leq a \|f^n(v)\| + \eta \|f^n(v)\| = (a + \eta) \|f^n(v)\| \leq (a + \eta)^{n+1} \|v\| \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ :$

$$\delta := \min(\varepsilon, r)$$

$\forall v \in \mathbb{R}^n \quad \|v\| < \delta :$

$$\|f^n(v)\| \leq (a + \eta)^n \|v\| \leq \|v\| < \varepsilon$$

$$\|f^n(v)\| \xrightarrow{n} 0$$

repulsive:

$$D(f^{-1})(x) = (Df(x))^{-1}$$

$$A := D(f^{-1})(x)$$

$$A^{-1} = (Df(x))^{-1}$$

$$\sigma(A^{-1}) = \sigma(A)^{-1}$$

$x$  attractive by  $f^{-1} \rightarrow x$  repulsive by  $f$

## Local stability of periodic points

Let:

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
- $x \in \mathbb{R}^n$  period  $k$  point
- $o(x)$  orbit of  $x$

Then, holds:

- $\forall p_i \in o(x) :$ 

$$A_i := Df^k(p_i) = Df(p_{i-1}) \cdots Df(p_k) \cdots Df(p_i)$$

$$\sigma(A_i) = \sigma(A_{i'})$$

Demonstration:

regla de la cadena da producto de matrices que no es conmutativo



## Invariant stable & unstable manifold

Let:

$$\cdot f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

We name invariant stable manifold of  $x$  to:

$$\{v \in \mathbb{R}^n \mid f^n \xrightarrow{n} 0\}$$

We name invariant unstable manifold of  $x$  to:

$$\{v \in \mathbb{R}^n \mid f^{-n} \xrightarrow{n} 0\}$$

We denote:

- stable invariant manifold :  $W^s$
- unstable invariant manifold :  $W^u$

### Stable & unstable invariant manifolds

Let:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto \left(\frac{x}{2}, 2y - 7x^2\right) \end{aligned}$$

Study:

$$\cdot \text{ stability of } \text{Fix}(f)$$

Start:

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -4x & 2 \end{pmatrix}$$

$$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(Df(0, 0)) = \{1/2, 2\} \rightarrow (0, 0) \text{ sella point}$$

$$\forall y \in \mathbb{R} :$$

$$f(0, y) = (0, 2y) \rightarrow f^n(0, y) = (0, 2^n y) \xrightarrow{n} \infty$$

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\} \subset W^u(0, 0)$$

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 4x^2\}$$

$$\forall (x, y) \in C :$$

$$f(x, y) = f(x, 4x) = (x/2, x^2) \in C$$

$$f^{-1}(x, y) = (2x, 16x^2) \in C$$

$$f^n(x, 4x) = (x/2^n, x^2/2^{2n-2}) \xrightarrow{n} (0, 0)$$

$$W^s(0, 0) = C$$