

Protocolo: **2213141595**
Nome: **MARCO ANTONIO ARAUJO DA CUNHA**
Dt. Nasc: **08/08/1973**

Data: **24/03/2026**
Unidade: **CDPI MDX**



00010LNAZF00Y01F

ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER COLORIDO

Indicação: Exame de rotina.

Técnica: Exame realizado com transdutor multifrequencial linear de alta resolução.

A tireoide tem forma preservada, contorno regular e volume normal.

Medidas:

Lobo direito: 4,8 x 1,2 x 2,0 cm (vol.: 6,6 cm³).

Lobo esquerdo: 5,3 x 1,2 x 1,8 cm (vol.: 6,6 cm³).

Istmo: 2,9 x 0,2 x 1,3 cm (vol.: 0,5 cm³).

Volume total: 13,7 cm³.

Parênquima com textura heterogênea, destacando-se nódulos mistos, isoecóicos, AP<T, margem regular, sem focos ecogênicos e com vascularização periférica, medindo 0,8 x 0,7 x 0,4 cm no terço inferior do lobo direito e 0,6 x 0,5 x 0,3 cm no terço inferior do lobo esquerdo (TR2).

Cistos colóides medindo até 0,3 cm.

O estudo de Dopplerfluxometria colorida mostrou: fluxo normal na glândula.

TI - RADS - RECOMENDAÇÕES DO ACR (AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY)

TR 5 (≥ 7 ou mais pontos): Altamente suspeito - Conduta: PAAF ≥ 1,0 cm, follow up ≥ 0,5 cm, anualmente por 5 anos.

TR 4 (4 a 6 pontos): Moderadamente suspeito - Conduta: PAAF ≥ 1,5 cm, follow up ≥ 1,0 cm, em 1, 2, 3 e 5 anos.

TR 3 (3 pontos): Levemente suspeito - Conduta: PAAF ≥ 2,5 cm, follow up ≥ 1,5 cm em 1, 2, 3 e 5 anos.

TR 2 (2 pontos): Sem suspeição - Nenhuma conduta adicional.

TR 1 (0 pontos): Benigno - Nenhuma conduta adicional. Nódulos que não se encaixam nesses critérios: Nenhuma conduta adicional.

Laudado por:
DRA. CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO
CRM:52485850

Este laudo foi assinado eletronicamente.

Atenção:

O valor preditivo de qualquer exame depende de análise conjunta do seu resultado e dados clínico-epidemiológicos do(a) paciente