



# Teorie Modificate della Gravità

Un'esplorazione approfondita delle alternative alla Relatività Generale per comprendere l'energia oscura e i fenomeni cosmologici attraverso modifiche geometriche dello spazio-tempo.

# L'Energia Oscura: Il Mistero Cosmico

70%

## Composizione Universale

L'energia oscura domina il nostro Universo, determinando la sua evoluzione e destino finale.

0.7

## Parametro $\Omega_\Lambda$

Valore che quantifica la densità di energia oscura rispetto alla densità critica dell'Universo.

Le evidenze sperimentali provengono da multiple fonti: analisi del fondo cosmico di microonde (CMB), osservazioni delle supernovae di tipo Ia e fenomeni di lensing gravitazionale. La densità di energia oscura è straordinariamente piccola ma cosmologicamente dominante.

$$\rho_\Lambda \approx (10^{-3} \text{ eV})^4 = 10^{-48} \text{ GeV}^4$$

Questa equazione rappresenta la densità di energia oscura, dove  $\rho_\Lambda$  indica la densità energetica associata alla costante cosmologica, espressa in unità di  $\text{GeV}^4$  per evidenziare la sua piccolezza rispetto alle scale tipiche della fisica delle particelle.



# Il Problema della Costante Cosmologica

La densità di energia oscura rimane costante durante l'espansione universale (proporzionale ad  $a^0$ ), implicando una produzione continua di energia. Questo comportamento è descritto dalla teoria quantistica dei campi attraverso le fluttuazioni del vuoto quantistico.

$$T_{\mu\nu}^{\text{vuoto}} = \rho_{\text{vuoto}} g_{\mu\nu}$$

Il tensore energia-impulso del vuoto quantistico, dove  $T^{\text{vuoto}}_{\mu\nu}$  rappresenta il contributo energetico delle fluttuazioni quantistiche,  $\rho_{\text{vuoto}}$  è la densità di energia del vuoto e  $g_{\mu\nu}$  è il tensore metrico dello spazio-tempo.

$$\rho_{\text{vuoto}} \approx \frac{m^4}{(\hbar/c)^3} + C$$

Ogni particella di massa  $m$  contribuisce alla densità energetica del vuoto, dove  $\hbar$  è la costante di Planck ridotta,  $c$  la velocità della luce e  $C$  una costante di integrazione. Il problema risiede nell'instabilità radiativa che vanifica l'accoppiamento con la materia ordinaria.

# Motivazioni per Modificare la Relatività Generale

## Successi Consolidati

La RG ha ottenuto risultati straordinari in regimi di campo forte (stelle di neutroni, buchi neri) e debole (onde gravitazionali VIRGO/LIGO), dimostrando precisione incredibile.

## Meccanismi di Screening

Le teorie modificate permettono di aggirare il problema della costante cosmologica attraverso processi che schermano effetti extra su scale piccole, mantenendo validità cosmologica.

## Incompletezza Ultravioletta

La natura della costante  $G$  rende la RG incompleta nell'ultravioletto, limitando gli effetti quantistici alla scala di Planck come cut-off naturale della teoria.

Le singolarità fisiche, come quelle all'interno dei buchi neri, rappresentano limiti fondamentali della RG che non può descrivere completamente la struttura dello spazio-tempo in condizioni estreme. Le teorie di gravità quantistica, pur teoricamente consistenti, rimangono sperimentalmente inaccessibili con la strumentazione attuale.

# Requisiti di Validità delle Teorie Modificate

01

---

## Recupero della Relatività Generale

Deve riprodurre la RG in contesti di campo debole e scale del sistema solare, mantenendo tutte le previsioni consolidate: stelle di neutroni, buchi neri, onde gravitazionali, lensing gravitazionale.

02

---

## Rispetto della Causalità

Le equazioni di campo devono garantire che l'informazione viaggi sempre a velocità inferiore a quella della luce, preservando la struttura causale dello spazio-tempo.

03

---

## Stabilità delle Soluzioni

Assenza di termini "ghost" nella lagrangiana che potrebbero rendere instabili le soluzioni e violare la conservazione locale del tensore energia-impulso.

04

---

## Accordo Osservativo

Compatibilità con test gravitazionali galattici e osservazioni cosmologiche: CMB, Dark Energy Survey (DES), rilevazioni LIGO/Virgo di onde gravitazionali.




# Gravità F(R): Fondamenti Teorici

La gravità F(R) rappresenta una delle prime e più studiate alternative alla Relatività Generale, introducendo una funzione arbitraria F(R) al posto della curvatura scalare R nell'azione di Einstein-Hilbert. Questa modifica permette di descrivere l'espansione accelerata attraverso termini puramente geometrici.

$$S = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^4x \sqrt{-g} F(R) + S_m(g_{\mu\nu}, \psi)$$

L'azione modificata dove  $\kappa^2 = 8\pi G/c^4$  è la costante di Einstein,  $\sqrt{-g}$  è la radice del determinante del tensore metrico, F(R) è la funzione arbitraria della curvatura scalare R, e S\_m rappresenta l'azione della materia che dipende dal tensore metrico  $g_{\mu\nu}$  e dai campi di materia  $\psi$ .



# Equazioni di Campo F(R)

Le equazioni di campo per la gravità F(R) si ottengono variando l'azione rispetto al tensore metrico, introducendo dinamiche gravitazionali completamente nuove rispetto alla Relatività Generale.

$$F'(R)R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}F(R)g_{\mu\nu} - (\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu}\square)F'(R) = \kappa^2 T_{\mu\nu}$$

Equazioni di campo modificate dove  $F'(R)$  è la derivata di  $F(R)$  rispetto a  $R$ ,  $R_{\mu\nu}$  è il tensore di Ricci,  $g_{\mu\nu}$  il tensore metrico,  $\nabla_\mu \nabla_\nu$  rappresenta le derivate covarianti seconde,  $\square$  è l'operatore d'Alembertiano ( $\square = g^{\alpha\beta} \nabla_\alpha \nabla_\beta$ ), e  $T_{\mu\nu}$  è il tensore energia-impulso della materia. Il termine aggiuntivo  $(\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu}\square)F'(R)$  introduce dinamiche di ordine superiore che distinguono questa teoria dalla RG.

## Termine Geometrico Puro

La funzione  $F(R)$  permette di spiegare l'accelerazione cosmica senza invocare energia oscura, utilizzando solo modifiche geometriche.

## Dinamiche di Ordine Superiore

Le derivate seconde di  $F'(R)$  introducono nuove dinamiche gravitazionali che possono simulare effetti di energia oscura.

# Modelli $F(R)$ Specifici

Tra i modelli più studiati di gravità  $F(R)$ , il caso  $F(R) = R + \alpha R^2$  riveste particolare importanza per le sue implicazioni cosmologiche sia nell'universo primordiale che tardivo.

$$F(R) = R + \alpha R^2$$

Modello quadratico dove  $\alpha$  è un parametro dimensionale che determina l'intensità della correzione quadratica. Il termine  $\alpha R^2$  fornisce contributi significativi quando la curvatura scalare  $R$  diventa grande, come durante l'inflazione primordiale o in regioni di forte curvatura.

## Inflazione Cosmica Precoce

Il termine quadratico  $\alpha R^2$  può guidare l'inflazione nell'universo primordiale, fornendo un meccanismo naturale per l'espansione esponenziale iniziale senza richiedere campi scalari aggiuntivi.

1

2

## Evoluzione Tardiva

Lo stesso termine può influenzare l'evoluzione dell'universo a tempi tardivi, potenzialmente spiegando l'attuale accelerazione cosmica attraverso effetti geometrici puri.

La bellezza di questo modello risiede nella sua semplicità matematica e nella capacità di unificare inflazione primordiale e accelerazione tardiva in un unico framework geometrico, eliminando la necessità di componenti oscure separate.

# Gravità di Lovelock: Geometria in Dimensioni Superiori

La gravità di Lovelock estende la Relatività Generale introducendo termini di curvatura di ordine superiore, mantenendo però equazioni del moto di secondo ordine nelle derivate metriche. Questa proprietà unica evita le instabilità di ghost tipiche delle teorie con derivate superiori.

$$S = \int d^D x \sqrt{-g} (R + \alpha_2 \mathcal{L}_2 + \alpha_3 \mathcal{L}_3)$$

Azione di Lovelock in D dimensioni dove R è la curvatura scalare standard,  $\alpha_2$  e  $\alpha_3$  sono costanti di accoppiamento dimensionali,  $\mathcal{L}_2$  è la lagrangiana di Gauss-Bonnet e  $\mathcal{L}_3$  rappresenta il termine di Lovelock di terzo ordine. L'integrazione avviene su D dimensioni spaziotemporali.

$$\mathcal{L}_2 = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} - 4R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + R^2$$

Termine di Gauss-Bonnet dove  $R_{\mu\nu\rho\sigma}$  è il tensore di curvatura di Riemann completo,  $R_{\mu\nu}$  è il tensore di Ricci, e R è la curvatura scalare. Questa combinazione specifica garantisce che le equazioni del moto rimangano di secondo ordine, preservando la stabilità dinamica.

# Proprietà Uniche della Gravità di Lovelock




## Effetti Dimensionali

In quattro dimensioni, il termine di Gauss-Bonnet diventa topologico e non contribuisce dinamicamente alle equazioni del moto, richiedendo dimensioni superiori per effetti fisici.



## Nuove Polarizzazioni

La teoria permette di ricercare polarizzazioni aggiuntive del gravitone oltre alle due standard ( $\times$  e  $+$ ), aprendo nuove possibilità per la comprensione gravitazionale.



## Connessione String Theory

Fornisce un framework naturale per studiare la gravità in dimensioni superiori, aspetto fondamentale nella teoria delle stringhe e nella gravità quantistica.

L'aumento della dimensionalità non è solo un artificio matematico, ma apre la possibilità di scoprire nuove polarizzazioni fisiche del gravitone che potrebbero rivelare aspetti profondi della natura gravitazionale. Queste polarizzazioni aggiuntive potrebbero essere rilevabili attraverso futuri esperimenti di onde gravitazionali in configurazioni specifiche.

# Teorie K-Essence: Dinamica Scalare Non-Standard

Le teorie K-essence introducono un approccio innovativo attraverso campi scalari con termini cinetici non-standard per spiegare l'accelerazione cosmica senza invocare una costante cosmologica esplicita.

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} P(X, \phi)$$

Azione K-essence dove  $P(X, \phi)$  è una funzione arbitraria del campo scalare  $\phi$  e del suo termine cinetico  $X$ . La funzione  $P$  determina completamente la dinamica del sistema e può essere scelta per riprodurre comportamenti cosmologici specifici.

$$X = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi$$

Definizione del termine cinetico dove  $g^{\mu\nu}$  è il tensore metrico inverso,  $\nabla_\mu$  rappresenta la derivata covariante, e  $\phi$  è il campo scalare. Il segno negativo assicura che  $X$  sia positivo per campi scalari con gradiente tipo-spazio, condizione necessaria per stabilità fisica.



## Campo Scalare Dinamico

Il campo  $\phi$  evolve dinamicamente secondo equazioni derivate dalla funzione  $P(X, \phi)$ , permettendo soluzioni cosmologiche accelerate.



## Termine Cinetico Modificato

La dipendenza non-lineare da  $X$  modifica radicalmente la dinamica rispetto ai campi scalari standard, generando pressioni negative.



## Accelerazione Naturale

Le soluzioni dinamiche producono naturalmente accelerazione cosmica senza richiedere energia oscura esplicita.

# Vantaggi delle Teorie K-Essence

Le teorie K-essence offrono una soluzione elegante al problema dell'energia oscura attraverso dinamiche scalari naturali che emergono dalla struttura stessa della teoria.

## Dinamiche Auto-Consistenti

Le equazioni del moto derivano naturalmente dalla funzione  $P(X, \phi)$ , garantendo coerenza matematica e fisica.

## Stabilità Intrinseca

Evita instabilità di ghost tipiche di altre teorie modificate mantenendo derivate di secondo ordine.



## Flessibilità Fenomenologica

La forma arbitraria di  $P(X, \phi)$  permette di adattare la teoria a diverse osservazioni cosmologiche.

## Unificazione Concettuale

Unifica inflazione primordiale e accelerazione tardiva in un singolo framework di campo scalare.

Questa struttura teorica rappresenta un ponte naturale verso teorie più generali come quella di Horndeski, che generalizza ulteriormente il framework scalare-tensore.

# Teoria di Horndeski: Il Framework Più Generale

La teoria di Horndeski rappresenta la più generale teoria scalare-tensore con equazioni del moto di secondo ordine, unificando sotto un unico framework matematico tutte le teorie precedentemente discusse come casi speciali.

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \sum_{i=2}^5 \mathcal{L}_i$$

Azione di Horndeski dove ogni lagrangiana  $\mathcal{L}_i$  contribuisce con termini di complessità crescente. Questa struttura garantisce l'assenza di instabilità di ghost mantenendo la generalità massima possibile.

| O1                                                                                                                                | O2                                                                                                                                                                                         | O3                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L<sub>2</sub>: Termine Cinetico Standard</b>                                                                                   | <b>L<sub>3</sub>: Accoppiamento Derivativo</b>                                                                                                                                             | <b>L<sub>4</sub>: Accoppiamento Geometrico</b>                                                                                                                |
| $\mathcal{L}_2 = K(X, \phi)$                                                                                                      | $\mathcal{L}_3 = -G_3(X, \phi) \square \phi$                                                                                                                                               | $\mathcal{L}_4 = G_4(X, \phi) R + G_{4X} [(\square \phi)^2 - (\nabla_\mu \nabla_\nu \phi)^2]$                                                                 |
| Generalizza le teorie K-essence dove $K(X, \phi)$ è una funzione arbitraria del campo scalare $\phi$ e del termine cinetico $X$ . | Introduce accoppiamento tra il campo scalare e la sua traccia del d'Alembertiano, dove $G_3(X, \phi)$ è una funzione arbitraria e $\square \phi = g^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu \phi$ . | Accoppia il campo scalare alla curvatura scalare $R$ , dove $G_4(X, \phi)$ determina l'intensità dell'accoppiamento e $G_{4X}$ è la derivata rispetto a $X$ . |

# Struttura Completa di Horndeski

La teoria di Horndeski si completa con il termine  $L_5$  che introduce le interazioni più complesse mantenendo la stabilità delle equazioni del moto.

$$\mathcal{L}_5 = G_5(X, \phi) G_{\mu\nu} \nabla^\mu \nabla^\nu \phi - \frac{1}{6} G_{5X} [(\Box \phi)^3 - 3\Box \phi (\nabla_\mu \nabla_\nu \phi)^2 + 2(\nabla_\mu \nabla_\nu \phi)^3]$$


Termine più complesso dove  $G_{\mu\nu}$  è il tensore di Einstein,  $G_5(X, \phi)$  è una funzione arbitraria,  $G_{5X}$  la sua derivata rispetto a  $X$ , e i termini cubici nelle derivate seconde del campo scalare introducono dinamiche non-lineari sofisticate preservando l'ordine delle derivate.

## F(R) Gravity

Caso speciale ottenuto scegliendo opportunamente le funzioni  $G_i(X, \phi)$ .

## Quintessenza

Modelli di energia oscura dinamica come casi limite.



## K-Essence

Emerge quando solo  $L_2$  è non-nullo con  $K(X, \phi) = P(X, \phi)$ .

## Brans-Dicke

Teoria scalare-tensore classica come sottocaso particolare.

## Galileon

Teorie con simmetrie galileiane emergono da scelte specifiche.

# Proprietà Fondamentali di Horndeski

## Assenza di Ghost

La costruzione garantisce automaticamente l'assenza di gradi di libertà instabili (ghost) che potrebbero compromettere la stabilità fisica della teoria, mantenendo equazioni del moto di secondo ordine.

## Generalità Massimale

Rappresenta la teoria scalare-tensore più generale possibile con le proprietà desiderate, unificando matematicamente tutti i modelli precedenti in un framework coerente.

## Flessibilità Fenomenologica

Le funzioni arbitrarie  $G_i(X, \varphi)$  permettono di adattare la teoria a qualsiasi osservazione cosmologica, dall'inflazione primordiale all'accelerazione tardiva.

## Screening Naturale

Meccanismi di screening emergono naturalmente dalla struttura non-lineare, permettendo di soddisfare test gravitazionali locali mantenendo effetti cosmologici.



# Applicazioni Cosmologiche di Horndeski

La teoria di Horndeski trova applicazioni naturali in diversi contesti cosmologici, dalla fisica dell'universo primordiale alla comprensione dell'accelerazione cosmica attuale.

## Inflazione Primordiale

I termini  $L_4$  e  $L_5$  possono guidare l'inflazione attraverso accoppiamenti geometrici, fornendo alternative ai modelli inflazionari standard basati su potenziali scalari.

## Materia Oscura Modificata

Alcuni modelli di Horndeski possono simulare effetti di materia oscura attraverso modifiche gravitazionali, offrendo alternative alle particelle esotiche.

1

2

3

4

## Energia Oscura Dinamica

La combinazione di tutti i termini  $L_i$  permette di costruire modelli di energia oscura che evolvono dinamicamente, spiegando l'accelerazione attuale senza costante cosmologica.

## Onde Gravitazionali

La teoria predice modifiche nella propagazione delle onde gravitazionali che potrebbero essere rilevabili con futuri interferometri spaziali.

Queste applicazioni dimostrano la ricchezza fenomenologica della teoria di Horndeski e la sua capacità di affrontare simultaneamente multiple questioni aperte in cosmologia moderna.

# Test Osservativi e Vincoli Sperimentali

Le teorie modificate della gravità devono confrontarsi con un panorama osservativo sempre più preciso che pone vincoli stringenti sui parametri teorici e sulle deviazioni dalla Relatività Generale.



## Missioni Spaziali

Planck, WMAP e future missioni come Euclid forniscono misure precise del CMB e della struttura a grande scala, vincolando i parametri cosmologici delle teorie modificate.



## Onde Gravitazionali

LIGO, Virgo e futuri rilevatori spaziali come LISA testeranno la propagazione delle onde gravitazionali, discriminando tra diverse teorie modificate.

La convergenza di evidenze da scale che vanno dal laboratorio all'orizzonte cosmico rappresenta il banco di prova definitivo per qualsiasi teoria alternativa alla Relatività Generale.



## Survey Astronomiche

Dark Energy Survey (DES), LSST e SKA mapperanno l'universo con precisione senza precedenti, testando le previsioni delle teorie alternative su scale cosmologiche.



## Test di Laboratorio

Esperimenti di precisione sulla legge dell'inverso del quadrato e test del principio di equivalenza pongono limiti sui meccanismi di screening delle teorie modificate.

# Prospettive Future e Conclusioni

Le teorie modificate della gravità rappresentano una frontiera attiva della fisica teorica moderna, offrendo soluzioni innovative ai problemi cosmologici più profondi attraverso modifiche geometriche dello spazio-tempo.



Il futuro della gravità modificata dipenderà dalla capacità di queste teorie di fornire previsioni testabili che si distinguano chiaramente dalla Relatività Generale, mantenendo al contempo la coerenza con l'impressionante successo sperimentale della teoria einsteiniana. La prossima generazione di esperimenti e osservazioni cosmologiche determinerà se la natura richiede davvero modifiche alla nostra comprensione fondamentale della gravità.