



Forretta in zona Passo Agueglio – La Val Portone e Pizzo del Cic

28 agosto 2016



Approfitando della giornata splendida, mi sono detto perché non andare a fare 4 passi in Grigna e chiudere un paio di punti di domanda? Al solito se ne sono aperti altri, ma vediamo con ordine.

La zona di passo Agueglio sta a monte della val Portone e si apre ai piedi del Monte San Defendente. La zona mi ha sempre molto intrigato, e la ragione in più era che dopo l'uscita con Annibale e Sandro, mi era rimasta la voglia di vedere meglio la zona, scendendola dall'alto. Parcheggiata la moto al passo scendo deciso, ma ahimè senza mappa, verso una profonda depressione che si intuiva dalla foto aerea, ero partito forse con un ottimismo esagerato rispetto alla verticalità del luogo. Al margine del prato, in dolce pendenza, comincia subito un brusco e ripido pendio, in un bosco in cui è molto piacevole camminare, ma ahimè non stare in piedi. Il bosco è in realtà attraversato da un paio di sentieri che portano sul lato destro o sinistro della valle, ma secondo me la parte più interessante era quella diretta verso il basso. In effetti in breve si giunge ad un piccolo saltino di meno di dieci metri facilmente aggirabile. Ed inizia sorprendentemente una bella forretta. Il bosco è interessante in quanto formato da piante di piccola sezione, come se fosse un luogo di taglio di bosco, l'ultimo non più di una trentina di anni fa. Nella foto si vede il primo saltello aggirato, in corrispondenza di una confluenza con la valle principale (sx idrografica) che scende dal S. Defendente (prossimo obiettivo di uscita). La roccia è molto varia, con facies di calcare molto differenziate in pochi metri di progressione, ci vorrebbe un geologo per capirne di più, l'effetto scenografico per i non addetti è comunque non trascurabile. La progressione continua nel letto della forra che si approfondisce tra pareti sempre più alte e suggestive.



Lo



sfasciume di fondo, ci accompagna, senza impedire la progressione più di tanto. In pochi minuti si giunge quindi alla strada che incrocia la Val Portone da dove eravamo partiti per fare la risalita dell'interessante buco in parete, che poi si era rivelato una bufala. I colori della roccia passano alternativamente dal marrone al bianco al grigio al nero, con un calcare di spessore centimetrico, ma che comunque affascina per l'intensità dei colori.

Non posso dire di aver battuto bene la zona, ma scendendo nella forra devo dire che non ho visto alcun buco occhieggiare in parete, ma tant'è le pareti sono alte, la visibilità molto limitata ed i buchi potrebbero nascondersi ovunque. Discesa da fare, in

stagione non piovosa e certamente senza neve. Con acqua o neve le condizioni di discesa potrebbero essere proibitive, ricordo che la Val Portone è nota per le sue frane anche imponenti, e la strada spesso riasfaltata di fresco ne è una costante testimonianza.

Grazie ad una serie di provvidenziali passaggi automobilistici, mi risparmio il dislivello di soli 300m, ma fastidiosi, e raggiunge la moto per proseguire nel giro mentale pianificato. Giungo così in breve al Cic. Circa un paio di anni fa mi ero trovato a fare una serie di osservazioni su alcuni buchi in cui l'aria oscillava con un periodo di alcuni minuti. Le osservazioni fatte, e la non congruenza dei dati (le oscillazioni non erano per nulla sincrone né omogenee tra loro) mi avevano lasciato la voglia di tornare e rifare le misure. Ieri fortunatamente non c'era un alito di vento (l'altra volta c'erano raffiche di vento importanti, e secondo chi mi accompagnava abbastanza frequenti a quell'ora in quella zona in quella stagione (estate)). Ho ritrovato velocemente i buchi che mi interessavano ed ho avuto modo di posizionare i famosi e costosissimi anemometri Badino anche detti SUCA, per poter effettuare delle misure qualitative. Dopo una serie di osservazioni ripetute per quasi un ora, ho dovuto constatare che il flusso delle arie era solo ed esclusivamente entrante (come si conviene a delle bocche calde d'estate). Non avendo con me gli anemometri tradizionali non ho potuto prendere misure più precise di frequenza. Rieccoci perciò daccapo a cercare di capire come si correlerebbero le due osservazioni così diverse. La ipotesi più immediata è che siano una serie di fratture in connessione con l'esterno e che quindi risentano facilmente delle ventate di quota. Sarebbe bello a questo punto tornare in inverno e vedere la temperatura in uscita dalle suddette bocche, a questo punto sapremmo se si parla di buchetti o potenziali abissi.

Grazie per l'attenzione