

LA CAVERNA FERRERA:

UN IMPORTANTE RIFUGIO FAUNISTICO.

Testi di:
Mirco Capelli

Foto di:
Mirco Capelli

In Val Meria nel Comune di Mandello Lario (LC), a quota 590 metri sopra il livello del mare e a 391 metri sopra il livello del sottostante Lago di Como, è presente un ingresso nel gruppo montuoso delle Grigne, alto circa 3 metri, che introduce alla caverna denominata da alcuni "Grotta Ferrera" (1502Lo).

Superati i primi 12 metri di galleria, quello che più impressiona del successivo ambiente è la vastità: si apre una enorme sala, alta sino a 15 metri, che costituisce sostanzialmente l'intera cavità. Il pavimento è ingombro di grossi massi che si sono staccati dalla volta.

In passato sono state compiute alcune misurazioni meteorologiche dalle quali è stato possibile dedurre che il caratteristico clima stabile ipogeo lo si raggiunge a 50 metri dall'ingresso. Le escursioni termiche annuali hanno valori irrisori e la temperatura dell'aria può considerarsi stabile all'interno della grotta, ad una temperatura di circa 9,5°C per tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Ed è proprio qui che il pipistrello, uno dei mammiferi più "specializzati" presenti sul nostro Pianeta, trova rifugio durante i rigidi inverni o ricava un sito riproduttivo durante le torride estati.

In questa cavità, un vasto ambiente, poco distante dall'ingresso, manifesta le condizioni microclimatiche ideali per i pipistrelli, costituite sia da temperature basse e costanti sia da valori di umidità dell'aria elevati dati anche dalla presenza di intensi stillicidi.

I chiroteri, meglio noti come pipistrelli, vengono raggruppati in un ordine dei Mammiferi costituito da quasi un migliaio di specie diffuse in tutti i Continenti.

In Italia si contano una trentina di specie, quasi tutte quelle presenti in Europa. Il livello evolutivo raggiunto dai chiroteri permette loro di muoversi con agilità nel buio assoluto, grazie ad un sistema di ecolocalizzazione fornito dalla capacità di emettere e percepire gli ultrasuoni.

Molte superstizioni popolari del passato sono state conferite a questi animali che per lungo tempo sono rimasti un mistero per la scienza e creature misteriose per la gente comune.

I ricercatori considerano i chiroteri degli ottimi indicatori ambientali e la vigente legislazione ha emanato, già dal 1939, direttive volte a tutelarli

*E mentre essi restavano penserosi,
i gufi, i servitori della fanciulla se ne
andarono, spiccando il volo in stormo
dall'abisso verso la terra e tutti e
quattro si mutarono in suoi servitori.
(Popul Vuh; Le antiche storie del Quiché)*

:geco³:

per la loro capacità di distruggere gli insetti nocivi.

Recenti monitoraggi alla "Grotta Ferrera", realizzati dallo staff di biologi e naturalisti dell'Associazione "Fauna Viva", hanno rilevato la presenza, in questa cavità, di 3 diverse specie di chirotteri oggetto di particolare attenzione dalla Species Survival Commission (Commissione per la sopravvivenza della specie) della IUCN, mediante il posizionamento all'ingresso di una rete mistnet e l'inanellamento dei pipistrelli:

1) **Rhinolophus ferrumequinum** (Rinolofo Maggiore o Ferro di Cavallo Maggiore).
Per l'Italia considerata specie "vulnerabile".

Come tutti gli appartenenti al gruppo dei rinolofi, si distingue dagli altri pipistrelli per la particolare struttura nasale, una sorta di prolungamento del naso a forma di ferro di cavallo con un rialzo. Raggiunge una lunghezza testa-corpo pari a 71 mm e una apertura alare di 400 mm. Vola lentamente come una farfalla e si nutre di insetti di grandi dimensioni. Durante il riposo si attacca alla roccia solamente coi piedi e si avvolge nella membrana alare (Immagine 1).

2) **Myotis daubentonii** (Vespertilio di Daubenton).

Per l'Italia considerata specie "vulnerabile".
Ha una colorazione del pelo molto variabile ed ha delle caratteristiche orecchie piccole.



Immagine n.1 - *Rhinolophus ferrumequinum* (Rinolofo Maggiore o Ferro di Cavallo Maggiore).

Raggiunge una lunghezza testa-corpo pari a 55 mm e una apertura alare di 275 mm.

Vola velocemente con colpi d'ala rapidi e frequenti. Si nasconde in fessure o nicchie, raramente si attacca liberamente ben in vista.

3) **Myotis capaccinii** (Vespertilio di Capaccini).

Per l'Italia considerata specie "in pericolo di estinzione".

Il suo comportamento viene considerato tipicamente troglodilo, quindi particolarmente minacciato dal disturbo arrecato dall'uomo negli ambienti sotterranei dove trova rifugio e luogo di riproduzione.

Raggiunge una lunghezza testa-corpo pari a 54 mm e una apertura alare di 260 mm.

Nel periodo riproduttivo lo si trova in gruppi appesi alle pareti. Durante il letargo si nasconde nelle fessure..

Alla Grotta Ferrera sono tuttora in corso ricerche per conoscere gli spostamenti di questi animali verso i luoghi dove trovano il cibo necessario al

loro sostentamento. Alcuni esemplari sono stati poi ritrovati in siti riproduttivi individuati in edifici situati a Lierna sul lago di Como.

Importanti informazioni sulla loro alimentazione si possono ricavare dall'esame del contenuto dei loro escrementi. E' per questo che i ricercatori dell'Università di Milano hanno posizionato all'interno della grotta alcune reti di raccolta del guano (Immagine 2) in corrispondenza dei punti in cui si radunano le colonie.

Nell'ecosistema di grotta tutti i consumatori di primo livello sono detritivori. Si creano così delle specializzazioni come quelle delle comunità di organismi che si nutrono del guano, o meglio dei differenti componenti degli insetti rimasti e che formano la massa di escrementi dei pipistrelli. Sopra i mucchietti di guano si possono osservare centinaia di invertebrati comunemente chiamati millepiedi e classificati come diplopodi (Immagine 3), animali strettamente cavernicoli (troglubi) e guanobi.

La conoscenza di questi rifugi permette di com-




Immagine n.2 - Rete di raccolta del guano.

:geco³:

prendere meglio l'ecologia di questi animali e soprattutto permette di impostare dei progetti mirati alla loro conservazione.

La Grotta Ferrera è una cavità facilmente percorribile e quindi accessibile a tutti, il disturbo nei periodi più critici quali il riposo invernale, contribuisce quindi pesantemente alla rarefazione dei pipistrelli. E' indispensabile adottare opportuni accorgimenti che limitino il più possibile tali danni.

Di seguito vengono riproposte alcune norme comportamentali tratte da "Atti I Convegno Italiano sui Chiroterteri" e curato da P. Agnelli:

- Per minimizzare il disturbo dei pipistrelli che vivono nella grotta che si sta visitando, è buona regola muoversi silenziosamente, evitare assolutamente di illuminare gli animali con la luce diretta delle torce e cercare di passare alla maggior distanza possibile dal loro appiglio.

- Per l'illuminazione è preferibile usare torce elettriche ed evitare le lampade a carburo, almeno durante l'inverno, per evitare di innalzare la temperatura di letargo degli animali.

- Nel caso si decida di proteggere una grotta, è importante non ostacolare il passaggio degli animali. E' fondamentale progettare uno sbarramento che abbia la forma e le dimensioni appropriate, costruendolo nel periodo di minor disturbo e chiudendolo per gradi.

Bibliografia

Atti del I Convegno Italiano sui Chiroterteri, Castell'Azzara (GR), 28-29 marzo 1998.

Lorenzo Fornasari, Carlo Violani, Bruno Zava, 1997. I chiroterteri italiani, L'Epos.



Immagine n. 3. - Diplopodi.