

Trabajo Marco: soluciones

Contents

Problema 1	1
Problema 2	2

Problema 1

Enunciado

```
set.seed(05072000)

n_states <- 11
n_alternativas <- 5

tabla1 <- crea.tablaX(rexp(n_states*n_alternativas),
                      numalternativas = n_alternativas,
                      numestados = n_states)
knitr::kable(tabla1, digits = 4)
```

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11
d1	1.9228	1.0930	0.5440	0.3565	1.8626	0.8911	0.0630	0.9718	1.4738	0.7045	3.1733
d2	1.5812	5.7572	0.0921	0.3544	1.8318	0.1311	0.7041	0.4886	0.6263	3.0404	1.4588
d3	0.3835	0.3745	0.0571	0.6968	0.6242	1.3168	0.6257	1.1553	0.6514	1.4040	1.1438
d4	0.5095	2.2849	0.1072	0.9499	1.6185	4.6942	0.6971	0.0823	0.1552	1.8982	0.3073
d5	0.4219	0.6187	0.7808	0.2393	0.0566	1.9735	3.8550	1.6077	0.2207	0.0222	0.0836

Solucion

```
computing_crit_results <- function(tablaX, favorable, alfa){
  crit_results <- list()
  crit_results[["Wald"]] <- criterio.Wald(tablaX = tablaX, favorable = favorable)
  crit_results[["Optimista"]] <- criterio.Optimista(tablaX = tablaX, favorable = favorable)
  crit_results[["Hurwicz"]] <- criterio.Hurwicz(tablaX = tablaX, favorable = favorable, alfa = alfa)
  crit_results[["Laplace"]] <- criterio.Laplace(tablaX = tablaX, favorable = favorable)
  crit_results[["Savage"]] <- criterio.Savage(tablaX = tablaX, favorable = favorable)
  crit_results[["PuntoIdeal"]] <- criterio.PuntoIdeal(tablaX = tablaX, favorable = favorable)
  return(crit_results)
}
```

```
ES_FAVORABLE <- TRUE
results <- computing_crit_results(tablaX = tabla1,
                                  favorable = ES_FAVORABLE,
                                  alfa = 0.5)
```

```

#results
table_sol <- list()
for(name in names(results)){
  table_sol[["Criterio"]] <- c(table_sol[["Criterio"]], results[[name]]$criterio)
  table_sol[["Alternativa Optima"]] <- c(table_sol[["Alternativa Optima"]], results[[name]]$Alternativa)
}
names(table_sol) <- c("Criterio", "Alternativa Optima")
table_sol <- as.data.frame(table_sol)

knitr::kable(table_sol)

```

Beneficios

Criterio	Alternativa.Optima
Wald	2
Optimista	2
Hurwicz	2
Laplace	2
Savage	4
Punto Ideal	2

```

ES_FAVORABLE <- FALSE
results <- computing_crit_results(tablaX = tabla1,
                                favorable = ES_FAVORABLE,
                                alfa = 0.5)

#results
table_sol <- list()
for(name in names(results)){
  table_sol[["Criterio"]] <- c(table_sol[["Criterio"]], results[[name]]$criterio)
  table_sol[["Alternativa Optima"]] <- c(table_sol[["Alternativa Optima"]], results[[name]]$Alternativa)
}
names(table_sol) <- c("Criterio", "Alternativa Optima")
table_sol <- as.data.frame(table_sol)

knitr::kable(table_sol)

```

Costes

Criterio	Alternativa.Optima
Wald	3
Optimista	5
Hurwicz	3
Laplace	3
Savage	3
Punto Ideal	3

Problema 2

Enunciado

Un agricultor de un remoto pueblo al pie del volcan Vesubio tiene que decidir qué hortalizas plantar en su campo. Cada hortaliza lleva asociado un precio de venta (€/kg), un número de unidades que pueden

plantarse en el campo y un coeficiente que representa la probabilidad de supervivencia a un clima específico.

```
vegetables <- data.frame(
  name = c("Patata", "Tomate", "Berenjena", "Pimientos", "Calabacines", "Cebolla"),
  price_per_kg = c(1.39, 2.40, 1.84, 3.12, 1.88, 1.46),
  quantity = c(300, 240, 300, 200, 300, 300),
  survival_coeff_clima1 = c(0.7, 0.3, 0.4, 0.2, 0.3, 0.8),
  survival_coeff_clima2 = c(0.8, 0.5, 0.6, 0.7, 0.5, 0.8),
  survival_coeff_clima3 = c(0.7, 0.8, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8)
)

knitr::kable(vegetables)
```

name	price_per_kg	quantity	survival_coeff_clima1	survival_coeff_clima2	survival_coeff_clima3
Patata	1.39	300	0.7	0.8	0.7
Tomate	2.40	240	0.3	0.5	0.8
Berenjena	1.84	300	0.4	0.6	0.5
Pimientos	3.12	200	0.2	0.7	0.6
Calabacines	1.88	300	0.3	0.5	0.7
Cebolla	1.46	300	0.8	0.8	0.8

En esa región hay cuatro condiciones climáticas posibles y por el cambio climático no existe ningún modelo matemático en el que el agricultor pueda basarse para predecir el clima de la próxima temporada. Supongamos que el agricultor consigue vender todas las hortalizas que han sobrevivido en el momento de la cosecha. ¿Cuál hortaliza tiene que plantar el agricultor para maximizar su ganancia?

Solucion

Construcción de la tabla de decisión

```
temp <- NULL
table_per_lines <- c()


for(i in 1:6){
  temp <- unlist(vegetables[i,4:6]*vegetables[i,2]*vegetables[i,3])
  names(temp) <- NULL
  table_per_lines <- c(table_per_lines, temp)
}
```

Resolución

```
table <- crea.tablaX(table_per_lines,
  numalternativas = 6,
  numestados = 3)

dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tablaX = table)
```

Criterio de Hurwicz (favorable – línea discontinua)



```
## $AltOptimas
## [1] 6 2
##
## $PuntosDeCorte
## [1] 0.617
##
## $IntervalosAlfa
##      Intervalo      Alternativa
## [1,] "( 0 , 0.617 )" "6"
## [2,] "( 0.617 , 1 )" "2"
```

```
criterio.Todos(table, alfa = 0.5)
```

```
##           e1    e2    e3  Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
## d1          291.9 333.6 291.9 291.9      333.6   312.8   168.9   305.8
## d2          172.8 288.0 460.8 172.8      460.8   316.8   177.6   307.2
## d3          220.8 331.2 276.0 220.8      331.2   276.0   184.8   276.0
## d4          124.8 436.8 374.4 124.8      436.8   280.8   225.6   312.0
## d5          169.2 282.0 394.8 169.2      394.8   282.0   181.2   282.0
## d6          350.4 350.4 350.4 350.4      350.4   350.4   110.4   350.4
## iAlt.Opt (fav.)  --    --    --      d6        d2        d6        d6        d6
##
##           Punto Ideal
## d1           206.4
## d2           231.7
## d3           249.2
## d4           241.6
## d5           247.3
## d6           140.2
## iAlt.Opt (fav.)      d6
```

La mejor opción para el agricultor es cultivar cebollas de acuerdo con todos los criterios de decisión considerados,

excepto por el criterio optimista y el criterio de Hurwicz con grado de optimismo mayor que 0.617. Si el agricultor es bastante optimista que las condiciones climáticas van a ser buenas entonces elegirá de cultivar tomate por el criterio de Hurwicz.