

Anticoagulante. El coronavirus causa coagulación de la sangre en todos los órganos.

1. Aspirina 500mg. 1 cada 6 horas.
2. Xarelto 20 mg. 1 cada 24 horas.

Anti-inflamatorio. El coronavirus genera neumonía inflamatoria (NO bacteriana).

1. Dexametasona. 1 cada 24 hrs.
2. Solumedrol. VI. Cada 24 hrs x 3 horas.

Antibiótico. El cuerpo queda con defensas bajas, lo que hace que otros gérmenes ataquen con fuerza, hay que proteger los bronquios para poder asimilar el poco oxígeno que puede llegar a los alveólos.

1. Zinnat 500mg. 1 cada 12 horas.

Fiebre: La fiebre ocasiona mucho desgaste de oxígeno, por lo que puede asfixiarte en minutos si no es controlada.

1. Neomelubrina 500mg. 1 cada 8 hrs.

Aditamentos fundamentales:

- 3 tanques de oxígeno de 9mt³ al menos.
- 1 oxímetro, siempre debe marcar arriba de 90 de saturación.
- 1 regulador de oxígeno con vaso hidratador.
- 1 circuito de paciente, para entregar oxígeno (puntas de nariz y/o máscara de oxígeno).

Modificado por última vez: 2:00 p. m.