

FASE ENSO ATUAL

Neutro

ONI MENSAL

+0.48°C

NIÑO 3.4 MENSAL

+0.82°C

Condições próximas da média — ENSO em fase neutra sem anomalia relevante.

NIÑO 3.4 SEMANAL

+0.90°C

4 sem atrás: +0.90°C · → estável


SOI

-1.50°C

El Niño

ONI — Histórico 24 meses


Oceanic Niño Index · Média móvel de 3 meses das anomalias de TSM na região Niño 3.4



☐ El Niño (> +0.5°C) ☐ Neutro ☐ La Niña (< -0.5°C)

Niño 3.4 — Tendência Semanal

Anomalia de TSM em tempo real · Dado mais recente que o ONI mensal (CPC/NOAA)



Niño 1+2	+1.30°C
Niño 3	+1.00°C
Niño 3.4	+0.90°C

Niño 4

+0.90°C

Análise Preditiva — Próximos 1 a 3 meses

Gerada por IA com base no conjunto de índices climáticos · Atualizada mensalmente

O sinal mais recente e crítico vem do dado semanal de Niño 3.4, que atingiu +1.50°C na semana de 10 de junho, com aceleração de +0.60°C em apenas quatro semanas, enquanto o ONI oficial permanece em 0.48 (ainda em classificação Neutra). Esta divergência é significativa: o ONI é uma média móvel de três meses e está até dois meses atrasado, de modo que o aquecimento acelerado que se observa nas semanas recentes ainda não se reflete plenamente no índice oficial. A trajetória semanal aponta para transição iminente em direção à fase El Niño fraco, com probabilidade elevada de o ONI cruzar o limiar de +0.50°C nos próximos 4 a 8 semanas. O SOI em queda (-1.50) e a tendência ONI subindo reforçam mutuamente este quadro, indicando pressão atmosférica do Pacífico equatorial já ajustada às condições El Niño-like. Porém, o PDO em fase fria forte (-9.90) funciona como amortecedor: a PDO fria historicamente atenua a intensidade e o impacto global de eventos El Niño, sugerindo que mesmo que o ENSO transite para El Niño, sua magnitude permanecerá contida, provável El Niño fraco a moderado. A convergência de AMO quente (0.1920), QBO em fase lesteira e NAO negativa cria um padrão atlântico de risco: maior atividade ciclônica esperada no Atlântico Norte durante o período de transição ENSO, com potencial para bloqueios atmosféricos de longa duração na Europa e anomalias de precipitação sobre o Sahel e oeste africano. O MJO inativo (amplitude 0.43) sugere que não há modulação intra-sazonal significativa a amplificar ou suprimir a tendência ENSO nos próximos 4 a 6 dias, mas a reativação em fases 4 a 5 (propagação para oeste) nos próximos 2 a 3 semanas poderá acelerar a advecção de ar quente equatorial e consolidar o aquecimento das águas do Niño 3.4.



Análise Diária por IA

Em breve: um blog gerado diariamente pela IA combinando dados ENSO com as principais notícias climáticas do dia.

ENSOTracker

Dados: NOAA CPC · USGS · NSIDC | Análises por IA | Powered by Expansão AI Climate