# AAG01 (Parte 1)

Implementar funções que plotem **CDFs** e **PMFs** a partir de amostras **discretas** e **contínuas** passadas como parâmetro de entrada.

# Regras:

- 1. A tarefa deverá ser realizada obrigatoriamente no **Jupyter** com o uso de:
  - Blocos de Markdowns com comandos de LaTeX;
  - Blocos de código;
  - Blocos com resultados gráficos no ambiente do Jupyter;
  - Gráficos gerados devem ser interpretados e explicados em Markdown.
- 2. Não são permitidos comandos prontos além dos comandos básicos do Python.
- 3. Parâmetros de entrada devem ser cuidadosamente escolhidos e especificados para cada tipo de curva (ex.: tempos de processamento, pontuação esportiva, resultados de artigos).
- 4. Os formatos de entrega devem ser:
  - .pdf (exportado do Jupyter);
  - .ipynb (código fonte + markdowns).
- 5. Caso utilizem arquivos de amostras, favor anexá-los também.
- 6. Data de entrega: início da próxima aula.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

# Lendo dataset
df = pd.read_csv(".../DataSet/outdoor40.csv")
```

# Função PMF (Massa de Probabilidade)

$$P(X = x) = f(x) = Pr(X = x)$$

```
In [3]:
    def calcular_pmf_discreta(data):
        frequencias = {}
        for valor in data:
            if valor in frequencias:
                 frequencias[valor] += 1
            else:
                 frequencias[valor] = 1
        total = len(data)
        pmf = {valor: frequencia / total for valor, frequencia in frequencias.items()}
        return pmf
```

Usarei uma amostra simplificada para testar a função

probabilidades = list(pmf\_discreta.values())

plt.figure(figsize=(8, 2))


```
In [4]: amostra_discreta = [1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6]
    pmf_discreta = calcular_pmf_discreta(amostra_discreta)
    print ("PMF:", pmf_discreta)

PMF: {1: 0.1, 2: 0.1, 3: 0.2, 4: 0.4, 5: 0.1, 6: 0.1}

In [5]: valores = list(pmf_discreta.keys())
```

```
plt.margins(y=0.3)
markerline, stemlines, baseline = plt.stem(valores, probabilidades)
plt.setp(baseline, visible=False)
plt.title("PMF - Função Massa de Probabilidade")
plt.xlabel("Valores")
plt.ylabel("Probabilidade")
plt.show()
```

### PMF - Função Massa de Probabilidade



### Função CDF (Distribuição Acumulada)


$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x f(k)$$

```
In [7]:

def calcular_cdf_discreta(data):
    pmf = calcular_pmf_discreta(data)
    cdf = {}
    soma_acumulada = 0
    for valor in sorted(pmf.keys()):
        soma_acumulada += pmf[valor]
        cdf[valor] = soma_acumulada
    return cdf
```

Novamente usarei uma amostra simplificada para testar a função

### CDF - Função de Distribuição Acumulada



# PDF (Função de Densidade de Probabilidade)

$$f_X(x) = rac{1}{n \cdot h} \sum_{i=1}^n I\left(|x-x_i| \leq rac{h}{2}
ight)$$

```
# Amostra contínua
In [ ]:
        amostra_continua = [1.5, 2.3, 2.31, 2.32, 2.9, 3.7, 3.5, 2.1, 3.0, 3.0, 4.1, 1.8, 3.3, \
             5, 5.1, 5.9]
        # Função para calcular a PDF manualmente
        def calcular_pdf(amostra, x, largura_janela=0.5):
             n = len(amostra) # Tamanho da amostra
             contador = sum(1 \text{ for } xi \text{ in amostra if } abs(x - xi) <= largura_janela / 2)
             densidade = contador / (n * largura_janela)
             return densidade
        # Valores de x para cálculo
        x_valores = [min(amostra_continua) + i * 0.1 for i in range(50)] # Gera valores de x
        # Calcular PDF
        pdf_valores = [calcular_pdf(amostra_continua, x) for x in x_valores]
        plt.figure(figsize=(8, 4))
        plt.plot(x_valores, pdf_valores, label="PDF")
        plt.xlabel("Entrada")
        plt.ylabel("Densidade (PDF)")
        plt.title("PDF Calculada Manualmente")
        plt.legend()
        plt.grid(True)
        plt.show()
```

# PDF Calculada Manualmente 0.5 0.4 0.3 PDF 0.0 0.1 0.0 2 3 4 5 6

# CDF (Função de Distribuição Acumulada)

$$F_X(x) = rac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(x_i \leq x)$$

Entrada

```
# Amostra contínua
amostra_continua = [1.5, 2.3, 2.31, 2.32, 2.9, 3.7, 3.5, 2.1, 3.0, 3.0, 4.1, 1.8, 3.3, \
    5, 5.1, 5.9]
# Função para calcular a CDF manualmente
def calcular_cdf(amostra, x):
    n = len(amostra) # Tamanho da amostra
    contador = sum(1 for xi in amostra if xi <= x)</pre>
    probabilidade_acumulada = contador / n
    return probabilidade_acumulada
# Valores de x para cálculo
x_valores = [min(amostra_continua) + i * 0.1 for i in range(50)] # Gera valores de x
# Calcular CDF
cdf_valores = [calcular_cdf(amostra_continua, x) for x in x_valores]
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x_valores, cdf_valores, label="CDF")
plt.xlabel("Entrada")
plt.ylabel("Probabilidade Acumulada (CDF)")
plt.title("CDF Calculada Manualmente")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

