Bioestadística

Marcos Zambrano Fernández.[1]

[1]Universidad Nacional de Barranca

Semana 4: 27 de Abril de 2026

Contenido

Introducción

Medidas de Tendencia Central

La media o promedio

La mediana

La moda

Bioestadística

Escuela Profesional: Obstetricia-UNAB. **Profesor:** Marcos Zambrano F.

Semana 4:

Medidas de Tendencia Central

Medidas de Tendencia Central

Por lo general, el conjunto de datos de una muestra o de una población tienden a reunirse alrededor de un valor central. Las siguientes medidas de tendencia central son usualmente empleadas:

La media o promedio

La mediana

La moda



$\bar{X}$ - Me - Mo

La media o promedio

Es las mas utilizada y es considerada de mayor representatividad en los análisis estadísticos. Si la variable es X entonces la **media aritmética** se representa por $\bar{X}$ y está definida por

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

La mediana

En un conjunto de datos, la **mediana** es el valor que ocupa el lugar central tal que el 50% de las observaciones están por debajo y el otro 50% por encima.
Disponemos de las fórmulas:

$$Me \leftarrow x_{\frac{n+1}{2}}$$

y

$$Me \leftarrow \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}.$$

La moda

En un conjunto de datos, la **moda** es el valor que más se presenta o el atributo de mayor frecuencia.
Cuando existe una sola moda decimos que el conjunto de datos es **unimodal**. Decimos que es **bimodal** cuando existen dos modas.