

Teoría de sistema lineales Taller 04: Potencia y energía

Escuela de Ciencias exactas e Ingeniería

Nombre: _____ Fecha límite: 13 de marzo

potencia?

- 1. Para la señal $x(t) = e^{i3t}$, encuentre
 - (a) La potencia instantánea
 - (b) La energía
 - (c) La potencia promedio
- **2.** Para la señal $c(t) = e^t u(-t)$, encuentre
 - (a) La potencia instantánea
 - (b) La energía
 - (c) La potencia promedio

(d) ¿La señal c(t), es una señal de energía o de potencia?

(d) ¿La señal x(t), es una señal de energía o de

3. Considere la señal

$$x(t) = e^{-|t|}u(t+1)u(1-t),$$

- (a) Determine su soporte. ¿Es compacto?
- (b) ¿La señal es acotada en amplitud? Argumente.
- (c) Calcule su energía
- 4. Encuentre la energía de la señal

$$y(t) = \cos(\pi t)u(2-2t)u(2t-2)$$

5. Encuentre la potencia promedio de la señal

$$x(t) = e^{i2\pi t}$$

- (a) en el intervalo [0, 2]
- (b) en el intervalo [-2, 2]
- (c) en el intervalo [0, 10]

(d) ¿por qué la potencia promedio permanece constante sobre los 3 intervalo?

6. Encuentre la energía de la señal

$$z(t) = (1 + e^{i3t})[u(t+1) - u(t-2)]$$

7. Demuestre que la potencia promedio de una señal periódica, con periodo T, puede encontrarse como

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{T} |x(t)|^2 dt$$

- 8. Demuestre que ninguna señal periódica es una señal de energía.
- 9. Demuestre que ninguna señal periódica tiene soporte compacto.
- 10. Demuestre que toda señal acotada y de soporte compacto es un señal de energía (tiene energía finita).
- 11. Determinar si las siguientes señales de tiempo continuo son de potencia, energía o ninguna de ambas clases. Encontrar la potencia y la energía si es posible.

(a)
$$x_1(t) = (e^{|t|})^{-2}$$

(b)
$$x_2(t) = |t| \{u(t-5) - u(t+5)\}$$

(c)
$$x_3(t) = 2e^{i3t}$$

(d)
$$x_4(t) = 3e^{-2t}u(t)$$

(e)
$$x_5(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$$

(f)
$$x_6(t) = 2\delta(t) + 5\delta(t-3)$$

(g)
$$x_7(t) = \cos(\frac{\pi t}{3})\{u(t) - u(t-4)\}$$

12. Determinar si las siguientes señales de tiempo discreto son de potencia, energía o ninguna de ambas clases.

(a)
$$x_1[n] = -(\frac{1}{3})^n u[n]$$

(b)
$$x_2[n] = 3\pi \{u[n+3] - u[n-4]\}$$

(c)
$$x_3[n] = \sin\left(\frac{49\pi n}{4}\right)$$

(d)
$$x_4[n] = 2\delta[n] + 5\delta[n-3]$$

(e)
$$x_5[n] = 0.5u[n]$$

(f)
$$x_6[n] = \frac{1}{2} \{u[n+3] - u[n-3]\}$$

(g)
$$x_7[n] = \cos(\frac{\pi n}{3}) \{u[n] - u[n-6]\}$$

(h)
$$x_8[n] = 2e^{i0,25\pi n}$$