

Name: _____

1. Considere la señal

$$x(t) = e^{-|t|}u(t+1)u(1-t),$$

- (a) Descomponga la señal como una componente par, $x_{even}(t)$, mas una componente impar, $x_{odd}(t)$.
(b) Descomponga la señal como una componente causal $x_{cau}(t)$ mas una componente anti-causal $x_{ant}(t)$.

2. En la figura 1 se muestra una señal de tiempo discreto $x[n]$. Dibuje e indique con detalle cada una de las señales siguientes:

- (a) La parte *par* de $x[n]$

- (b) La parte *impar* de $x[n]$




Figura 1 – Señal discreta $x[n]$

3. Encuentre las componentes par e impar de las siguientes señales:

- (a)

$$x[n] = \begin{cases} 2 - \frac{n}{3}, & \text{si } -10 \leq n \leq -1 \\ 1, & \text{si } 0 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (b)

$$x[k] = \frac{10}{1 - 4k}$$

- (c)

$$s[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{9} + \frac{\pi}{4}\right)$$

4. Encuentre las componentes par e impar de la siguiente señal:

$$x(t) = \begin{cases} 2 - \frac{t}{3}, & \text{si } -10 \leq t \leq -1 \\ 1, & \text{si } -1 < t \leq 7 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

5. Determinar si las siguientes señales de tiempo continuo son periódicas. En caso de que sean periódicas, determine el periodo fundamental de cada una de ellas.

$$(a) s_1(t) = \sin^4\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$$

$$(b) s_2(t) = \frac{\cot(2\pi t + 3) \sec(4\pi t)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}t - 1\right) e^{j\left(\frac{2\pi}{3}t - 1\right)}}$$

$$(c) s_3(t) = \operatorname{Re}\left\{\frac{2}{4}e^{j\left(\frac{3\pi}{2}t - 1\right)}\right\}$$

$$(d) s_4(t) = \cos\left(\frac{5\pi}{9}t\right) \cot\left(\frac{\pi}{4}t\right) + \sin(8\pi t)$$

$$(e) s_5(t) = \cos^2\left(\frac{4\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$(f) s_6(t) = 1 + \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(g) s_7(t) = \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cos\left(\frac{2\pi}{10}t\right) + 3 \sin\left(\frac{5\pi}{21}t\right)$$

$$(h) s_8(t) = \sin(\Omega_0 t) + \sin\left(\frac{\Omega_0 t}{2}\right) + \sin\left(\frac{\Omega_0 t}{8}\right), \\ \Omega_0 \in \mathbb{R}$$

$$(i) s_9(t) = \sin(2t) + 3 \sin(6t) + 4 \sin(2t) + 5 \sin(20t)$$

$$(j) s_{10}(t) = \sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right) + \cos\left(\frac{2\pi t}{5}\right)$$

$$(k) s_{11}(t) = \sin^2(2t) + \sin(3t)$$

$$(l) s_{12}(t) = \cos(t) + \cos(\pi t)$$

$$(m) s_{13}(t) = \sin(\omega t) + \sin\left(\frac{\omega t}{3}\right) + \sin\left(\frac{\omega t}{4}\right)$$

$$(n) s_{14}(t) = \sin 2t + 3 \sin 6t + 5 \sin 10t + 10 \sin 20t$$

6. Determinar si las siguientes señales de tiempo discreto son periódicas. En caso de que sean periódicas, determine el periodo fundamental de cada una de ellas.

$$(a) s_1[n] = \sin(0,005\pi n)$$

$$(b) s_2[n] = \sqrt{6} \cos\left(\frac{4\pi}{10}n\right)$$

$$(c) s_3[n] = \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{27}n\right)}{\sin(0,02\pi n) \cos\left(\frac{4\pi}{32}n\right)}$$

$$(d) s_4[n] = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \sin\left(\frac{9\pi}{81}n\right) + 2 \cos\left(\frac{3\pi}{12}n + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$(e) s_5[n] = \cos^2\left(\frac{4\pi}{6}n - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$(f) s_6[n] = e^{-\frac{j2\pi n}{8}} + e^{\frac{j2\pi n}{6}}$$

$$(g) s_7[n] = \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cos\left(\frac{2\pi}{10}n\right) + 3 \sin\left(\frac{5\pi}{21}n\right)$$

$$(h) s_8[n] = e^{-\frac{j2\pi n}{4}} + e^{\frac{j2\pi n}{4}}$$

$$(i) s_9[n] = 4e^{-\frac{j3\pi n}{28}} + 2 \cos\left(\frac{11\pi}{16}n\right) - 0,5 \sin\left(\frac{22\pi}{66}n\right)$$

$$(j) s_{10}[n] = 3 \cos\left(\frac{4\pi}{10}n\right) + 4 \cos\left(\frac{6\pi}{21}n\right)$$