

Anexo: Fórmulas matemáticas

Exponenciales complejas

$$\begin{aligned} e^{\pm j\theta} &= \cos \theta \pm j \sin \theta \\ Ae^{\pm j\theta} &= A \cos \theta \pm j A \sin \theta \\ \cos \theta &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \\ \tan \theta &= -j \left[\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{e^{j\theta} + e^{-j\theta}} \right] \\ 1 + e^{-j\theta} &= (e^{j\frac{\theta}{2}} + e^{-j\frac{\theta}{2}}) e^{-j\frac{\theta}{2}} \\ &= 2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{-j\frac{\theta}{2}} \end{aligned}$$

Identidades trigonométricas de Pitágoras

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta \\ 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta \end{aligned}$$

Productos notables

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \end{aligned}$$

Variables complejas

$$\begin{aligned} z &= x + jy = r/\theta = re^{j\theta} \\ &= r(\cos \theta + j \sin \theta) \\ r &= |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta &= \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ z^* &= x - jy = r/-\theta \\ j &= \sqrt{-1}, \frac{1}{j} = -j, j^2 = -1 \end{aligned}$$

Trigonometría

$$\begin{aligned} \cos(2k\pi) &= 1 \\ \sin(2k\pi) &= 0 \\ \cos(k\pi) &= (-1)^k \\ \sin(k\pi) &= 0 \\ \cos\left(k\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} & \text{si } k \text{ par} \\ 0 & \text{si } k \text{ impar} \end{cases} \\ \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{cases} (-1)^{\frac{k-1}{2}} & \text{si } k \text{ impar} \\ 0 & \text{si } k \text{ par} \end{cases} \\ \sin(\alpha \pm 2k\pi) &= \sin(\alpha) \\ \sin\left(\alpha \pm \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\alpha) \\ \cos(\alpha \pm 2k\pi) &= \cos(\alpha) \\ \cos\left(\alpha \pm \frac{\pi}{2}\right) &= \sin(\alpha) \\ \tan(\alpha \pm k\pi) &= \tan(\alpha) \\ e^{\pm j2k\pi} &= 1 \\ e^{jk\pi} &= (-1)^k \end{aligned}$$

Identidades de ángulos dobles

$$\begin{aligned} \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \\ \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

Multiples ángulos

$$\begin{aligned}\sin(n\theta) &= 2 \sin((n-1)\theta) \cos \theta - \sin((n-2)\theta) \\ \cos(n\theta) &= 2 \cos((n-1)\theta) \cos \theta - \cos((n-2)\theta)\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas de sumas de ángulos

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\alpha - \tan^{-1}(\frac{B}{A}))$$

Identidades trigonométricas de productos a suma

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \sin \beta &= \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) \\ 2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

Relaciones trigonométricas hiperbólicas

$$\begin{aligned}\sinh \theta &= \frac{e^\theta - e^{-\theta}}{2} \\ \cosh \theta &= \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2} \\ \cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta &= 1\end{aligned}$$

Fracciones parciales

Polos simples:

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_m)}$$

$$X(s) = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \dots + \frac{k_m}{s-p_m}$$

$$k_i = (s-p_i)X(s)|_{s=p_i}$$

Polos repetidos:

$$X(s) = \frac{k_r}{(s-p_1)^r} + \frac{k_{r-1}}{(s-p_1)^{r-1}} + \dots + \frac{k_2}{(s-p_1)^2} + \frac{k_1}{s-p_1} + X_1(s)$$

$$k_r = (s-p_1)^r X(s) \Big|_{s=p_1}$$


$$k_{r-1} = \frac{d}{ds} [(s-p_1)^r X(s)] \Big|_{s=p_1}$$

$$k_{r-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s-p_1)^r X(s)] \Big|_{s=p_1}$$

⋮

$$k_{r-n} = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{ds^n} [(s-p_1)^r X(s)] \Big|_{s=p_1}$$

Senos y cosenos de ángulos comunes



Integrales esenciales

$$\begin{aligned}
 \int adt &= at + C \\
 \int U dV &= UV - \int V dU \\
 \int \cos(at) dt &= \frac{1}{a} \sin(at) \\
 \int \sin(at) dt &= -\frac{1}{a} \cos(at) \\
 \int \cos^2(at) dt &= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2at)}{4a} \\
 \int \sin^2(at) dt &= \frac{t}{2} - \frac{\sin(2at)}{4a} \\
 \int t \cdot \cos(at) dt &= \frac{1}{a^2} \cos(at) + t \frac{1}{a} \sin(at) \\
 \int t \cdot \sin(at) dt &= \frac{1}{a^2} \sin(at) - t \frac{1}{a} \cos(at) \\
 \int t^a \cdot \sin(t) dt &= -t^a \cos(t) + n \int t^{a-1} \cdot \cos(t) dt \\
 \int t^a \cdot \cos(t) dt &= t^a \sin(t) - n \int t^{a-1} \cdot \sin(t) dt \\
 \int e^{at} dt &= \frac{1}{a} e^{at} \\
 \int t \cdot e^{at} dt &= \frac{e^{at}}{a^2} (at - 1) \\
 \int e^{at} \cdot \sin(bt) dt &= \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \sin(bt) - b \cos(bt)) \\
 \int e^{at} \cdot \cos(bt) dt &= \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \cos(bt) + b \sin(bt)) \\
 \int t^n dt &= \frac{1}{n+1} t^{n+1} \quad \text{si } n \neq -1 \\
 \int \frac{1}{t} dt &= \ln |t| \\
 \int \frac{1}{at+b} dt &= \frac{1}{a} \ln |at+b| \quad \text{si } a \neq 0 \\
 \int \frac{1}{a^2 + (bt)^2} dt &= \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{bt}{a}\right) \\
 \int \frac{1}{\sqrt{t^2 \pm a^2}} dt &= \ln |t + \sqrt{t^2 \pm a^2}|
 \end{aligned}$$

Series geométricas

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{N-1} r^k &= \begin{cases} \frac{1-r^N}{1-r}, & \text{si } r \neq 1 \\ N, & \text{si } r = 1 \end{cases} \\
 \sum_{k=a}^{N-1} r^k &= \begin{cases} \frac{r^a - r^N}{1-r}, & \text{para } r \neq 1, a \text{ es constante.} \\ N-a, & \text{para } r = 1 \end{cases} \\
 \sum_{k=0}^{N-1} k r^k &= \frac{r[1 - (N+2)r^{N+1} + (N+1)r^{N+2}]}{(1-r)^2}, \quad \text{para } r \neq 1 \\
 \sum_{k=1}^N k &= \frac{N(N+1)}{2} \\
 \sum_{k=1}^N k^2 &= \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} \\
 \sum_{k=a}^N k^b &= \sum_{k=1}^N k^b - \sum_{k=1}^{a-1} k^b, \quad b \text{ es constante} \\
 \sum_{k=0}^{\infty} r^k &= \frac{1}{1-r}, \quad \text{para } |r| < 1 \\
 \sum_{k=a}^{\infty} r^k &= \frac{r^a}{1-r}, \quad \text{para } |r| < 1, a \text{ es constante} \\
 \sum_{k=0}^{\infty} k r^k &= \frac{r}{(1-r)^2}, \quad \text{para } |r| < 1 \\
 \sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k &= \frac{r^2 + r}{(1-r)^3}, \quad \text{para } |r| < 1
 \end{aligned}$$

Integrales definidas

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{\sin(at)}{t} dt &= \frac{\pi}{2}, \quad a > 0 \\
 \int_0^{\infty} t^k \cdot e^{-at} dt &= \frac{k!}{a^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{Z}, a > 0 \\
 \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot \cos(bt) dt &= \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad a > 0 \\
 \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot \sin(bt) dt &= \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad a > 0
 \end{aligned}$$