

Análisis de señales Convolución de señales continuas

Escuela de Ciencias exactas e Ingeniería

Código: SA2019IG01_TTQ07

	Profesor: Marco Teran
Name:	Deadline: 12 de marzo de 2019

1. Calcule la convolución

$$e^{-t}u(t) * e^{-2t}u(t)$$

2. Sea

$$x(t) = u(1-t)u(t+1),$$

calcule y dibuje los resultados obtenidos.

- (a) x(t) * x(t)
- (b) $x(t) * [\delta(t+2) + 2\delta(t-2)]$
- **3.** Calcule y dibuje el resultado de la integral de convolución y(t) = x(t) * h(t) de los siguientes pares de señales:
 - $\begin{array}{ll} \text{(a)} \ \, x\left(t\right) = u\left(-t\right), & h\left(t\right) = e^{t}u\left(t\right) & \text{(d)} \ \, x\left(t\right) = u\left(-t\right), \\ h\left(t\right) = e^{-3t}u\left(t\right) & \text{(c)} \ \, x\left(t\right) = e^{j2t}, & h\left(t\right) = e^{-3t}u\left(t\right) \\ \text{(b)} \ \, x\left(t\right) = e^{j2t}, & h\left(t\right) = 3\delta\left(t-1\right) & \end{array}$
 - (e) x(t) = u(t), $h(t) = 2e^{-5|t|} (u(t+4) u(t-4))$ $h(t) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ (f) $x(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 < t \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ (h) $x(t) = \begin{cases} \sin(t), & \text{si } 0 < t \leq \pi \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ $h(t) = \begin{cases} \cos(t), & \text{si } 0 < t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ (g) $x(t) = \begin{cases} e^{2\pi t}, & \text{si } 0 < t \leq \frac{1}{2\pi} \ln 5 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$,
- 4. Determine la respuesta al impulso del sistema LTI

$$y(t) = \int_{t-1}^{t+1} x(\tau) \,\mathrm{d}\tau$$

5. Un sistema tiene la respuesta al impulso dada por

$$h(t) = \delta(t) - \delta(t - 1),$$

a partir de ésta determina la relación de entrada- salida del sistema.

6. Un sistema LTI y causal tiene la respuesta al impulso (1):

$$h(t) = e^{-t} + \sin t, t \geqslant 0 \tag{1}$$

- (a) Calcular la respuesta de salida para $t \ge 0$, cuando la entrada es el escalón u(t)
- (b) Calcular la respuesta de salida para $t \ge 0$, cuando la entrada es el pulso con función:

$$u(t+2) - u(t-2)$$

7. Encuentre la respuesta al impulso del sistema compuesto mostrado en la figura 1.




Fig. 1 – Diagrama de bloques

8. El sistema mostrado en la figura 2 esta formado por la conexión de dos sistemas en serie.




Fig. 2 – Diagrama de bloques en serie

Las respuestas al impulso están dadas:

$$h_1(t) = e^{-2t}u(t),$$

 $h_2(t) = 2e^{-t}u(t).$

- (a) Encuentre la respuesta al impulso $h_{total}(t)$ total del sistema.
- (b) Cual sería la salida si la entrada al sistema fuera: $x\left(t\right)=u\left(t\right)-u\left(t-6\right)$