




$\mu^+\mu^- \rightarrow t\bar{t}$ at 10 TeV



- LO + NLO + NNLO $^{\gamma\gamma}_{\text{coll}}$
- - - LO + NLO
- · - LO $^{\gamma\gamma}$
- $\mu^+\mu^- \rightarrow t\bar{t}\nu_x\bar{\nu}_x$
- $\mu^+\mu^- \rightarrow t\bar{t}\nu_\mu\bar{\nu}_\mu, m(\nu_\mu\bar{\nu}_\mu) > 200$



- · - LO $^{\gamma\gamma}$
- $\mu^+\mu^- \rightarrow t\bar{t}\nu_x\bar{\nu}_x$
- $\mu^+\mu^- \rightarrow t\bar{t}\nu_\mu\bar{\nu}_\mu, m(\nu_\mu\bar{\nu}_\mu) > 200$



- - - NLO
- NLO $^{\gamma\gamma}_{\text{coll}}, m(\mu^+\mu^-) > 200$
- NLO $^{\gamma\gamma}_{\text{coll}}, \mp\eta(\mu^\pm) < 2.5$
- NLO $^{\gamma\gamma}_{\text{coll}}, \mp\eta(\mu^\pm) < 5$
- NNLO $^{\gamma\gamma}_{\text{coll}} \times 2$