

1 Library laden

Laden von tVar und Festlegen eines Zahlenformates

```
require("../tVar.lua")
tVar.numFormat = "%.3f"
```

2 U-Wert Berechnung

Berechnung des U-Wertes eines Bauteiles mit 2 Schichten.

```
-- Variable Rse mit dem Wert 0.04 und der Latex Darstellung r_{se}
rse = tVar:New(0.04,"r_{se}")
rsi = tVar:New(0.13,"r_{si}")

d1 = tVar:New(20,"d_{1}")
lambda1 = tVar:New(0.035,"\\lambda_{1}")

d2 = tVar:New(10,"d_{2}")
lambda2 = tVar:New(0.5,"\\lambda_{2}")

R = rse+d1/lambda1+d2/lambda2+rsi

-- R:bracR() erzeugt Rundeklammern und den Term R
U=R:bracR()^(-1)
-- Bei der Ausgabe wird zuerst der Name der Var. angezeigt. Festlegen auf U
U.nameTex = "U"
```

Output mit U:outFull():

$$U = \left(r_{se} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + r_{si} \right)^{-1} = \left(0.040 + \frac{10.000}{0.035} + \frac{10.000}{0.500} + 0.130 \right)^{-1} = 0.003 \quad (1)$$

Output mit U:outHalf():

$$U = \left(r_{se} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + r_{si} \right)^{-1} = 0.003 \quad (2)$$

Output mit U:outVar():

$$U = 0.003 \quad (3)$$

3 Vergleichsspannung

Berechnung der Vergleichsspannung bei gegebenem σ_x und τ_{xy}

```
sigma_x = tVar:New(11.4,"\\sigma_{x}")
tau_xy = tVar:New(2.43,"\\tau_{xy}")
```

```
sigma_v = tVar.sqrt(sigma_x^2+3*tau_xy^2,2)
sigma_v.nameTex = "\\sigma_{v}"
```

Output mit `sigma_v:outFull()`:

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma_x^2 + 3.000 \cdot \tau_{xy}^2} = \sqrt{11.400^2 + 3.000 \cdot 2.430^2} = 12.152 \quad (4)$$

3.1 Resultierende Kraft

Berechnen der resultierenden Kraft auf einen Kreisquerschnitt.

```
r = tVar.New(10,"r")
```

```
A=r^2*tVar.PI
F=sigma_v*A
F.nameTex = "F"
```

Output mit `F:outFull()`:

$$F = \sigma_v \cdot r^2 \cdot \pi = \sqrt{11.400^2 + 3.000 \cdot 2.430^2} \cdot 10.000^2 \cdot \pi = 3817.710 \quad (5)$$

Ausführen mit `sigma_v:fix()`:

```
-- fix() löscht die Berechnungsschritte einer Var., damit wird bei jedem Aufruf
    der Var. nur mehr der Name angezeigt
sigma_v:fix()
A=r^2*tVar.PI
F=sigma_v*A
F.nameTex = "F"
```

Output mit `F:outFull()`:

$$F = \sigma_v \cdot r^2 \cdot \pi = 12.152 \cdot 10.000^2 \cdot \pi = 3817.710 \quad (6)$$

4 Matrizen

4.1 Addition und Subtraktion

Output mit `C:outFull()`:

$$\begin{aligned} \mathbf{C} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1 &= \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 & 3.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 & 1.000 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3.000 & 1.000 & 4.000 & 1.000 \\ 2.000 & 4.000 & 5.000 & 10.000 \end{pmatrix} \\ &- \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 & 3.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 & 1.000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.000 & 1.000 & 4.000 & 1.000 \\ 2.000 & 4.000 & 5.000 & 10.000 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7)$$

4.2 Multiplikation and Division

Output mit `C:outFull()`:

$$\mathbf{C} = - \left(\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 \cdot 2.000 - \frac{\mathbf{D}}{2.000} \right) = - \left(\begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 & 3.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 & 1.000 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3.000 & 1.000 \\ 4.000 & 2.000 \\ 5.000 & 8.000 \\ 2.000 & 9.000 \end{pmatrix} \cdot 2.000 - \frac{\begin{pmatrix} 5.000 & 12.200 \\ 3.000 & 22.000 \end{pmatrix}}{2.000} \right) = \begin{pmatrix} -135.500 & -155.900 \\ -76.500 & -75.000 \end{pmatrix} \quad (8)$$

4.3 Transponieren

Output mit `C:outFull()`:

$$\mathbf{C} = \mathbf{a}_1^\top = \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 & 3.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 & 1.000 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 \\ 2.000 & 4.000 \\ 5.000 & 3.000 \\ 3.000 & 1.000 \end{pmatrix} \quad (9)$$

4.4 Determinante und Inverse

Output mit `C:outFull()`:

$$C = |\mathbf{a}_2| = \left| \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 \\ 7.000 & 4.000 & 3.000 \end{pmatrix} \right| = -70.000 \quad (10)$$

Output mit `Inv:outFull()`:

$$\begin{aligned} \mathbf{Inv} &= \mathbf{a}_2^{-1} \cdot \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 \\ 7.000 & 4.000 & 3.000 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 10.000 & 2.000 & 5.000 \\ 2.000 & 4.000 & 3.000 \\ 7.000 & 4.000 & 3.000 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ -0.000 & -0.000 & 1.000 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$