

## 8. Übung Analysis III für Mathematiker(innen)

(Lebesgue-Messbarkeit,  $\sigma$ -Algebren)

---

### Themen der großen Übung am 03.12.

Sei  $\Omega$  eine Menge und  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ . Dann betrachten wir die Mengen

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{und} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Wir werden sehen

- (i)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in unendlich vielen } A_n\},$   
 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in fast allen } A_n\}.$
- (ii)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) \subseteq (\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) \cap (\limsup_{n \rightarrow \infty} B_n),$  und im Allgemeinen gilt hier nicht Gleichheit.

Wir berechnen dann  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$  für  $A_n := \begin{cases} (-\frac{1}{n}, 1], & n \text{ ungerade,} \\ (-1, \frac{1}{n}], & n \text{ gerade.} \end{cases}$

Wir untersuchen  $\mathbb{Q}^2 \cap E$  und  $E \setminus \mathbb{Q}^2$  auf Lebesgue-Messbarkeit und berechnen ggf. ihr Lebesgue-Maß.

Für Lebesgue-messbare Mengen  $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$  zeigen wir

$$\lambda(A \cup B) + \lambda(A \cap B) = \lambda(A) + \lambda(B).$$

## Tutoriumsvorschläge

### 22. Aufgabe

★

Sei  $A \in \mathcal{F}_E$  eine Lebesgue-messbare Teilmenge des Einheitsquadrats  $E = [0, 1]^2$  mit  $\lambda_E(A) = 0$ . Zeigen Sie, dass dann auch jede Teilmenge  $B \subseteq A$  Lebesgue-messbar ist mit  $\lambda_E(B) = 0$ . Folgern Sie, dass das Lebesgue Maß  $\lambda$  auf  $(\mathbb{R}^2, \mathcal{F})$  vollständig ist, d.h. dass jede Teilmenge  $M \subseteq N$  einer Lebesgue-messbaren Menge  $N \in \mathcal{F}$  mit  $\lambda(N) = 0$  Lebesgue-messbar ist mit  $\lambda(M) = 0$ .

**Hinweis:** In Aufgabe 27 (i) werden Sie zeigen, dass jede Menge  $N$  mit  $\lambda_E^*(N) = 0$  Lebesgue-messbar ist.

### 23. Aufgabe

Wie viele Elemente muss eine Teilmenge  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$  haben, damit die von ihr erzeugte  $\sigma$ -Algebra mit  $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$  übereinstimmt?

### 24. Aufgabe

★

Wir betrachten die Borel- $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{B}$  auf  $\mathbb{R}$ , welche von den offenen Teilmengen von  $\mathbb{R}$  erzeugt wird. Die Elemente von  $\mathcal{B}$  nennt man auch Borelmengen.

- (i) Zeigen Sie, dass jede abzählbare Teilmenge  $A$  von  $\mathbb{R}$  eine Borelmenge ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass die folgenden Mengen Erzeuger der Borel- $\sigma$ -Algebra sind

$$I_o := \{(a, b) : -\infty \leq a < b \leq \infty\} \quad \text{und} \quad I_a := \{(-\infty, t] : t \in \mathbb{Q}\}.$$

## Hausaufgaben

### 27. Aufgabe

(5 Punkte)

Eine Menge  $N \subseteq E = [0, 1]^2$  mit  $\lambda_E^*(N) = 0$  heißt (Lebesgue-)Nullmenge. Zeigen Sie Folgendes.

- (i) Jede Nullmenge ist Lebesgue-messbar.
- (ii) Jede abzählbare Vereinigung von Nullmengen ist eine Nullmenge.
- (iii) Überabzählbare Vereinigungen von Nullmengen sind im Allgemeinen keine Nullmengen.
- (iv) Jede abzählbare Teilmenge von  $E$  ist eine Nullmenge.
- (v) Die Verbindungsstrecke von zwei beliebigen Punkten aus  $E$  ist eine Nullmenge.

**Äußeres Maß auf  $\mathbb{R}^2$ :** In Aufgabe 28 verwenden wir das äußere Maß  $\lambda^*: \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) \rightarrow [0, \infty]$ , welches definiert ist durch

$$\lambda^*(A) := \sum_{i,j \in \mathbb{Z}} \lambda_{i,j}^*(A \cap E_{i,j}) = \sum_{i,j \in \mathbb{Z}} \lambda_{i,j}^*(A \cap E_{i,j}^0),$$

wobei wir an  $E_{i,j} = [i, i+1] \times [j, j+1]$  und  $E_{i,j}^0 = [i, i+1) \times [j, j+1)$  erinnern. Machen Sie sich klar, dass auch das Analogon von (2.1.5) aus dem Skript gilt, d.h. dass gilt:

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(R_n) : R_n \in \mathcal{R} \ \forall n \in \mathbb{N}, A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R_n \right\}.$$

Hierbei definieren wir  $\inf\{\infty\} = \infty$ ; außerdem benutzen wir die Regel  $\infty + \infty = \infty$ .

## 28. Aufgabe

(6 Punkte)

Zeigen Sie die Translationsinvarianz des Lebesgue-Maßes auf dem  $\mathbb{R}^2$ : Für eine Menge  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  und ein  $x \in \mathbb{R}^2$  sei  $A + x := \{a + x : a \in A\}$  die Verschiebung von  $A$  um  $x$ .

- (i) Zeigen Sie, dass für jede Menge  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  und jedes  $x \in \mathbb{R}^2$  gilt:  $\lambda^*(A) = \lambda^*(A + x)$ .
- (ii) Zeigen Sie, dass für jede Lebesgue-messbare Menge  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  und jedes  $x \in \mathbb{R}^2$  die Menge  $A + x$  ebenfalls Lebesgue-messbar ist und dass gilt  $\lambda(A) = \lambda(A + x)$ .

## 29. Aufgabe

(4 Punkte)

Seien  $\Omega, \tilde{\Omega}$  beliebige Mengen und sei  $f: \Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$ . Beweisen oder widerlegen Sie:

- (i) Ist  $\tilde{\mathcal{F}}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $\tilde{\Omega}$ , so ist  $f^{-1}(\tilde{\mathcal{F}}) := \{f^{-1}(A) : A \in \tilde{\mathcal{F}}\}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $\Omega$ .
- (ii) Ist  $\mathcal{F}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $\Omega$ , so ist  $f(\mathcal{F}) := \{f(A) : A \in \mathcal{F}\}$  eine  $\sigma$ -Algebra über  $\tilde{\Omega}$ .

## 30. Aufgabe

(5 Punkte)

Zeigen Sie, dass jede  $\sigma$ -Algebra entweder endlich viele oder bereits überabzählbar viele Elemente enthalten muss. Sei dazu  $\mathcal{F} = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine *abzählbare*  $\sigma$ -Algebra auf einer Menge  $X$ .

- (i) Sei  $x \in X$  und  $M_x := \bigcap_{F \in \mathcal{F}: x \in F} F$ . Zeigen Sie, dass  $M_x \in \mathcal{F}$  gilt und dass für  $x, y \in X$  gelten muss  $M_x \cap M_y = \emptyset$  oder  $M_x = M_y$ .
- (ii) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{F}$  endlich viele Elemente enthält oder andernfalls nicht abzählbar ist.

Gesamtpunktzahl: 20