

EXERCÍCIO 1

Conceitos envolvendo lema do aperto de mãos:

- 1) Prove que o número de vértices de grau ímpar em um grafo deve ser par.
- 2) Se 10 pessoas apertam as mãos umas das outras, quantos apertos de mão ocorreram? O que essa questão tem a ver com a teoria dos grafos?
- 3) Dado um grafo com 7 vértices; 3 deles de grau dois e 4 de grau um. Este grafo é conexo?
- 4) Em um grupo de 5 pessoas, é possível que todos sejam amigos de exatamente 2 pessoas do grupo? E quanto a 3 das pessoas no grupo?

EXERCÍCIO 2


Conceitos envolvendo grafos:

- 1) Liste todos os grafos que possuem $\{a, b, c\}$ como seu conjunto de vértices. Organize a lista de forma que sejam ilustrados o grafo e o seu complemento (um ao lado do outro).
- 2) Encontre o número de vértices e arestas em cada um dos grafos (simples) e não-direcionados:
 - i) Grafo nulo N_n
 - ii) Grafo ciclo C_n
 - iii) Grafo completo K_n
 - iv) Grafo bipartido completo $K_{m,n}$
- 3) Seja G um grafo simples com pelo menos dois vértices. Prove que G deve conter pelo menos dois vértices de mesmo grau.
- 4) Uma string binária é uma sequência finita de 0s e 1s. O comprimento de uma string binária é o número total de símbolos que ocorrem nela.
 - i) Desenhe o seguinte grafo: os vértices são rotulados por cadeias binárias de comprimento 3 (ou seja, todas as sequências possíveis de três 0's e 1's de 000 a 111); dois vértices são unidos por uma aresta quando diferem em exatamente um lugar. Assim, 000 é associado a 100, mas não a 110.
 - ii) Desenhe o seguinte grafo: os vértices são rotulados por cadeias binárias de comprimento 4, dois vértices são unidos por uma aresta quando diferem em exatamente um lugar.

EXERCÍCIO 3

Desenhe os seguintes grafos, caso exista, ou justifique a não existência.

- 1) Encontre todos os grafos não rotulados simples com 4 vértices
- 2) Um grafo simples com 5 vértices e 6 arestas.
- 3) Dois grafos regulares diferentes com 5 vértices.
- 4) Um grafo simples com sequência de graus $(2, 2, 2, 3, 3)$
- 5) Um grafo com sequência de graus $(2, 2, 2, 2, 3)$



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

- 6) Dois grafos diferentes com 6 vértices, 9 arestas e sequência de graus $(2, 2, 3, 3, 3, 5)$
- 7) Um grafo simples não-direcionado com 6 vértices, 3 componentes conexos e 3 arestas.

EXERCÍCIO 4

Seja o grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, d), (a, c)\}$. Responda e justifique suas respostas:

- 1) O grafo é direcionado ou não direcionado?
- 2) Quais arestas são adjacentes?
- 3) Quais arestas são paralelas?
- 4) Ilustre os vértices incidentes das arestas.
- 5) Há vertice isolado?
- 6) Há ciclo?

EXERCÍCIO 5

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e não-direcionado.

- 1) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de arestas de G ?
- 2) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de componentes conexos que pode haver em G ?
- 3) Encontre três exemplos de grafos com mais de 4 vértices em que o número de arestas de G seja igual ao número de arestas do complemento de G .
- 4) Para quais valores de $|V|$ é possível que um grafo G tenha o mesmo número de arestas de seu complemento?

EXERCÍCIO 6

Sejam dois grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$.

- 1) Ilustre a união de G_1 e G_2 .
- 2) Ilustre a soma de G_1 e G_2 .
- 3) Mostre que a união de grafos é associativa e comutativa para grafos não-direcionados.

EXERCÍCIO 7

Seja o grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, d)\}$. Responda e justifique suas respostas:

- 1) Ilustre $G' = (V', E')$ em que a aresta (a, c) foi removida.
- 2) Ilustre $G' = (V', E')$ em que o vértice a foi removido.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

- 3) Ilustre $G' = (V', E')$ em que os vértices a e c foram contraídos.
- 4) Ilustre $G' = (V', E')$ em que um vértice f é inserido.

EXERCÍCIO 8

Modele os seguintes problemas em grafos:

- 1) Como encontrar o menor caminho, na PUC Minas Coreu, para sair do prédio 34 e chegar no teatro João Paulo II?
- 2) Como identificar o menor número de períodos em que o aluno de Ciência da Computação consegue fazer todas as disciplinas?
- 3) Sejam os alunos da disciplina de Teoria de Grafos e Computabilidade, como identificar quantos pares podem ser formados considerando que somente alunos com mesma inicial podem formar uma dupla?

EXERCÍCIO 9

O grafo de interseção de uma coleção de conjuntos A_1, A_2, \dots, A_n é o grafo que tem um vértice para cada um dos conjuntos da coleção e tem uma aresta conectando os vértices se esses conjuntos têm uma interseção não vazia. Construa o grafo de interseção para as seguintes coleções de conjuntos.

- 1) $A_1 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
 $A_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
 $A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $A_4 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$
 $A_5 = \{0, 1, 8, 9\}$
- 2) $A_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$
 $A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
 $A_3 = \{-6, -4, -2, 0, 1, 2\}$
 $A_4 = \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$
 $A_5 = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$

EXERCÍCIO 10

Determine se cada um dos grafos é bipartido.

- 1) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\}\}$
- 2) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, e\}, \{c, d\}\}$
- 3) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, f\}\}$
- 4) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, c\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\}$

EXERCÍCIO 11

Análise de alguns grafos especiais.


- 1) Para que valores de n os grafos abaixo são regulares?




- i) K_n (grafo completo)
 - ii) C_n (grafo ciclo)
 - iii) Q_n (grafo cubo) – Um cubo de dimensão n , ou n -cubo, é o grafo Q_n definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as sequências $b_1b_2 \cdots b_n$ em que cada b_i pertence a $\{0, 1\}$; dois vértices são adjacentes se diferem em exatamente uma posição.
 - iv) W_n (grafo roda)
- 2) O grafo complementar \overline{G} de um grafo simples G tem os mesmos vértices de G . Dois vértices são adjacentes em G se, e somente se, eles não são adjacentes em \overline{G} . Determine os seguintes grafos.
- i) $\overline{K_n}$
 - ii) $\overline{K_{m,n}}$
 - iii) $\overline{C_n}$
 - iv) $\overline{Q_n}$
- 3) O grafo tripartite completo $K_{r,s,t}$ consiste de três conjuntos de vértices de tamanhos r , s e t , com arestas unindo dois vértices se e somente se eles pertencem a conjuntos distintos.
- i) Desenhe os grafos $K_{2,2,2}$ e $K_{2,3,3}$.
 - ii) Quantos vértices e arestas o grafo $K_{r,s,t}$ possui (exprima sua resposta em função de r , s e t)?
 - iii) Qual é o complemento de $K_{r,s,t}$?

EXERCÍCIO 12

O bilionário Count Mui Dinheiro acaba de ser assassinado. Um conhecido detetive, que é especializado em teoria dos grafos foi chamado para investigar o caso. O assassinato ocorreu na sala em que está a piscina, infelizmente, mesmo sendo muito rico, Count Mui Dinheiro não havia colocado câmeras em sua residência. A residência possui muito funcionários, dentre eles uma governanta e um piscineiro. A governanta afirma ter visto o piscineiro entrando e saindo pelo cômodo em que o bilionário foi assassinado vindo da parte externa. O piscineiro, entretanto, declara que a governanta mentiu pois ele não poderia ter sido a pessoa vista por ela uma vez que entrou na casa por uma porta, e passou por todas as outras portas uma única vez, antes de deixar a casa. O detetive, muito esperto, avaliou a planta da casa e rapidamente declarou quem mentiu. Quem poderia ser o suspeito indicado pelo detetive? Qual a linha de raciocínio que foi usada para apontar o suspeito?





EXERCÍCIO 13

Representação por meio de matriz de adjacência.

- 1) Desenhe os grafos com as seguintes matrizes de adjacência.

i)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$


- 2) Como seriam as matrizes de adjacência de:

- i) grafo nulo N_n
- ii) grafo ciclo C_n
- iii) grafo completo K_n
- iv) grafo bipartido completo $K_{m,n}$

EXERCÍCIO 14

Discussões acerca das representação de grafos usando matriz de adjacência.

- 1) Seja G um grafo simples com matriz de adjacência A
 - i) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A?
 - ii) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A^2 ?
 - iii) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A^3 ?
- 2) Seja uma matriz simétrica quadrada formada apenas por 0's e 1's que tem apenas 0's na diagonal principal. Essa matriz pode representar a matriz de adjacência de um grafo simples?
- 3) O que representa a soma das entradas de uma coluna de uma matriz de adjacência de um grafo não-direcionado? E de um grafo direcionado?



EXERCÍCIO 15

Tertuliano Gonçalves havia prometido casamento a Josefina das Graças. O evento deveria ser realizado, segundo ele, assim que acabasse o contrato de trabalho recém assinado com uma empresa encarregada de pavimentar toda a rede de estradas que ligava Santana do Caixa Prego (cidade onde morava Josefina) às cidades da região. O trabalho iria começar em Santana e prosseguir em continuidade, estada após estrada, terminando, segundo explicou Tertuliano, na própria Santa. A rede de estradas poderia ser representada pela matriz de adjacência que se segue, na qual a cidade de Santana é representada pelo número 1. Você que leu esta estória acha que Tertuliano estava sendo sincero com Josefina? Por quê? E se o itinerário 1-5-9-10 estivesse a cargo de outra empresa, estaria ele sendo sincero?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
6	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
7	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
10	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0

baseado em <http://www.inf.ufsc.br/grafos/problemas/paviment.htm>

EXERCÍCIO 16


Seja P o produto cartesiano $\{1, 2, \dots, p\} \times \{1, 2, \dots, q\}$, ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados (i, j) em que $i \in \{1, \dots, p\}$ e $j \in \{1, \dots, q\}$. Dois elementos (i, j) e (i', j') de P são adjacentes se $i = i'$ e $|j - j'| = 1$ ou $j = j'$ e $|i - i'| = 1$. O grafo $G = (V, E)$ é definido por $V = P$ e há uma aresta entre dois vértices de V se dois elementos de P forem adjacentes. O grafo G é conhecido como grafo em grade e comumente chamado de grafo em grade p -por- q . Responda as seguintes questões:

- 1) Quantas arestas há no grafo em grade p -por- q ?
- 2) Ilustre visualmente o grafo em grade 3 por 4.
- 3) Escreva a matriz de adjacência do grafo em grade 3 por 4.

EXERCÍCIO 17

O grafo de palavras é definido da seguinte forma: cada vértice é uma palavra na língua portuguesa e duas palavras são adjacentes se diferem exatamente em uma posição. Por exemplo, corpo e corvo são adjacentes, enquanto que corpo e coroa não são adjacentes.

- 1) Desenhe uma figura da parte do grafo definida pelas seguintes palavras:
- 2) Escreva a matriz de adjacência desse grafo.



- 3) Escreva a matriz de incidência desse grafo.
- 4) Escreva a lista de adjacência de sucessores e de predecessores desse grafo.

EXERCÍCIO 18

Seja P o conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ e V o conjunto $P \times P$ que é o conjunto de todos os subconjuntos de P que têm exatamente 2 elementos. Dois elementos u e v de V são adjacentes se $u \cap v = \emptyset$.

- 1) Defina o grafo em termos de vértices e arestas.
- 2) Faça uma figura do grafo.
- 3) Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo.
- 4) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo?

EXERCÍCIO 19

Seja $I = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ um conjunto de intervalos de comprimento finito na reta dos reais. Dois intervalos são sobrepostos que $I_i \cap I_j \neq \emptyset$.

- 1) Defina o grafo, conhecido como grafo de intervalos, em que a relação de sobreposição definirá a adjacência dos entre os vértices.
- 2) Faça uma figura do grafo em que o conjunto de intervalos é dado por $I = \{[0, 2], [1, 4], [3, 6], [5, 6], [1, 6]\}$
- 3) Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo.
- 4) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo?

EXERCÍCIO 20

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e não-direcionado. Duas arestas de G são dita adjacentes se compartilham algum vértice. Um grafo de linha $G_l = (E, E')$ de grafo G é definido por: o conjunto de vértices do grafo de linha será o conjunto de arestas de G e o conjunto de arestas do grafo de linha é dado pelo conjunto de todos os pares de arestas adjacentes de G .

- 1) Faça uma figura do grafo K_4 .
- 2) Escreva a matriz de adjacência.
- 3) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo de linha?